1

# ENTOMOLOGISCHE BEYTRÄGE

ZU

DES RITTER LINNE'

ZWÖLFTEN AUSGABE

# DES NATURSYSTEMS

VON

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE,

Paſtor an der Kirche S. Blaſii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede der Geſellſchaft Naturforſchender Freunde in Berlin, der Herzoglichen deutſchen Geſellſchaft in Helmſtädt, der Naturforſchergeſellſchaft in Halle, und der Königlich Schwediſchen patriotiſchen Geſellſchaft zu Stockholm.

J. L. Schönlein

DRITTEN THEILES DRITTER BAND.

Leipzig,

bey Weidmanns Erben und Reich. 1781.

Staats-
bibliothek
Bamberg

# VORREDE.

Dieser *dritte Band* meiner entomologischen Beyträge ist zu einer ziemlichen Stärke angewachsen, weil die *neuen Arten* der *Spinner*, der *Eulen* und der *Spanner* ungemein zahlreich sind. Mit den *letztern* habe ich ihn geschlossen, und werde den *vierten und letzten Theil* der Lepidopterorum mit den *Blattwicklern* anfangen; alsdann aber auch diese ganze Klasse der Insekten zu Ende bringen.

Statt des *schuldigen Nachtrags* zu allen bisher erschienenen Bänden will ich meine Leser mit den wichtigsten und neuesten *Insektenwerken* bekannt machen, die in diesem Jahre herausgekommen sind. Einige müßte ich beynahe ganz ausschreiben, welches ohne Nutzen wäre. Ein jeder kann sich daraus die Insekten aller Geschlechter und Arten sehr leicht seinem Exemplare beytragen; mich aber einer *unbeschreiblichen Arbeit* überheben.

Das erste neue Insektenwerk führt den Titel:

Représentation exactement colorée d'après Nature des *Cigales* & des *Punaises*, qui se trouvent dans les quatre Parties du monde, l'Europe, l'Asie, l'Afrique & l'Amérique, rassemblées & décrites par Caspar *Stoll*, à Amsterdam chez Jean Chrét. *Sepp*. gr. 4. 1780.

Ausserdem hat das Werk einen holländischen Haupttitel, und ist in beyden Sprachen abgefasst. Bis jezt sind davon *drey Hefte* erschienen. Der Preis von jedem 4 holländische Gulden. Bey dem dritten wird versprochen, dass den Besitzern des Originals auch der *deutsche Text* unentgeldlich solle nachgeliefert werden. Ferner, dass jeder deutsche Textbogen des eigennützigen Nachdrucks wegen durch J. C. *Sepp* eigenhändig solle unterschrieben seyn, auf dass keine verstümmelte Kopie dieses Werks für das Seinige ausgegeben werde.

Wer die *Seppischen Malereyen* aus den Niederländischen Insekten und aus seinem Vogelwerke kennet, der wird sich bey diesem gleichen Fleiss, gleiche Feinheit und Geschicklichkeit versprechen können.

Dieses gegenwärtige ist gleichsam ein Pendant zu Cramers Papillons exotiques, deren Ausgabe Herr *Stoll* jezt besorget. Nur Schade, dass man in beyden Werken, bey den Insekten, wie im *Drury*, nichts als eine magere Beschreibung derselben, und gar keine Naturgeschichte findet. Daher der Preis dem eigentlichen Nutzen, wenn wir das System ausnehmen,

men, wenig entſpricht, da das Kramerſche Werk, wenn es mit dem vierten Theile geſchloſſen wird, 160 Thlr. koſtet.

Der Verfaſſer hat zuerſt die *Zigalen* (Cicada L.), hernach die *Wanzen* (Cimex L.) beſchrieben und abgebildet.

Bey den *erſten* hat er die Linnéiſche Eintheilung in *fünf Familien* beybehalten; ſolche aber mit der *ſechſten* (Fulgora) vermehret, welches hier die erſte iſt.

1) Fulgora *Laternaria* L. t. 1. f. 1.
2) *Cic. Foliacea:* Cigale feuillée à taches noires & blanches: eine *neue.* t. 1. f. 2.
3) *Foliac.* L'Orphelin rouge & noir. t. 1. f. 3. eine *neue.*
4) *Deflexa:* La Cigale Demoiſelle. t. 1. f. 4. eine *neue.*
5) *Deflexa:* Porte-miroir noir. t. 1. f. 5. eine *neue.*
6) Cicada *Querula.* t. 1. f. 6. (m. Beytr. Tom. II. p. 151. no. 17.)
7) *Fulgora* fuſca. t. 2. f. 7. (Beytr. II. p. 123. no. 3. Fulg. *tenebroſa* Fabric.)
8) *Cruciata:* La *Croix.* t. 2. f. 8. eine *neue.*
9) *Deflexa:* Cic. *Phalaenoïdes* L. no. 40. t. 2. f. 9.
10) *Ranatra:* Cic. *Rubra* L. no. 45. t. 2. f. 10.
11) *Mannifera:* Cic. *Haematodes* L. no. 14. t. 2. f. 11.

### *Wanzen.*

Die Eintheilung nach der äuſserlichen Form, und nach dem eigenen Syſtem des Verfaſſers, etwas vom Linnéiſchen verſchieden: in *ſieben Familien.*

1) *Erste Familie:* glatter Brustschild; das Rückenschildchen so groſs, daſs es die Flügel und den Hinterleib bedeckt.

2) Brustschild glatt und breit; Rückenschildchen groſs und fast dreyeckig; bedeckt mit seinem spitzen Winkel den halben Hinterleib.

3) An den Schultern des Brustschildes ein spitzer Dorn; Rückenschildchen groſs und dreyeckig; die Ränder des Hinterleibs gezähnelt.

4) Brustschild dreyeckig, nach dem Kopfe zu spitz zu laufend; Rückenschildchen klein; bey den Weibchen mehrentheils die Hinterfüſse dicke, und an der Innenseite dornicht. Bey andern die Füſse häutig, wie Schwimmfüſse.

5) Brustschild und Körper sehr flach; die Flügel kürzer als der Körper. Einige, als die Bettwanzen, ganz flügellos.

6) Brustschild uneben, bucklicht und zweytheilicht. Der Kopf sehr hervorstehend, und mit dem Brustschilde durch einen Einschnitt vereiniget. Der Saugrüſsel kurz, und wie ein Halbzirkel gekrümmet; der Körper schmächtig; der Hinterleib klein. Die beyden Vorderfüſse dicker als die vier hintersten.

7) Brustschild glatt; der ganze Körper lang und schmächtig; die Füſse sehr lang. Hieher die länglichten Wasserwanzen.

Hierauf die *Wasserskorpione und Wasserwanzen.*

1) Karaktere der *ersten.*

Kleine mikroskopische fadenförmige Fühlhörner unter den Augen. Der Saugrüſsel unter dem Brustschilde zurückgebogen; die Flügeldecken mehrentheils hart, hornartig, am Ende häu-

tig:

tig: rückwärts in der Queer gefaltet; bedecken Körper und Flügel; ein Rückenſchildchen; die Vorderfüſse zangenförmig, wie die Scheeren der Fangheuſchrecken (Mantis). Die Fuſsblätter zweygliedricht.

2) Karaktere der *zwoten*.

Die Fühlhörner kürzer als der Bruſtſchild; ein unterwärts zurückgebogener Saugrüſsel; ein Rückenſchildchen; harte, über einander liegende Flügeldecken, die den Körper und die Flügel bedecken; die Hinterfüſse zum Schwimmen; die Fuſsblätter zweygliedricht.

1) Punaiſe à écuſſon violet. t. 1. f. 1. *1ſte fam.* eine *neue.*

2) P. de Java. t. 1. f. 2. *2te fam.* eine *neue.*

3) P. épineuſe. t. 1. f. 3. *3te fam. neue.*

4) P. à bandes jaunes. t. 1. f. 4. *4te fam. neue.*

5) P. à deux points. t. 1. f. 5. *3te fam. neue.*

6) *Nepa* ruſtica Fabric. t. 1. f. I. (Beytr. II. p. 177. no. 2.)

7) *Nepa* cinerea L. no. 5. t. 1. f. II.

8) Pun. liſſe à avirons. t. 1. f. III. *neue.*

9) Cimex *criſtatus* Linn. n. 62. t. 1. f. 6. *6te fam.*

10) Cimex *nobilis* L. no. 3. t. 2. f. 7. *1te fam.*

11) P. rayée de Suriname. t. 2. f. 8. *1te fam. neue.*

12) Cim. *lineatus* L. no. 6. t. 2. f. 9. *1te fam.*

13) Cim. *incarnatus* Drury II. p. 67. t. 36. f. 5. t. 2. f. 10. *2te fam.*

14) Cim. *ornatus* L. no. 56. t. 2. f. 11. *2te fam.*

15) Cimex *punctatus* Degeer III. p. 335. no. 5. t. 34. f. 6.) t. 1. f. 12. *3te fam.*

16) P. à bandes orange. t. 2. f. 13. *4te fam. neue.*

17) P. à pattes membraneuſes. t. 2. f. 14. *4te fam. neue.*

18) Cim. *Stockerus* L. no. 2. t. 3. f. 15. *1te fam.*

19) P. bleue de Stocker. t. 3. f. 16. *1te fam. neue.*
20) P. verte de Stocker. t. 3. f. 17. *1te fam. neue.*
21) P. brune à point blanc. t. 3. f. 18. *2te fam. neue.*
22) Cim. *Lineola* L. no. 52. t. 3. f. 19. *4te fam.*
23) P. de Pharaon. t. 3. f. 20. *4te fam. neue.*
24) P. à écusson en fleurs. t. 4. f. 21. *1te fam. neue.*
25) P. à écusson bleu d'azur. t. 4. f. 22. *1te fam. neue.*
26) P. à écusson doré. t. 4. f. 23. *1te fam. neue.*

*II. Heft.*

I. *Zikaden.*

12) *Ranatra:* Cigale grise. t. 3. f. 12. *neue.*
13) Mannifera Tettigon: Chanteuse des Champs. t. 3 f. 13. (Seba IV. t. 85. f. 7. 8.) *neue.*
14) Cic. Mannif. *Septemdecim* L. no. 20. t. 3. f. 14.
15) C. Mannif. *Capensis* L. no. 13. t. 3. f. 15.
16) Mannif. Cig. écailleuse de Java. t. 4. f. 16. *neue.*
17) Mannif. Cig. bigarrée. t. 4. f. 17. *neue.*
18) Fulgora: Cig. verte. t. 4. f. 18. *neue.*

II. *Wanzen.*

27) Pun. verte de Stocker. t. 4. f. 24. *1te fam. neue.*
28) P. à bords en Damier. t. 4. f. 25. *2te fam. neue.*
29) P. à Y renversé. t. 4. f. 26. *2te fam. neue.*
30) P. d'une couleur. t. 4. f. 27. *2te fam. neue.*
31) P. Sexagone t. 4. f. 28. *4te fam. neue.*
32) P. violette. t. 5. f. 29. *2te fam. neue.*
33) P. à arc jaune. t. 5. f. 30. *2te fam. neue.*
34) P. Arlequin. t. 5. f. 31. *2te fam. neue.*
35) P. de Potagers à *taches rouges.* t. 5. f. 32. *2te fam. neue.*
36) Cimex *oleraceus* L. no. 53. t. 5. f. 33. *2te fam. neue.*
37) P. à épaules cornues. t. 5. f. 34. *3te fam. neue.*

38) P. à bordure rouge. t. 5. f. 35. *4te fam. neue.*
39) P. à abdomen quarré. t. 5. f. 36. *4te fam. neue.*
40) P. brune. t. 5 f. 37. *4te fam. neue.*
41) Cimex *perſonatus* L. no. 64. t. 5. f. 38. *6te fam.*
42) Cimex *aurantius Sulzeri* (Geſch. t. 10. f. 10.) t. 6. f. 39. *2te fam.*
43) Cimex *nigripes Sulzeri* (t. 10. f. 9.) t. 6. f. 40. *2te fam.*
44) Cimex *Janus* Fabric. (Beytr. II. p. 247. no. 20.) t. 6. f. 41. *2te fam.*
45) P. Couleur d'Ocre. t. 6. f. 42. *2te fam. neue.*
46) P. à Dos agathe. t. 6. f. 43. *2te fam. neue.*
47) Cimex *haemorrhoïdalis* L. no. 35. t. 6. f. 44. *3te fam.*
48) P. des Bois. t. 6. f. 45. *3te fam. neue.*
49) Cimex *Baccarum* L. no. 45. t. 6. f. 46. *3te fam.*
50) P. à tête pointue. t. 6. f. 47. *3te fam. neue.*
51) P. à écuſſon rouge. t. 7. f. 48. *1te fam. neue.*
52) P. à écuſſon à bandes. t. 7. f. 49. *1te fam. neue.*
53) P. à écuſſon avec des yeux. t. 7. f. 50. *1te fam. neue.*
54) P. à groſſes pattes. t. 8. f. 51. *4te fam. neue.*
55) Nepa *grandis* L. no. 1. t. 7. f. IV.
56) Le Scorpion aquatique noir de Tranquebar. t. 7. f. V. *neuer.*
57) Nepa *Plano Sulzeri* (t. 10. f. 2.) t. 7. f. VI.

## *III. Heft.*

### I. *Zikaden.*

19) *Deflexa:* Cig. à ailes de Gaze. t. 4. f. 19. *neue.*
20) *Ranatra:* Cig. à quatre points. t. 4. f. 20. *neue.*
21) *Ranatra:* Cig. à Harnois jaune. t. 4. f. 21. *neue.*
22) Cicada *Cruciata aurita* L. no. 7. t. 4. f. 22.
23) *Fulgora* Diadema L. no. 2. t. 5. f. 22.
24) *Fulgora:* Cig. à tête obtuſe. t. 5. f. 23. *neue.*

25) Cicada *foliata* L. no. 2. t. 5. f. 24.
26) *Ranatra:* Cig. au Colier rouge. t. 5. f. 25. *neue.*
27) Cicada *Ranatra* Sanguinolenta L. no. 22. t. 5. f. 27.
28) *Fulgora:* Cig. l'Porte-Lanterne ponctuée. t. 6. f. 28. *neue.*
29) Fulgora *Flammea* L. no. 7. t. 6. f. 29.
30) *Deflexa:* Cig. parée. t. 6. f. 30. *neue.*
43) Cicada *Foliacea* fronditia L. no. 3. t. 6. f. 31.
44) *Cruciata:* Cig. Porte-Joug. t. 6. f. 32. *neue.*

II. *Wanzen.*

58) P. Hottentot (Femelle) t. 8. f. 52. *4te fam. neue.*
59) — — (Mâle) t. 8. f. 53
60) P. à pattes feuilletées. t. 8. f. 54. *4te fam. neue.*
61) P. à Luisant d'or. t. 8. f. 55. *4te fam. neue.*
62) P. de Goyaves. t. 8. f. 56. *4te fam. neue.*
63) P. de la Jusquiame de Suriname. t. 8. f. 57. *4te fam. neue.*
64) P. à Reflet vert. t. 9. f. 57. *1te fam. neue.* An Fabricii *Irroratus* no. 15?
65) P. Jaune à Ecusson. t. 9. f. 58. *4te fam. neue.*
66) P. Porte-Lis. t. 9. f. 59. *1te fam. neue.*
67) P. à Ecusson couleur de Canele. t. 9. f. 60. *1te fam. neue.*
68) P. Samojede. t. 9. f. 61. *1te fam. neue.*
69) P. Griffon, de Suriname. t. 9. f. 62. *6te fam. neue.*
70) Cimex *Lacustris* L. no. 117. t. 9. f. 63. *7te fam.*
71) Grande P. à deux taches. t. 9. f. 64. *6te fam. neue.*
72) Cimex *Andreae* L.? no. 80. t. 9. f. 65. *6te fam.*
73) P. épineuse à ventre rouge. t. 9. f. 66. *6te fam. neue.*
74) P. à antennes en massue. t. 10. f. 67. *4te fam. neue.*

75) P.

75) P. à pieds crochus. t. 10. f. 68. *4te fam. neue.*
76) P. à Dos rouge. t. 10. f. 69. *4te fam. neue.*
77) P. modeste. t. 10. f. 70. *4te fam. neue.*
78) P. à raye blanche. t. 10. f. 71. *4te fam. neue.*
79) P. à bout d' Abdomen. t. 10. f. 72. *4te fam. neue.*
80) P. coureuse aux Echasses. t. 10. f. 73. *4te fam. neue.*
81) P. bigarrée. t. 11. f. 74. *4te fam. neue.*
82) P. à quatre points. t. 11. f. 75. *4te fam. neue.*
83) P. à corcelet vert. t. 11. f. 76. *4te fam. neue.*
84) P. à collier blanc. t. 11. f. 77. *4te fam. neue.*
85) P. à antennes bigarrées. t. 11. f. 78. *4te fam. neue.* f. 79. *Mâle.*
86) La belle P. à bout d' ailes blanc. t. 11. f. 80. *4te fam. neue.*
87) Cim. *Hyoscyami* L. no. 76. t. 11. f. 80. *. *4te fam.*
88) P. à taches de Sang. t. 11. f. 81. *4te fam. neue.*
88) P. jaune en Demi-Lune. t. 11. f. 82. *4te fam. neue.*
90) Cimex *2-pustulatus* L. no. 29. t. 11. f. 83. *4te fam.*
91) Nepa *linearis* L. no. 7. t. 12. f. VII.

Wir erinnern hierbey noch, daſs die Bogen und Kupfertafeln der Zigalen und Wanzen in den Heften ſo unbequem unter einander durch gebunden ſind, daſs man ſich kaum heraus finden kann. Warum nicht lieber ein Heft von Zigalen, und eines von Wanzen?

Von den Papillons d' Europe etc. beſitze ich den 4ten und 5ten Heft, bey welchem ſich der umgedruckte Bogen Ii des 3ten Heftes befindet, weil in dem erſten aus Verſehen falſche Verwechſelungen geſchehen waren. Alſo

auf

auf diesem, und im 4ten Heft *folgende Schmetterlinge:*

1) Pap. Pleb. Rur. *Betulae L.* no. 220. t. 35. no. 70.
2) — — — *Quercus* L. no. 222. t. 35. no. 71.
3) — — — *Pruni* L. no. 221. Varietates *Esperi* I. t. 39. Suppl. 15. f. 1. a. f. 1. b.) t. 35. no. 72.
4) Pap. Pleb. Rur. *Pruni* L. no. 221. t. 35. no. 73.
5) — — — *Quercus* L. no. 222. Varietas *Esperi* t. 39. Suppl. 15. f. 3.) t. 35. no. 74.
6) Pap. Pleb. Rur. Porte-queue brun à taches fauves. t. 35. no. 75. *Ein neuer.*

*Im IVten Heft.*

7) Pap. Pleb. Rur. *Boeticus* L. no. 226. t. 37. no. 76. Le *Porte-queue bleu strié.*
8) Pap. Pleb. Rur. *Echion* L. no. 224. t. 37. no. 77. Le *Porte-queue à double queue.*
9) Pap. Pleb. Rur. *Tiresias Esperi* t. 34. Suppl. 10. f. 1. foem. f. 2. Mas.) t. 37. no. 78.
10) Pap. Pleb. Rur. *Tiresias Esperi* Varietas t. 49. f. 2.) t. 37. no. 79. *Les petits porte-queue.*
11) Pap. Pleb. Rur. *Argus* L. no. 232. t. 38. no. 80. *Argus bleu.*
12) Pap. Pleb. Rur. *Meleager Esperi* t. 45. f. 2.) t. 38. no. 81. *Argus bleu découpé.*
13) Pap. Pl. Rur. *Bellargus Esperi* t. 32. f. 3.) t. 39. f. 82. *Argus bleu céleste.* a b c d e f. Varietates Maris et foeminae.
14) Pap. Pl. Rur. *Coridon Esperi* t. 33. f. 4.) t. 39. no. 83. *Argus bleu Nacré.*
15) Pap. Pl. Rur. *Hylas Esperi* t. 45. f. 3.) t. 40. no. 84. *Argus bleu pâle.*

16) Pap.

16) Pap. Pl. Rur. *Telephii Esperi* t. 41. f. 2.) t. 40. no. 85. *Argus bleu-violet.*

17) Pap. Pl. Rur. *Arion* L. no. 230. t. 40. no. 86. t. 41. no. 86. *Argus bleu à bandes brunes.*

18) Pap. Pl. Rur. *Biton Esperi* t. 33. f. 5.) t. 41. f. 87. *Argus bleu à bandes brunes, lignes blanches.*

19) Pap. Pl. Rur. *Argiolus* L. no. 234. t. 42. no. 88. *Le Demi-argus.*

20) Pap. Pl. Rur. *Phocas Esperi* t. 35. f. 1. 2.) t. 43. no. 89. *Argus Myope.*

21) Pap. Pl. Rur. *Rubi* L. no. 237. t. 43. no. 90. *Argus verd.*

22) Pap. Pl. Vrb. *Actorion* L. no. 262. t. 43. no. 91. *L' Argus bronzé.*

23) Pap. Pl. Rur. *Virgaureae* L. no. 253. et Foeminae *Hippothoë* no. 254. t. 44. no. 92. *Argus Satiné.*

24) Pap. Pl. Rur. *Roeselii* III. t. 37. f. 6 7. *Esperi Hippothoë.* t. 22. f. 3.) t. 44. no. 93. *Argus Satiné à taches noires.*

25) Pap. Pl. Vrb. *Steropes Esperi* t. 41. f. 1.) t. 44. no. 94. *le Miroir.*

26) Pap. Pl. Vrb. *Comma* L. no. 256. t. 45. no. 95. La *Bande noire.*

27) Pap. Pl. Vrbic. *Paniscas Esperi* t. 28. f. 2.) t. 45. no. 96. *L' Echiquier.*

28) Pap. Pl. Vrbic. *Malvae* L. no. 267. t. 46. no. 97. *Le Plein-Chant.*

29) Pap. Pl. Vrbic. *Tages* L. no. 268. t. 46. no. 98. *Le Papillon Grisette.*

30) Pap. *Helicon.* *Apollo* L. no. 50. t. 47. no. 99. *L' Apollon.*

31) Pap. Helicon. *Mnemosyne* L. 51. t. 48. no. 100. *Le Semi-Apollon.*

32) Pap. Dan. Cand. *Crataegi* L. no. 72. t. 48. no. 101, *Le Gazé.*

*Im*

*Im Vten Heft.*

33) Pap. *Brassicae* Linn. no. 75. t. 49. no. 202. *Le grand Papillon du Chou.*

34) Pap. *Rapae* Linn. no. 76. t. 49. no. 203. *Le petit Pap. du Chou.*

35) Pap. *Napi* Linn. no. 77. t. 50. no. 204. *Le Papillon Blanc veiné de verd.*

36) Pap. *Sinapi* Linn. no. 79. t. 50. no. 205. *Le Papillon blanc de Lait.*

37) Pap. *Daplidice* Linn. no. 81. t. 50. no. 206. *Le Pap. blanc marbré de Verd.*

38) Pap. *Cardamines* Linn. no. 85. t. 51. no. 207. *L'Aurore.*

39) Pap. *Eupheno* Linn. no. 88. t. 52. no. 208. *L'Aurore de Provence.*

40) *La Diane.* t. 52. no. 209. (Der Wiener *Polixena.* v. *Esper* I. t. 15. f. 1. *Rumina.*)

41) Pap. *Rhamni* Linn. no. 206. Var. no. 205. *Cleopatra.* t. 53. no. 210. *Le Citron.*

42) Pap. *Hyale* Linn. no. 200. t. 54 no. 211. *Le Souci.*

43) Pap. *Palaeno* Linn. no. 99. t. 54. no. 212. *Le Soufre.*

44) Pap. *Morio* (*Antiopa* L.) Varietas t. 55. Suppl. I. no. 1. et 3.

45) *La Tortue moyenne.* t. 55. no. 3. bis. (Der Wiener *Xanthomelas* p. 175.)

46) Varietas Pap. *Gamma maris.* t. 55. Suite de no. 5. t. 5.

47) *Le V blanc.* t. 56. Suppl. II. no. 5. bis. (Der Wiener *Vau album* p. 176.)

48) *La Carte géographique rouge.* t. 56. no. 8. bis. (*Schaeff.* Ic. t. 132. f. 1. 2.)

49) Varietas *Foeminae.* t. 10. f. 11. c. t. 57. Suppl. 3.

50) Varieté du *petit Sylvain.* no. 13. t. 11. t. 57. Suite du no. 13. t. 11.

51) Va-

51) Varieté *mâle du Tabac d' Espagne.* no. 15. t. 12. t. 57. Suite du no. 15. t. 12.
52) *Le Cardinal.* t. 58. Suppl. IV. no. 15. bis. (Der Wiener *Pandora.*)
53) Varietates Papp. *Adippe* Linn. no. 212. et *Aglaja.* no. 211. t. 58. Suite du no. 16. t. 13.
54) Variet. du Pap. *le Chiffre.* t. 15. no. 19. t. 59. Suppl. V. (*Esper* I. t. 18. f. 1.)
55) Pap. *L' Ino*, t. 59. no. 20. bis. *neuer.*
56) Pap. *L' Agave.* t. 59. no. 20. bis. *neuer.*
57) Var. Pap. *Dia* L. no. 207. *Maris.* t. 60. Suppl. VI. Suite du no. 21. t. 15.
58) *La Palés*, grande et petite espece, t. 60. no. 21. bis. et 21. tert. (*Esper* Contin. t. 6. f. 4. 5. *Arsilache.*)

Unter diesen allen drey bis vier neue; die übrigen alle theils sehr bekannte, theils häufig abgebildete, oder blos Abänderungen. Wie vielmal muss man also eine Sache bezahlen? Hätten die Verfasser nicht besser gethan, dass sie nur auf diese Abbildungen verwiesen hätten? Dessen ohnerachtet konnten sie das, was sie für neu, und merkwürdig hielten, beybringen.

Von *Espers* Fortsetzung der europäischen Schmetterlinge, oder dessen 3ten Theile, haben wir *den ersten und zweyten Heft.*

1) Pap. Equ. Ach. *Ajax* L. no. 32. t. 51. f. 1.
2) Pap. Pl. Vrbic. *Malvae.* t. 23. Varietas. t. 51. f. 2.
3) Pap. Pl. Vrbic. *Alceae.* t. 51. f. 3. ein *neuer.*
4) Pap. Pl. Rur. *Tiphys.* t. 51. f. 4. *neuer.*

5) Pap.

5) Pap. Nymph. Phaler. *Vau album.* t. 52. f. 1. ein *neuer.*

6) Pap. Pl. Rur. *Eumedon.* t. 52. f. 2. foem. 3. Mas. *neuer.*

7) Pap. N. Gemm. *Fidia.* t. 49. Varietas. t. 52. f. 4.

8) Pap. Pl. Rur. *Amphion.* t. 53. f. 1. *neuer.*

9) Pap. N. Phal. *Rumina* L. ad t. 15. Tom. I. t. 53. f. 2. aa. Larva. b. Chrysallis. c. Imago.

10) Pap. N. Gemm. *Pronoë.* t. 54. f. 1. *neuer.*

11) Pap. N. Gemm. *Alexis.* t. 44. Varietas. t. 54. f. 2.

12) Pap. N. Gemm. *Philoxenus.* t. 54. f. 3. *neuer.*

13) Pap. Pl. Rur. *Cleobis.* t. 40. Varietas. t. 54. f. 4. a b.

14) Pap. Pl. Rur. *Hylas.* t. 45. Foemina. t. 55. f. 1.

15) Pap. Pl. Rur. *Bellargi* foeminae Varietates. t. 55. f. 2. 3. 4. f. 6. Mas. ad t. 32. Tom. I.

16) Pap. Pl. Rur. *Icari.* t. 32. Variet. t. 55. f. 5.

17) Pap. Pl. Rur. *Medon.* t. 32. Variet. t. 55. f. 7.

18) Pap. Dan. Cand. *Phicomone.* t. 56. f. 1. Mas. f. 2. Foem. *neuer.*

19) Pap. Pl. Vrbic. *Telegonus.* t. 56. f. 3. *neuer.*

20) Pap. N. Phal. *Arsilache.* t. 56. f. 4. *neuer.* f. 5. Varietas.

21) Pap. N. Gemm. *Actaea.* t. 57. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem. *neuer.*

22) Pap. Dan. Fest. *Hyperanthi.* t. 5. f. 1. Tom. I. Varietates. t. 57. f. 2. 3. 4.

23) Pap. N. Phaler. *Pandora.* t. 58. f. 1. Mas. f. 2. Foemina. *neuer.*

24) Pap. N. Phaler. *Niphe* L. no. 208. t. 58. f. 3.

25) Pap. Pl. Rur. *Amphidamas.* t. 58. f. 4. *neuer.*

26) Pap. Helic. *Mnemosyne* L. no. 51. t. 2. f. 2. Foemina. t. 58. f. 5.

27) Pap. N. Phal. *Camilla.* t. 59. f. 1.

28) Pap. Pl. Rur. *Arion.* t. 20. Varietas. t. 59. f. 2.

29) Pap.

29) Pap. N. Phal. *C album.* t. 13. Variet. t. 59. f. 3.
30) Pap. N. Phal. *Prorsa.* t. 15. Variet. t. 59. f. 4.
31) Pap. N. Phal. *Levana.* t. 15. Variet. t. 59. f. 5.
32) Pap. N. Phal. *Trivia.* t. 37. Tom. I. foem. t. 60. f. 1.
33) Pap. N. Phal. *Aglaja.* foem. t. 60. f. 2.
34) Pap. N. Phal. *Adippe* Varietas. t. 60. f. 3.
35) Pap. N. Phal. *Paphia.* t. 17. Variet. t. 60. f. 4.
36) Pap. Pl. Rur. *Phlaeas.* t. 22. Variet. t. 60. f. 5.
37) Pap. N. Phal. *Didymae.* t. 41. Variet. t. 61. f. 1.
38) Pap. N. Phal. *Diae.* t. 16. Variet. t. 61. f. 2.
39) Pap. N. Phal. *Maturna.* t. 16. foem. t. 61. f. 3.
40) Pap. N. Phal. *Corythallia.* t. 61. f. 4. foem. f. 5. Mas. *neuer.*
41) Pap. N. Phal. *Athaliae.* t. 47. Variet. t. 61. f. 6.
42) Pap. Pl. Rur. *Meleager.* t. 45. f. 2. foem. t. 62. f. 1. Mas.
43) Pap. Pl. Rur. *Hipponoë.* t. 25. f. 5. foem. t. 62. f. 2. Mas.
44) Pap. N. Phal. *L album.* t. 62. f. 3. a. maris Varietas. b. foem.
45) Pap. Pl. Rur. *Biton.* t. 33. f. 5. Mas. t. 62. f. 4. Foem.
46) Pap. Pl. Rur. *Phlaeas.* t. 21. f. 1. Mas. t. 62. f. 5.

Aus *Espers* 2tem Bande sind noch einige *Schwärmerarten* nachzuholen.

1) *Sphinx* Indiae Orient. Vulgo Var. Sph. *Celerio* L. no. 12. t. 22. f. 1.
2) Sph. *Populi* Var. t. 22. f. 2.
3) Sph. *Tiliae* Var. t. 22. f. 3.
4) Sph. *Vespertilio* t. 22. f. 4. (*Füessl.* Archiv der Entomol. t. 11. A.)
5) Sph. *Fenestrina.* t. 23. f. 1. et f. 1. *. (S. Beytr. III B. 2 Th. p. 209. no. 23.)

6) Sph. *Bombyliformis*. t. 23. f. 2.
7) Sph. *Oestriformis*. t. 23. f. 3.
8) Sph. Adsc. *Lonicerae*. t. 24. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem.
9) Sph. A. *Pilosellae*. t. 24. f. 2. a. Mas. f. 1. b. Foem.
10) Sph. A. *Scabiosae*. t. 24. f. 3. a. Mas. f. 3. b. Foem.
11) Sph. A. *Achilleae*. t. 25. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem. *neuer*.
12) Sph. A. *Peucedani*. t. 25. f. 2. *neuer*.
13) Sph. *Lonicerae*. Var. t. 25. f. 3.

Aus *Cramers* Pap. exot. Tom. III. und Tom. IV. Heft 25 bis 28 haben wir beyzubringen.

I) Zu den *trojanischen Rittern*.

A) *Linnéische*.

1) *Aeneas Cram*. III. t. 279. AB. *Mas*; CD. *Foem*.
2) *Polytes* — — t. 265. AB. *Foem*. C. *Mas*.
3) *Anchises* — IV. t. 318. AB *Mas*. CD. *Foem*.

B) *Neue*.

1) *Amosis Cram*. III. t. 269. AB.
2) *Panthonus* — t. 278. CD.
3) *Severus* — t. 277. AB. *Mas*. t. 278. AB. *Foem*.
4) *Tullus* — t. 277. CD.

II) Zu *den Griechen oder Achivern*.

A) *Linnéische*.

1) *Jason* no. 26. *Cram*. IV. t. 329. AB.

B) *Neue*.

1) *Aeilus* — — IV. t. 317. AB.
2) *Aristeus* — — — t. 318. EF.
3) *Sinon* — — — t. 317. CD. *Mas*. (S. m. *Beytr*.

m. *Beytr.* III B. 1 Th. p. 72. no. 7.) EF. *Foem.*

4) *Pherecides* no. 26. *Cram.* IV. t. 330. AB.

III) Zu den *Helikoniern.*

A) *Linnéische.*

1) *Piera* L. *Cram.* IV. t. 291. CD. *Foem.* E. *Mas.* Pap. *Vitré.*

2) *Terpsicore* — t. 298. AB. *Foem.* C. *Mas.*

3) *Cephea* — t. 298. DE.

4) *Horta* — t. 298. FG.

B) *Neue.*

1) *Eumella* — III. t. 280. D.

2) *Euritea* — t. 280. C.

3) *Liberia* — t. 268. GH.

4) *Andremona* — IV. t. 297. A.

5) *Vdalrica* — t. 297. B.

6) *Numata* — t. 297. CD.

7) *Ludovica* — t. 297. E.

8) *Equicola* — t. 297. F.

9) *Pireta* — t. 315. A. cf. *Piera* L.

10) *Diaphana* — t. 315. DE. *Foem.* t. 231. C. *Mas.*

11) *Selene* — t. 315. F. *Foem.* G. *Mas.*

12) *Pasinuntia* — t. 316. A. *Mas.* BC. *Foem.*

13) *Pamela* — t. 319. A.

IV) Zu den *Danaïden.*

A) Zu den *Weißen.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Delia* *Cram.* III. t. 273. A.

2) *Mesentina* — t. 270. AB.

3) *Aurora Cram.* IV. t. 299. AB. *Mas.* CD *Foem.*

4) *Zelmira* — t. 320. CD. *Foem.* EF. *Mas.*

B) Zu den *Bunten.*

I) *Linnéische.*

1) *Midamus Cram.* III. t. 266. AB.

2) *Cassus* — IV. t. 314. CD.

II) *Neue.*

1) *Basilissa* — III. t. 266. C. (S. *Kleem.* Beytr. I. t. 9. f. 1. 2.)

2) *Dyndima* — t. 271. GH.

3) *Eleusina* — t. 266. D.

4) *Epitus* — t. 270. C.

5) *Odilia* — IV. t. 329. CD.

6) *Basilia* — — EF.

V) Zu den *Nymphen.*

A) *Aeugigte.*

I) *Linnéische.*

1) *Orithya Cram.* IV. t. 290. AB. *Mas.* CD. *Foem.*

2) *Lena* — t. 291. AB. *Mas.* t. 198. DE. *Foem.*

3) *Leda* — t. 292. A. *Mas.* Vol. III. t. 126. CD. *Foem.*

II) *Neue.*

1) *Anna* — III. t. 281. AB.

2) *Egista* — — CD.

3) *Judiana* — t. 280. AB.

4) *Orithya* — t. 281. EF.

5) *Sabina* — IV. t. 289. AB. *Foem.* CD. *Mas.*

6) *Mermeria* — t. 289. EF.

7) *Genoveva* — t. 290. EF.

8) *My-*

8) *Mycena Cram.* IV. t. 290. F.
9) *Phedima* — t. 292. B.
10) *Arcensia* — t. 292. C.
11) *Junia* — — DE.
12) *Ebusa* — — FG.
13) *Chloris* — t. 293. AB.
14) *Myncea* — t. 293. C.
15) *Clarissa* — t. 293. DE.
16) *Camerta* — — F.
17) *Lisandra* — — GH.
18) *Arcesilaus* — — AB. *Foem.* CD. *Mas.* (v. *Fabric.* S. E. p. 484. no. 182. Pap. N. Phal. *Chorinaeus.*)
19) *Sophonisba* — t. 295. AB.
20) *Quiteria* — t. 313. AB. *Foem.* CD. *Mas.*
21) *Arete* — t. 313. EF.
22) *Otrea* — t. 314. AB.
23) *Meone* — t. 314. EF. cf. *Linn.* *Megaera* no. 142.
24) *Agnes* — t. 324. AB.
25) *Renata* — t. 326. A.
26) *Rosina* — — B.
27) *Justina* — — C.
28) *Mamerta* — — D.
29) *Francisca* — — EF.

B) Zu den *ohnäugigten geschmückten.*

I) *Linnéische.*

1) *Panope Cram.* IV. t. 294. EF.
2) *Nauplia* — t. 316. DE. *Foem.* FG. *Mas.*
3) *Polychloros* — t. 330. CD.

II) *Neue.*

1) *Ismare* — III. t. 279. EF.

2) *Columella Cram.* III. t. 296. AB.
3) *Coenobita* — t. 296. CD. (*Pallas* Reise Ausz. Anh. no. 62. Pap. Helic. *Sappho.*)
4) *Leucothoë* — t. 296. EF.
5) *Zingha* — IV. t. 315. BC.
6) *Antonoë* *) — t. 320. AB. *Mas.* t. 279. CD. *Foem.*
7) *Veronica* — t. 325. CD.
8) *Agatha* — t. 327. AB.
9) *Valentina* — — CD.
10) *Blandina* — — EF.
11) *Sulpitia* — t. 328. AB.
12) *Irenea* — — CD.
13) *Lucina* — t. 330. EF.

VI) Zu dem *Pöbel.*

A) *Bauern.*

I) *Linnéische.*

1) *Marsyas Cram.* IV. t. 332. AB.

II) *Neue.*

1) *Fatima* — III. t. 271. ABCD.
2) *Flegyas* — t. 280. EF.
3) *Iolaus* — t. 270. FG.
4) *Ladon* — t. 270. DE.
5) *Larydas* — t. 282. H.
6) *Mandana* — t. 271. EF.

7) *Mi-*

*) Nicht *Eucharis*, auch nicht *Hyparete* Linn. wie ich in meinen Beyträgen angegeben habe.

Ich danke hier dem würdigen Herausgeber aufrichtigst für die Verbesserung aller Fehler, denen ich in den entomol. Beytr. besonders in Absicht der ausländischen Schmetterlinge nicht wohl entgehen konnte, und wobey ich mich immer auf die Aussprüche anderer verlassen musste. Männer, die mit solchem Glimpf anderer Fehler verbessern, sehe ich als Lehrer und Wohlthäter an.

7) *Micylus Cram.* III. t. 282. FG.
8) *Orestes* — t. 282. AB.
9) *Palegon* — t. 284. F.
10) *Silenus* — — E.
11) *Venulius* — t. 286. G.
12) *Nedymona* — IV. t. 299. EF.
13) *Eumolphus* — t. 299. GH.
14) *Camillus* — t. 300. AB.
15) *Ebusus* — — CD.
16) *Beon* — t. 319. BC.
17) *Lajus* — — DE.
18) *Triopus* — t. 320. GH.
19) *Atymnus* — t. 331. DE.
20) *Evander* — t. 331. FG.
21) *Caranus* — t. 332. CD.
22) *Orus* — — EF.
23) *Bubastus* — — GH.
24) *Arogeus* — t. 333. AB.
25) *Phalantus* — — CD.
26) *Megacles* — — EF.
27) *Crolus* — — GH.
28) *Thasus* — — I.
29) *Syncellus* — t. 334. AB.
30) *Menander* — — CD.
31) *Thersander* — t. 335. AB.
32) *Ouranus* — — C.
33) *Epaphus* — — DE.
34) *Lamis* — — FG.
35) *Melander* — t. 336. A. *Foem.* B. *Mas.*
36) *Gelanor* — — CD.
37) *Crotopus* — — EF.
38) *Labdacus* — — GH.

B) *Städter.*

I) *Linnéische.*

1) *Peleus Cram.* III. t. 284. F.

 II) *Neue.*

II) *Neue.*

1) *Astylos Cram.* III. t. 283. AB.
2) *Aulestis* — — EFG.
3) *Chromus* — t. 284. E.
4) *Eroteas* — t. 288. CD.
5) *Creteus* — t. 284. CD.
6) *Ladon* — t. 280. G.
7) *Melander* — t. 270. H.
8) *Fantasos* — IV. t. 300. EF.
9) *Crinisus* — — GH.
10) *Adrastus* — t. 319. FG.
11) *Flyas* — t. 328. E.
12) *Otreus* — — F.
13) *Asychis* — t. 333. EF.
14) *Tryxus* — — GH.
15) *Orcus* — — IK.

VII) Zu den *Schwärmern.*

A) *Rechtmäßige.*

I) *Linnéische.*

1) *Vitis Cram.* III. t. 267. C. *Mas.* t. 268. E. *Foem.*

II) *Neue.*

1) *Achemenides* — III. t. 267. AB.
2) *Eacus* — t. 285. E.
3) *Faro* — — C.
4) *Hippotes* — t. 286. A.
5) *Hypothous* — t. 285. D.
6) *Menephron* — t. 285. A.
7) *Opheltes* — t. 285. B.
8) *Pyracmon* — t. 287. B.
9) *Rustica* — IV. t. 301. A. (Beytr. III B. 2 Th. p. 206. no. 10.)
10) *Lucetius* — IV. t. 301. B.
11) *Oenotrus* — — C.

12) *Scyron*

12) *Scyron* *Cram.* IV. t. 301. E.
13) *Neoptolemus* — — F.
14) *Alope* — — G.
15) *Pandion* — t. 321. A.

B) *Angenommene.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Heber* *Cram.* III. t. 287. A.
2) *Melanthus* — t. 286. B.
3) *Coras* — IV. t. 312. A.
4) *Meones* — t. 325. E.
5) *Nycteus* — — F.

VIII) Zu den *Attakerphalänen.*

A) *Linnéische.*

1) *Capensis* *Cram.* IV. t. 325. G. *Foem.* t. 302. A. *Mas.*

B) *Neue.*

1) *Aglaura* *Cram.* III. t. 263. F.
2) *Cyane* — t. 267. D.
3) *Lactucina* — t. 273. BC.
4) *Mirabilis* — t. 271. B.
5) *Modestia* — t. 272. CD.
6) *Zerbina* — t. 287. E.
7) *Capensis* — IV. t. 302. AB. (Von *Paphia* L. no. 4. verschieden.)
8) *Honesta* — IV. t. 302. C.
9) *Nausica* — t. 303. BC. *Mas.*
10) *Io* — — DE. *Foem.* FG. *Mas.*
11) *Calchas* — t. 303. A.
12) *Metea* — t. 304. A.
13) *Domina* — — B.
14) *Obsoleta* — — C.
15) *Canitia* — — D.

 16) *Pe-*

16) *Peregrina* *Cram.* IV. t. 305. A.
17) *Rustica* — — B.
18) *Avia* — t. 307. A.
19) *Alcinoë* — t. 322. AB.

IX) Zu den *Spinnern.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Nivea* IV. t. 321. B.
2) *Brotea* — t. 322. E.
3) *Bitia* — — F.

X) Zu den *Eulen.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Servia* *Cram.* IV. t. 321. CDE.
2) *Sergilia* — — F.
3) *Hypermnestra* — t. 323. AB.
4) *Melicerte* Var. — — CDE. cf. t. 62. CD.
5) *Mezentia* — — F.
6) *Euristea* — t. 324. A.
7) *Damonia* — — BCDE.
8) *Oculata* — — F.
9) *Ancea* — — G.

XI) Zu den *Spannern.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Panthona* *Cram.* IV. t. 322. C.
2) *Glaucopis* — — D.

In dem 1sten Probeheft von *Füeßly* Archiv der Insektengeschichte ist:

1) Beytrag zur Naturgesch. des *Mittelperlmutterfalters* Pap. *Adippe* L. Tab. I. von *Füeßl.*

2) Der

2) Der *Fledermausſchwärmer:* Sph. *Veſpertilio* von *Füeßly.* Tab. II. A.

3) *Die ſchwarze Todtenkopfraupe* (Sph. *Atropos*) Tab. III. von *Hübner* in Halle, mit Zuſätzen von *Füeßly.*

4) Der *Köchlinsſchwärmer*, Sph. *Koechlini*, von *Füeßly.* Tab. IV. A.
   Viel ähnliches mit Sph. *Galii.* Derſelbe beym *Eſper* II. t. 8. f. 4. Varietas Sph. *Celerio.*

5) Der *Trauerſchwärmer*, Sph. *Infauſta* L. no. 43. von *Füeßly* Tab. II. B.

6) Die *Perſpektivfliege: Diopſis*, Tab. V. f. 1-5.

7) Naturgeſchichte des *Silbermönchs:* Phal. *argentea* von *Herbſt*, Tab. VI.
   S. die Rezenſion dieſes Inſtituts im I St. des *Leipziger Magazins* zur Naturkunde &c. p. 138.

Ich komme nun zu einem Inſektenwerke, das der Herr Hofmeiſter bey dem Braunſchweigiſchen Karolino, *Knoch*, angefangen, und deſſen 1ten Heft unter dem Titel: Beyträge zur Inſektengeſchichte, 8. Leipzig 1781. geliefert hat. Es ſind dabey ſechs illuminirte Kupfertafeln; aber ſo fein, getreu, und vortrefflich, daſs ich ſie den *Röſelſchen* und *Seppiſchen* Zeichnungen an die Seite zu ſetzen kein Bedenken trage. Einige ſehr ſeltene Inſekten, beſonders Phalänen, ſind nicht nur *ſehr genau* beſchrieben; ſondern der würdige Herr Verfaſſer hat auch die Oekonomie und Naturgeſchichte derſelben ſo weit als möglich verfolget, und daher verſchiedene Merkwürdigkeiten, aus eigener Beobachtung und Erfahrung

bekannt gemacht, die man in manchem grossen und kostbaren Insektenwerke vergeblich sucht. Ob ich gleich diese Beyträge schon bey diesem dritten Bande des dritten Theils genutzt habe; so will ich doch den Inhalt kurz hersetzen, weil sie noch nicht in vielen Händen sind, und recht vorzüglich verdienen, bekannter zu werden.

1) Phal. Geom. *Sesquistriataria*, der *grüne Spannmesser mit anderthalb weißen Streifen*. Tab. I. f. 1. *Hufnagels Vernaria*.

2) Ph. Noct. C *aureum*, das goldene C. Tab. I. f. 2. Der *Wiener* N. *Bractea*. p. 314.

3) Ph. Geom. *Melanaria* L. no. 212. Tab. I. f. 3. der *Schwärzling*.

4) Ph. Geom. *Punctaria* L. no. 200. der *Punktstrich*. Tab. I. f. 4.

5) Ph. Geom. *Innotata*, die *Beyfußmotte*. Tab. I. f. 8. *Hufnagels Innotata*.

6) Phal. *Bombyx Eueria*, der *Wollträger*. Tab. II. f. 6. Mas. f. 7. Foem. *neu*.

7) Ph. Geom. *Albicillata* L. no. 255. der *weisse Schleier*. Tab. II. f. 8. *Raupe*.

8) Ph. Noct. *argentea*, der *silberfleckichte Mönch*. Tab. III. f. 2. *Berlin. Mag.* I B. 6 St. p. 648. Tab. Tit. *Archiv* der Entomol. t. 6.

9) Ph. Bomb. *Vidua*, die *junge Wittwe*. Tab. III. f. 3. *neu*.

10) Ph. Geom. *Lichenaria*, die *Moosmotte*. Tab. III. f. 9. Foem. *Hufnagels Lichenaria*.

11) Ph. Geom. *Pectinataria*, das *gekämmte Fühlhorn*. Tab. III. f. 10. *neu*.

12) Ph. Noct. *Dissimilis*, das *unähnliche Weibchen*. Tab. IV. f. 3. Foem. f. 4. Mas. *neu*.

13) Ph.

13) Ph. Noct. *Domiduca*, die *Sturmhaube*. Tab. IV. f. 5. *Hufnagels Domiduca*, der Wiener N. *Ianthina*.

14) Ph. Bomb. *Velitaris*, die *Segelmotte*. Tab. IV. f. 8. *Hufnagels* Velitaris.

15) Phal. Tin. *Perlella*, die *Perlmotte*. Tab. IV. f. 6. *Scop*. Perlella p. 243. no. 620.

16) Ph. Tin. *Pinetella*, die *Fichtenmotte*. Linn. no. 358. Tab. IV. f. 7.

17) Pap. Pleb. Vrbicola *Silvius*, der *Silvius*. Tab. V. f. 1. 2. *neu*.

18) Pap. Nymph. Phal. *Arsilache*, die *Arsilache*. Tab. V. f. 3. 4. *Espers* Arsilache I. t. 56. f. 5.

19) Pap. Pl. Rur. *Optilete*, das *Gelbauge*. Tab. V. f. 5. 6. *neu*.

20) Curculio *Albinus* L. no. 79. die *Weisstirn*. Tab. VI. f. 1-7.

21) Curculio *Nebulosus* L. no. 84. die *Wolkendecke*. Tab. VI. f. 8-11.

*Pallas* hat abermal ein neues Insektenwerk angefangen, das sein Name schon empfiehlt, und dem Gründlichkeit und Genauigkeit den Werth geben. Der Titel ist:

Icones Insectorum, praesertim Rossiae Sibiriaeque peculiarium, quae collegit et descriptionibus illustravit —

Fasc. I. mit 3 illuminirten Kupfertafeln.

Es werden in allem 4 Hefte mit 13 Platten werden, und jede Ausgabe kostet 2 Rthl.

In dem *ersten Hefte*:

1) *Lucanus* apterus t. A. f. 1. a b c. (S. m. Beyträge I. p. 116.)

2) Scar. *Moeris* t. A. f. 2. *neu*.

3) Scar.

3) Scar. *Mopsus.* t. A. f. 3. (differt a *Voet.* t. 26. f. 28. et *Schaeff.* Ic. t. 3. f. 7.)
4) Scar. *Menalcas.* t. A. f. 4. a b. (Beytr. I. p. 70.)
5) Scar. *Bonasus.* t. A. f. 5. (Beytr. I. p. 69.)
6) Scar. *Gibbulus.* t. A. f. 6. (*Geoffr.* I. p. 90. no. 5.)
7) Scar. *Scriptus.* t. A. f. 7. (Beytr. I. p. 100.)
8) Scar. *Ammon.* t. A. f. 8. AB. (Beytr. I. p. 116.)
9) Scar. *Tenebrioïdes.* t. A f. 9. *neu.*
10) Scar. *Pectinatus.* t. A. f. 10. (*Fabric.* Ent. App. p. 818. *Trox* horridus.)
11) Scar. *Morticinii.* t. A. f. 11.
12) Scar. *Coccinelloïdes.* t. A. f. 12. (Scar. *bimaculatus* Laxm. S. Beytr.)
13) Scar. *bimucronatus.* t. A. f. 13. *neu.*
14) Scar. *oxypterus.* t. A. f. 14. a b. (Beytr. I. p. 114. no. 230. p. 96. no. 125. p. 106. no. 181.)
15) Scar. *Alopecias.* t. A. f. 15. a. b. (Linn. Scar. *Syriacus:* Muſ. reg. p. 24. S. N. ed. 12. no. 56.)
16) Scar. *Arctos.* t. A. f. 16. *neu.*
17) Scar. *Bombyliformis.* t. A. f. 17. *neu.*
18) Scar. *Albellus.* t. A. f. 18. (Beytr. I. p. 114. no. 231. p. 111. no. 214.)
19) Scar. *Succinctus.* t. A. f. 19. *neu.*
20) Scar. *Aureolus.* t. A. f. 20. *neu.*
21) Scar. *Hololeucus.* t. B. f. A. 21. (Beytr. I. p. 114. no. 233.)
22) Scar. *Testaceus.* t. B. f. A. 22. *neu.*
23) Scar. *Hemisphaericus.* t. B. f. A. 23. *neu.*
24) Scar. *Cruentus.* t. B. fig. A. 24. *neu.*
25) Curculio *Varicosus.* t. B. f. 1. *neu.*
26) Curc. *Rynchoceros.* t. B. fig. 2. *neu.*
27) Curc. *Piceus.* t. B. fig. 3. (Beytr. I. p. 384. n. 67.)
28) Curc. *Anomaloceps.* t. B. fig. 4. (An Linn. Curc. *disparis:* Muſ. reg. p. 50. Varietas?)
29) Curc. *Inderiensis.* t. B. fig. 5. (Beytr. I. p. 402. no. 35. p. 399. no. 14.)

30) Curc. *Nomas.* t. B. fig. 6. (Beytr. I. p. 384. no. *66.*)
31) Curc. *Candidatus.* t. B. fig. 7. Beytr. I. p. 402. no. 33.)
32) Curc. *Roridus.* t. B. fig. 8. *neu.*
33) Curc. *Cenchrus.* t. B. fig. 9. *neu.*
34) Curc. *Tetragrammus.* t. B. fig. 10. (*Lepech.* Reiſ. II. App. p. 329. t. 11. fig. 28.)
35) Curc. *Tribuloïdes.* t. B. fig. 11. *neu.*
36) Curc. *Nigrivittis.* t. B. fig. 12. *neu.*
37) Curc. *Vibex.* t. B. fig. 13. *neu.*
38) Curc. *Gibber.* t. B. fig. 14. *neu.*
39) Curc. *Carioſus.* t. H. fig. B. 15. *neu.*
40) Curc. *Feneſtratus.* t. H. fig. B. 16. *neu.*
41) Curc. *Flaviceps.* t. B. fig. 17. (*Lepech.* Reiſ. II. App. p. 327. t. 2. fig. 27.)
42) Curc. *Pictus.* t. H. fig. B. 18. (*Pall.* Reiſ. I. App. p. 463. no. 33.)
43) Curc. *Hololeucus.* t. H. fig. B. 19. *neu.*
44) Curc. *Tenebrioïdes.* t. B. fig. 20. (*Friſch* XIII. p. 28. t. 26. *Schaeff.* Ic. t. 62. fig. 11.)
45) Curc. *Albator.* t. B. fig. 21. *neu.*
46) *Mylaris gigantea.* t. C. fig. 1. (*Linn.* Tenebr. *Gigas.* S. N. ed. 12. p. 674. no. 1.)
47) Myl. *Gibboſa.* t. C. fig. 2. *neu.*
48) Myl. *ſpecioſa.* t. C. fig. 3. (Cf. *Schäff.* Ic. t. 51. fig. 3.)
49) Myl. *Violacea.* t. C. fig. 4. *neu.*
50) *Tenebrio auritus.* t. C. fig. 5. a b. *neu.*
51) Ten. *Pterygodes.* t. C. fig. 6. (*Fabr.* Ent. p. 252. no. 9. *Pimelia* reflexa. *Forsk.* Anim. p. 79. no. 9. Tenebr. *vulgaris.* S. Beytr.)
52) Ten. *Setoſus.* t. C. fig. 7. *neu.*
53) Ten. *Nomas.* t. C. fig. 8. (Beytr. I. p. 689. n. 15.)
54) Ten. *Longicornis.* t. C. fig. 9. (An *Pimelia* anguſtata *Fabr.* Ent. p. 253. no. 13?)

35) Ten.

55) Ten. *Hypolithus.* t. C. fig. 10. (*Geoffr.* I. p. 351. no. 8. An Linn. *Latipes* S. N. ed. 12. p. 678. no. 30?)

56) Ten. *Glandiformis.* t. C. fig. 11. a b. (Beytr. I. p. 688. no. 6.)

57) Ten. *Gibbus.* t. C. fig. 12. *neu.*

58) Ten. *Caspicus.* t. C. fig. 13. *neu.*

59) Ten. *Muricatus.* t. C. fig. 14. (Beytr. I. p. 674. no. 17.)

60) Ten. *Cephalotes.* t. C. fig. 15. (Beytr. I. p. 674. no. 16.)

61) Ten. *Subglobosus.* t. C. fig. 16. (Beytr. I. p. 677. no. 28. p. 688. no. 10.)

62) Ten. *Torulosus.* t. C. fig. 17. *neu.*

63) Ten. *Costatus.* t. C. fig. 18. *neu.*

64) Ten. *Pubescens.* t. C. fig. 19. (An Linn. Ten. angulatus S. N. ed. 12. p. 677. no. 22?)

65) Ten. *Leucographus.* t. C. fig. 20. (Beytr. I. p. 684. no. 4.)

66) Ten. *Spinimanus.* t. C. fig. 23. (An Linn. Ten. gigas no. 14?)

67) Ten. *asperrimus.* t. H. fig. C. 22. *neu.*

68) Ten. *Laticollis.* t. H. fig. C. 21. *neu.*

Wir danken übrigens diesem unserm Lehrer ebenfalls öffentlich für alle Berichtigungen unserer Beyträge, und freuen uns, daſs wir dadurch solchen Kennern Anlaſs gegeben haben, viele Verwirrungen zu heben, die wir aufzulösen nicht im Stande waren.

⁂ ⁂ ⁂

In des Franc. de Paula *Schrank* Enumeratio Insectorum, Austriae Indigenorum c. figur. 8. Aug. Vindel. 1781. liefert der Verfaſſer 1127 Insekten-

Insektenarten nach einer systematischen Beschreibung, mit beygefügtem Maaß der Grösse, auch Anzeige der Oerter, wo er sie in Oesterreich gefunden. Die Schmetterlinge hat er übergangen, weil wir die Beschreibung derselben von *Schiffermüller* zu erwarten haben. Sein Werk zeuget von vielem Fleiß und Genauigkeit eines sehr erfahrnen Forschers der Natur. S. Leipziger Magazin zur Naturkunde von Funk, Leske und Hindenburg, I St. p. 150.

Wir fügen diesem bey

Ioh. Chr. *Fabricii* Species Insectorum exhibentes eorum differentias specificas, Synonyma Auctorum, loca natalia, metamorphosin, adiectis observationibus, descriptionibus, Tom. I. 8. Hamb. et Kilonii.

In diesem Werke sind die in den verschiedenen Schriften des Verfassers zerstreuten neuentdeckten Insekten zusammengetragen, und viele Gattungen fast um die Hälfte mit neuen Arten vermehrt: auch verschiedene im System eingeschlichene Fehler verbessert. Das übrige s. im Leipz. Magaz. I St. S. 126 ff.

Ferner gehöret hieher

Iohann Nepomuk von *Laicharting* zu Eichberg und Lüzelgnad, tyrolischen Landmanns, Verzeichniß und Beschreibung der *Tyroler Insekten* I Theil, käferartige Insekten, I Band, Zürich, bey Füeßly 1781. 8.

Der Verfasser macht *zehn Ordnungen* von Insekten.

1) *Scaraboïdes*, käferartige.

2) *Grylloïdes*, grillenartige.

3) *Cimicoïdes*, wanzenartige.
4) *Papilionoïdes*, schmetterlingartige.
5) *Libelloïdes*, wasserjungfernartige.
6) *Vespoïdes*, wespenartige.
7) *Muscoïdes*, fliegenartige.
8) *Cancroïdes*, krebsartige.
9) *Aranoïdes*, spinnenartige.
10) *Oniscoïdes*, asselartige.

Jeder sind die Geschlechtskennzeichen beygefügt, und jeder grossen Ordnung wird ein Theil gewidmet seyn, der nach den Umständen wieder mehrere Bände begreifen wird.

In dieses Iten Theiles Item Bande ist die erste Ordnung der Tyroler *käferartigen* Insekten beschrieben. Es kommen hier folgende *Geschlechter* vor:

I. *Lucanus*, *Schrotkäfer*.

Dabey vier *Linnéische* Arten: Cervus; Parallelepipedus; Caraboïdes; Cylindricus.

Bey dem *ersten* macht der Verf. eine artige Erfahrung bekannt, welche die *Röselsche* Meynung, dass die mit kurzen Kinnladen die *Weibchen* der mit langen Oberkinnladen sind, begünstiget. Er hat von jenen 2, und von diesen 3 in eine Schachtel eingesperrt, und bey Eröffnung derselben 2 von der ersten Gattung mit 2 von der letzten *gepaart* gefunden.

Der walzenförmige Schrotkäfer macht den *füglichsten Uebergang* zu den *Dungkäfern*.

II. *Scarabaeus*, *Dung* (Mist) *käfer*.

Dabey 17 *Linnéische* nebst einigen andern bekannten, und drey *neue*.

*Nasicornis*, dessen *Weibchen Forsteri* nov. Sp. Ins. Cent. 1. p. 1. no. 1. Scar. *Excavatus*.

Ster-

*Stercorarius; Vernalis; Fossor*; dieser nicht immer gleich gross; vielleicht *Scop.* Scar. *oblongus.*

*Fimetarius;* dessen Griseus hält er für eine eigene Art. no. 7. *Conspurcatus:* noch eher eine Varietät des Fimetarii. *Tessulatus:* keine Abänderung des Fimetarii. *Sacer:* in den wärmern Theilen Tyrols sehr gemein.

*Lunaris;* das untrüglichste Kennzeichen die vom *Linné* angegebene *Längsfurche* des Brustschildes.

*Armiger*, Scop. Ann. 5. H. N. p. 78. n. 16. *Taurus; Vacca; Nuchicornis; Thoracocircularis*, Schäff. Ic. t. 74. f. 6? der *rundbrüstige Dungkäfer Schreberi:* die Schaeffersche Abb. Ic. t. 73. f. 6. kömmt mit der Linn. Beschr. nicht genau überein. Er hat vier abgesonderte rothe Flecke auf den Flügeldecken, nicht aber, wie beym *Schäffer*, zwey rothe Bänder. Wie oft aber haben Sch. Malereyen schon getäuscht?

*Ovatus: Vitulus* Fabric. Mant. p. 209. no. 101-102. Nicht Linn. Vacca; eher *Geoffr.* I. p. 90. Copris. 5. *Bousier à deux cornes.*

Der *neuen sind drey.*

1) Scar. *Ictericus*, der *gelbsüchtige Dungkäfer.* Niger, elytris flavis. Im Kuhkoth gemein.

2) Sc. *Verticicornis*, der *scheitelhörnige Dungkäfer.* Totus niger, verticis spina erecta. Im Kuhkoth etwas selten.

3) Sc. *Quadrituberculatus*, der *vierhökrige Dungkäfer.* Subtus tomentosus obscurus. Auf dortigen Viehweiden häufig.

III. *Trox*, *Erdstaubkäfer.* Le *Sablieur.*

1) Trox *sabulosus* Linn. nicht Scop. *rugosus;* denn dieser ist Sc. Taurus Linn. und Scop. *Illyricus.*

2) Trox *hispidus.* Pontopp. N. G. v. D. p. 199. no. 19.

3) Trox *barbosus*, der *bärtige Erdstaubkäfer.*

Ein *neuer.* Nigrescens. Im Sommer des Abends bey Hunderten, setzen sich an die Blanken, die gemeinsten in Tyrol.

4) Trox *holosericeus Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 77. no. 15. der *sammetne Erdstaubkäfer.*

IV. *Melolontha*, der *Laubkäfer.*

1) *Vulgaris* Sc. Melol. *Linn.* Man findet sie mit *rothbraunem und schwarzem Brustschilde* in fettem und steinichtem Erdreiche zugleich.

2) *Solstitialis* L. im Tyrolischen *Brachkäfer;* sehr haaricht; hängt sich gern an die Kornähren, und bestätiget *Lentins* Meynung, dass er das *Mutterkorn* verursache.

3) *Dubia* Scop. E. C. p. 3. no. 4. Nicht zwey Exemplare einander gleich. Eine Abänderung tota obscure-violacea. In *Lauis* (Lugano) oft im Julius so häufig, dass sie fast alles Weinlaub abfressen. *Frisch* hat ihn daher nicht ohne Ursache *Weinblattkäfer* genannt.

4) *Agricola* L. 5) *Horticola* L.

6) *Floricola*, *Blumenlaubkäfer.* Ein *neuer.* Auf Heraclium Sphondilium, und Achillea Millefol. L. Subpilosa nigra, elytris griseis. Cf. *Füeßl.* Verz. p. 3. no. 37. *Fabric.* S. E. p. 38. no. 30. *Geoffr.* I. p. 80. no. 15. *Derselbe* nach *Füeßl.* Anzeige.

7) *Argentea*, der *übersilberte Laubkäfer.* Scar. *farinosus* L. Auf *Weiden* sehr gemein. Der grüne Staub unter dem Vergrösserungsglase perlmutterfarbige runde Bläschen.

V. *Trichius*, der *Schirmblumenkäfer.* Le *Chevilliard.*

1) Tr. *fasciatus* L. no. 70. Auf allen *Umbellen.*

2) *Hemipterus* L. no. 63. das Weibchen grösser, ganz schwarz; der After endigt sich in einen an der Spitze sägeförmigen Legestachel.

VI. *Cetonia*, der *Metallkäfer.* La *Cetoine.*

1) Cet. *aurata* L. no. 78. Am *zweyten* Gliede des Hinterleibes zwo ausgehende Spitzen.

2) C.

2) C. *Sticfica* L. no. 54. Das Männchen unterscheidet sich durch die mindere Grösse, und eine Reihe von vier weissen Flecken, die in der Mitte der Bauchringe hinunterlaufen. Dies sind eben die vier Flecke, die Stoff zur Verwirrung geben. Man beobachtete sie an einigen, und vermisste sie an andern. Die *erstern* nannte L. Variabilis; die letztern Sticticus. Es sind nicht zwo Arten, da sie der Verf. beyde oft in Copula angetroffen, und hat dadurch meine Muthmassung Beytr. I. p. 50. gerechtfertiget. Aus *Rösel* II. Vorber. gehört nur p. 27. Tab. B. f. 5. und sonst nichts hieher. *Schäff.* Ic. t. 98. f. 8. ist sehr unnatürlich.

3) C. *hirta*, L. *hirtellus*, no. 69. dem Sticfico sehr ähnlich; aber doch hinlänglich unterschieden.

VII. *Hister*, *Stutzkäfer*.

1) *Unicolor* L. no. 3.
2) *Quadrimaculatus* L. no. 6.
3) *Bimaculatus* L. no. 5.
4) *Pygmaeus* L. no. 4.

VIII. *Dermestes*, *Speckkäfer*.

1) *Lardarius* L. no. 1.
2) *Murinus* L. no. 18.
3) *Undatus* L. no. 3.
4) *Pellio* L. no. 4. Bey diesem die Gestalt der Fühlhörner sehr ungleich.
5) *Fumatus Fabric.* S. E. p. 57. no. 12. In Häusern und auf verschiedenen Blumen. Schwerlich Linn. *fumatus* no. 22.
6) *Vini*, *Weinspeckkäfer*. In den *Weinkellern* häufig, besonders an dem mit Wein befeuchteten Holz.

Testaceus exiguus.

Nach ihrem ganzen Habitus habe ich diese immer für Abänderungen des Ptinus fur, oder selbst für den Pt. *Germanus* L. no. 6. gehalten. *Goeze.*

IX. *Bostrichus*, *Kaputzkäfer.*

1) B. *Typographus*, D. Linn. no. 7.

Von der besondern Oekonomie und Kolonien dieser Käfer unter alten Borken hoffe ich noch einmal einige Bemerkungen mitzutheilen, weil ich davon merkwürdige Stücke besitze. *Goeze.*

Der Verf. hat Recht, dass *Sulzers* Abb. von dem Typogr. nicht mit dem eigentlichen Borkenkäfer übereinkomme. Sie sind walzenförmig, und der Brustschild länglicht.

2) *Piniperda*, L. D. no. 11.

3) B. *pectinatus*, der *gekämmte Kaputzkäfer.*

Niger; antennis pectinatis, sat longis. Ein *neuer.* Weil die Flügeldecken ganz, und nicht abgestumpft sind, kann es L. D. *Microgr.* nicht seyn.

X. *Cistela*, der *Fugenkäfer.*

1) *Pillula;* L. *Byrrhus* no. 4. Auf den Flügeldecken schwarz und goldgelb unterbrochene *Lineolae*, nicht Fasciae.

2) C. *varia Fabric.* S. E. p. 60. no. 2.

3) C. *Aenea Fabric.* l. c. no. 3.

XI. *Byrrhus*, *Knollkäfer.* La *Vrillette.* *)

1) *Scrophulariae* L. no. 1.

2) *Verbasci* L. no. 3.

XII. *Ptinus*, *Bohrkäfer.* La *Panache.*

1) *Fur* L. no. 5.

2) *Rufovillosus Degeer* IV. p. 230. no. 2.

XIII.

*) Ist es schon erwiesen, dass diese Käfer wie die *Ptinen* (Vrillettes) und ihre Larven sich durch alles durchbohren?

XIII. *Sphaeridium*, der *Halbkugelkäfer*.

Sphaerid. *Fabric.* Dermestes *Linn. Geoffr.* Anthribus *Geoffr.* Silpha *Linn.* Coccinella *Linn.*

1) *Scaraboïdes* L. no. 17. Schwerlich *Scop.* Derm. Scaraboïdes E. C. p. 18. no. 36.

2) *Unipunctatum* L. Cocc. no. 6.

3) *Atomarium* L. Silpha no. 35.

4) *Haemorrhoïdale Geoffr.* Antrib. no. 5.

5) *Xantopterum Fabric.* Sphaer. *minutum?* no. 8.

XIV. *Silpha*, *Aaskäfer*.

1) *Vespillo* L. no. 2. Oft auf den Blumen, am liebsten auf den Gipfeln von Bromus, Dactilis, Aira, und andern Grasarten. (Vielleicht die kleinere Art.)

2) *Littoralis* L. no. 11.

3) *Abscissa*, der *abgestutzte Aaskäfer*.

Atra, apice elytrorum truncato. Nur halb so groſs als der Littoralis. Ein *neuer*.

4) *Sinuata*, der *geschwänzte*, *Geoffr.* I. p. 120. no. 2.

5) *Thoracica* L. no. 13.

6) *Quadripunctata* L. no. 14.

7) *Atrata* L. no. 12. *)

8) *Laevigata Geoffr.* I. p. 122. no. 8.

9) *Obscura* L. no. 18. *Schäff.* t. 93. f. 5?

10) *Tyrolensis*. Auf den feuchten Wiesen in den Thälern der Tyroler Eisberge.

Nigra, elytris castaneis. Ein *neuer*.

11) *Rugosa* L. no. 16. **)

12) *Opaca* L. no. 15.

XV. *Ostoma*, *Beinkäfer*.

1) *Rubicunda* L. Silpha ferruginea no. 19.

2) *Ferruginea Fabric.* S. E. p. 77. no. 3.

 3) *Bi-*

*) Zu dem Schäff. Citato Icon. t. 93. f. 5. hat mich *Füeſsl.* Verz. p. 6. verleitet, und nach ihm soll f. 6. S. *opaca* seyn.

**) *Degeer* Tom. IV. p. 182. no. 7. hat bey seinem Bouclier raboteux selbst diese Rugosam Linn. citirt. Doch habe ichs nachher eingesehen, daſs er Unrecht hatte.

3) *Bipustulata* L. no. 4.
4) *Colon* L. no. 27.
5) *Discoidea Fabric.* S. E. p. 78. no. 5.

XVI. *Cassida*, *Schildkäfer*.

1) *Canaliculata*, der *hohlgerandete Schildkäfer*. Nigra, supra rubra, marginibus thoracis elytrorumque canaliculatis. An einer Gartenmauer. Der gröſste von allen. Ein *neuer*.
2) *Affinis* Fabric. S. E. p. 88. no. 3. Wir geben dem Verf. Recht, daſs das Frischische Citat eher zu diesem, als zu *Viridis* zu ziehen sey.
3) *Viridis* L. no. 1. Die Erfahrung, daſs die grünen Schildkäfer im Tode grün bleiben, hebt meine Vermuthung auf, daſs *Viridis* und *Nebulosa* einerley Arten wären.
4) *Fusca*, der *braune*; in der Gröſse des grünen: Nigra, supra fusca. Ein *neuer*.

XVII. *Coccinella*, *Sonnenkäfer*.

1) C. 2-*punctata* L. no. 7.
2) C. 5-*punctata* L. no. 11.
3) C. 7-*punctata* L. no. 15.
4) C. 8-*punctata* L. no. 14. *Linné* hat das *Weibchen* beschrieben, und des Staatsr. *Müllers* C. 6-*punctata* Pr. Z. D. no. 622. ist das *Männchen*. Der Verf. hat sie in der Begattung angetroffen.
5) *Notata* Fabric. Mant. p. 217. Cocc. 7-*maculata*.
6) *Constellata*, der *gestirnte*. Nigra, elytris punctis septem. Eine *neue*.
7) *C. 20-punctata* L. 26?
8) *C. Conglobata* L. no. 30.
9) *C. Tetragonata*, der gewürfelte L. C. 14-*punctata*. no. 14.
10) *Conglomerata* L. no. 31. Hieher meine Citata aus *Müller* und *Scop.* bey der vorigen.
11) *Ocellata* L. no. 3.
12) *Oblongoguttata* L. no. 38.

13) 10-

13) 10-*guttata* L. no. 33.
14) 14-*guttata* L. no. 34.
15) 2-*pustulata* L. no. 42.
16) 4-*pustulata* L. no. 43.
17) 6-*pustulata* L. no. 44.
18) 10-*pustulata* L. no. 45.
19) 14-*maculata* L. no. 46.

XVIII. *Chrysomela*, *Blattkäfer*.

1) *Chr. Tenebricosa.* L. *Tenebrio* laevigatus no. 29? Das Frischische Citat bey *Geoffroi* XIII. p. 27. t. 22. stellt nicht diese, sondern den Carabus Spinipes L. vor.
2) *Chr. Coriaria*, der *lederartige Blattkäfer*. Nicht Chr. Göttingensis L. aber vielleicht *Fabric.* Chr. Götting., da er bey der Tenebricosa sagt: Statura et summa affinitas Chr. Gött. at *triplo major*.
3) *Chr. Metallica*, der *metallfarbige*. Ein *neuer*, nur Fabric. *Cuprea* S. E. p. 96. no. 10. etwas ähnlich.
4) *Chr. Goettingensis* L. no. 4. Das Röselsche Citat II. 3 Kl. t. 5. gehört nicht hieher.
5) *Chr. Haemoptera* L. no. 11.
6) *Chr. Viridula* L. Faun. Su. ed. 2. no. 520.
7) *Chr. Versicolora Scop.* E. C. p. 72. no. 224. Coccin. *Vitellinae*. Vermuthlich Linn. Chr. *aenea* no. 8.
8) *Chr. Populi* L. no. 30.
9) *Chr. Staphylaea* L. no. 26.
10) *Chr. Polita* L. no. 27.
11) *Chr.* 10-*punctata* L. no. 32.
12) *Chr. Pallida* L. no. 25. Leicht mit dem Derm. *Fumatus* zu verwechseln. Auch nicht Geoffr. *Crioceris* I. p. 243. no. 6. Es ist kein *Crioceris*.
13) *Chr. Polygoni* L. no. 24. Bey *Schäff.* Ic. t. 51. f. 5. die *grüne*; und t. 173. f. 4. a. b. die *blaue* Art.

14) *Chr. Fastuosa* L. no. 18. Nahe mit der *Speciosa* L. verwandt.

15) *Chr. Sanguinolenta* L. no. 38. Durchaus nicht Scop. *Buprestis* Sanguinolenta. Scop. versteht allemal durch *Buprestis* einen Cryptocephalus des Geoffroi.

16) *Chr. Marginata* L. no. 39. *Sulzers* Gesch. t. 3. f. 10. Chr. *marginata* nichts als eine Chrys. sanguinol.

17) *Chr. Marginella* L. n. 40.

18) *Chr. Betulae* L. no. 10. Nicht Scop. Cocc. *Betulae*, sondern Riparia no. 223.

19) *Chr. Vitellinae* L. no. 23. Dies Scop. Cocc. *erratica* no. 226.

Um dieses Geschlecht hat der Verf. grosse Verdienste, und viele Verwirrungen glücklich gehoben, auch eben so viele falsche Zitata berichtiget.

XIX. *Clytra*, *Sägekäfer.*

Chrysomela *Linn.* Melolontha *Geoffr.* Cryptocephalus *Fabric.* Buprestis *Scopoli.*

1) *Cl. Longipes* Fabric. S. E. p. 105. no. 1.

2) *Cl. Quadripuncta* L. no. 76.

3) *Cl. Rubicunda Geoffr.* I. p. 196. no. 2.

4) *Cl. Tridendata* L. no. 73.

XX. *Cryptocephalus*, *Fallkäfer. Le Gribouri.*

Cryptocephalus *Geoffr. Fabric.* Chrysom. *Linn.* Buprestis *Scopoli.*

1) *Cr. Sericeus* L. no. 86.

2) *Cr. Violaceus Geoffr.* I. p. 23. no. 1.

3) *Cr. Coryli* L. no. 88.

4) *Cr. Signatus* Scop. no. 207.

5) *Cr. 6-punctatus* L. no. 92.

6) *Cr. Imperialis*, der *kaiserliche.* Niger, elytris stramineis. Ein *neuer*, in der Grösse des Coryli.

7) *Cr. Podae* Muſ. gr. p. 28. no. 9.
8) *Cr. Limbatus* Scop. no. 203.
9) *Cr. Hieroglyphicus* Schäff. Ic. t. 114. f. 6. a b?
10) *Cr. Frenatus*, der *gezäumte.* Niger, thorace luteo ſtriato. Ein *neuer.* Auf Weiden ſehr gemein.
11) *Cr. Triſtis*, der *Traurige.* Niger, maculis duabus luteis thoracis. Ein *neuer.* Auf Weiden.

XXI. *Crioceris*, *Schnurrkäfer.*

Crioceris *Geoffr. Fabric.* Chryſomela *Linn.* Attelabus *Scopoli.*

1) *Cr. Merdigera* L. no. 97.
2) *Cr. 12-punctata* L. no. 110. *Spargelkäfer.*
3) *Cr. Campeſtris* L. no. 113.
4) *Cr. Melanopa* L. no. 105.

XXII. *Adimonia*, der *Forchtkäfer.*

Galeruca *Geoffr.* Chryſomela *Linn. Fabr.*

1) *Adim. Tanaceti* Linn. no. 5. Hieher *Röſel* II. 5 Kl. p. 15. t. 5.
2) *Adim. Violacea Geoffr.* I. p. 254. no. 6.
3) *Adim. Polygonata Geoffr.* I. p. 224. no. 5.
4) *Adim. Verna*, der *Frühlings-Forchtkäfer.* Tomentoſa teſtacea. Ein *neuer.* Auf verſchiedenen Stauden, beſonders auf dem Viburnum lantana L.

XXIII. *Altica*, *Hüpfkäfer.*

Chryſomela *Linn.* Altica *Geoffr. Fabr.* Chryſomela *Fabric.*

1) *Altic. Hyoſcyami* L. no. 54.
2) *Altic. Voluta*, der *gerollte.* Nur einmal auf *Taubneſſeln.* Tota teſtacea nitida. Ein *neuer.*
3) *Altic. Exoleta* L. no. 59.
4) *Altic. Rufipes* L. no. 65.
5) *Altic. Nitidula* L. no. 60.
6) *Altic. Nemorum* L. no. 62.
7) *Altic. Atra* Geoffr. I. p. 247. no. 8.

XXIV. *Curculio*, *Rüsselkäfer*.

1) *Curc. Germanus* L. no. 58.

2) *Curc. Gemmatus Scop.* no. 90.

3) *Curc. Vagus* Geoffr. I. p. 282. no. 10. Scop. Curc. *tristis* no. 94. kömmt ihm am nächsten.

4) *Curc. Cupreus* Scop. no. 94. C. *infidus?*

5) *Curc. Anthracinus* Scop. no. 92.

6) *Curc. Argentatus* L. no. 73. *Sulzers* Anführungen aus Schäffers Entom. t. 86. alle irrig. Kein Mylatris.

7) *Curc. Viride aeris*, der *Berggrüne*. Auf wilden Kastanien. Ein *neuer*.

Totus viridis.

8) *Curc. Fuscus* Schäff. Ic. t. 163. f. 6.

9) *Curc. Excavatus*, der *Ausgehöhlte*. In Wäldern. Ein *neuer*.

Niger, punctis excavatis striatus fulvo-maculatus.

10) *Curc. Abietis* L. no. 57. et no. 19. *Pini*.

11) *Curc. Longipes*, der *Langfuß*. Nur einmal am Stamme eines Taxbaums. Ein *neuer*.

Longirostris murinus, pedibus anterioribus longissimis.

12) *Curc. Mutilatus*, der *gestümmelte*. Auf einer Hangbutenstaude. Ein *neuer*.

Supra ater subopacus, subtus niger elytris abbreviatis.

13) *Curc. Violaceus* L. no. 63.

14) *Curc. Granarius* L. no. 16.

15) *Curc. Lapathi* L. no. 20.

16) *Curc. Punctatus* Geoffr. I. p. 279. no. 5.

17) *Curc. Pericarpius* L. no. 31. Der *Kernbehälterrüsselkäfer*.

18) *Curc. Scrophulariae* L. no. 61.

19) *Curc. Paraplecticus* L. no. 34.

20) *Curc. Colon* L. Mant. p. 531.

21) *Curc*

21) *Curc. Pollinis*, der *Blumenstaubrüsselkäfer.* Auf der Berberis communis L. nicht selten. Ein *neuer.* Nigrescens, maculis albescentibus pilosis.

22) *Curc. Purpureus* L. no. 14.

23) *Curc. Flavipes* Geoffr. I. p. 272. no. 8.

24) *Curc. Sulcirostris* L. no. 85.

25) *Curc. Bilineatus* Sch. Ic. t. 155. f. 2.

26) *Curc. Viridis* L. no. 76.

XXV. *Rhinomacer*, der *Afterrüsselkäfer.*

Rhinomacer *Geoffr.* Curculio *Linn. Fabric.* Attelabus *Linn. Fabric.* Curculio *Scopoli.*

1) *Rhin. Bacchus* L. no. 38. Hieher die meisten Zitata bey C. *purpureus.*

2) *Rhin. Betulae* L. no. 39. *Frisch* XII. p. 17. t. 8. 2 Pl. ist wohl C. *Bacchus.*

3) *Rhin. Coryli* L. Attel. 1. Hieher gehöret mit Recht auch Attel. Avellanae L.

4) *Rhin. Curculionoïdes* L. Att. 3.

XXVI. *Attelabus*, der *Bienenkäfer.*

Attelabus *Linn.* Clerus *Geoffr. Fabric.* Notoxus *Fabr.*

1) *Attel. Apiarius* L. Att. 10. Dessen Larve in dem Neste der Mauerbienen, und nährt sich von den Bienenmaden.

2) *Attel. Formicarius* L. Att. 8.

3) *Attel. Mollis* L. no. 11.

4) *Attel. Geoffroyanus:* L. Derm. violaceus no. 13.

So weit gehet des ersten Bandes erster Theil dieses vortrefflichen Buchs. Ich habe darum einen so weitläuftigen Auszug daraus gemacht, weil ich noch kein Insektenwerk kenne, worinnen mehr Genauigkeit, Gründlichkeit, und auf Erfahrungsgründen beruhende Berichtigung vieler Verwirrungen, auch mehr Bescheidenheit und Wahrheitsliebe wäre, als in die-

sem.

ſem. In dieſem mehr litterariſche, entomologiſche Kenntniſs, im *Schrank* etwas mehr eigentliche Naturgeſchichte. Beydes ein Paar der trefflichſten Bücher zur Entomologie.

* * *

Ein eben ſo wichtiges Werk für die Thier- Inſekten- und beſonders für die *Wurmgeſchichte* iſt folgendes:

*Fauna Groenlandica:* Syſtematice ſiſtens Animalia *Groenlandiae occidentalis*, hactenus indagata, quoad nomen ſpecificum, triviale, vernacalumque, Synonyma Auctorum plurium, Deſcriptionem, Locum, Victum, Generationem, Mores, Vſum, Capturamque ſinguli, prout detegendi occaſio fuit, maximaque parte ſecundum *proprias obſervationes Othonis Fabricii*, Miniſtri Evangelii, quondam Groenlandis ad Coloniam Friederichshaab, poſthac Norvagis Drangedaliae, nunc vero Danis Hopunti Jutiae, Membri Societatis Scientiarum, quae eſt Hafniae. 8. Hafniae et Lipſiae 1780.

Ein würdiger Schüler des würdigſten Otto Friedr. *Müllers!* Wer hätt' es geglaubt, daſs man von Grönland eine ſo reiche Faunam liefern könnte? Dieſe Fauna iſt gleichſam der Prodromus eines gröſſern Werks, das wir noch von dem Verf. zu erwarten haben, und welches aus drey Theilen beſtehen wird.

Pars I. *Phyſica* cum figuris variis rariorum.
— II. *Geographica* cum chartis.
— III. *Hiſtorica.*

In

In dieſer Fauna, wobey eine Kupfertafel, hat ſich der Verf. was die Klaſſen und Geſchlechter der Thiere betrifft, nach *Müllers* Zool. Dan. Pr. gerichtet. Von Inſekten 371 Arten. Von Würmern 709 Arten. Von *Bandwürmern* kommen p. 316 f. inſonderheit vor:

1) Taenia *Phocarum.*
2) — *Erythrini.*
3) — *Alcae.*
4) — *Tordae.*
5) — *Scorpii.*
6) — *Gaſteroſtei.*

Ich kann dieſes intereſſante Werk nicht genug empfehlen, weil es keinen Auszug leidet.

⁂ ⁂ ⁂

In den Bemerkungen der Churpfälziſchen phyſikaliſchen oekonom. Geſellſch. vom Jahr 1779. finde ich No. 4. Hrn. *Pollich* Abhandlung von einigen *Inſekten*, die in des Ritt. von *Linné* Naturſyſtem nicht befindlich ſind.

1) *Papilio Pompadour*, der *Weiſsſaum.*
2) *Cimex* punctum album, der *Weiſspunkt.*
3) *Cimex ſuperbus*, der *Felſenſteiger.*
4) *Cimex* Vilburgenſis, der *Naſſauer.*
5) *Tenthredo* arbuſtorum, der *Baumgärtner.*
6) *Lucanus* aeneus, der *Kupferſchröter.*
7) *Ichneumon* mixtus, der *Miſchling.*
8) *Phalaena* bipunctata, der *Zweypunkt.*

Die glückliche Entdeckung der Oekonomie der *Prachtkäfer* (Bupreſtis), die bisher noch ſo dunkel war, haben wir dem Hrn. Pred. *Herbſt* in Berlin zu danken. S. Schriften der Berlin. Geſellſch. Naturf. Freunde, I. p. 85 ff.

Zum

Zum Beschluss will ich noch des neuen, prächtigen und kostbaren Insektenwerks gedenken, das nach *Baldingers* neuem Magaz. für Aerzte 2 B. 5 St. p. 464. von Lyon angekündiget ist:

Les Insectes de France, décrits et classés selon la méthode de Mr. *Linnaeus*, par Mr. de *Villers* des Acad. de Lyon & de Marseille, dessinés par Mr. *Gonichon* & gravés par les plus célebres Artistes, in 4. *quatre Volumes*, proposés par Subscription.

Darinn eine Menge seltener und wenig bekannter Insekten: mehrere, von denen man geglaubt hat, sie wären in Afrika und Amerika zu Hause. Im Junius 1781 die erste, und im Junius 1783 die letzte Ausgabe. Der Preis 120 Livr. Die Zahl der Insekten auf drittehalbtausend. Bey jeder Ausgabe 12 - 15 Platten. Ueberall bis 230 Platten.

Wenn das so fortgehet, so fürchte ich, dass allein das Insektenstudium ansehnliche Bankeroute veranlassen werde.

Vor der Michaëlismesse 1781.

3. Zungen-

3. Zungenlose *Spinner*, mit niedergedrückten Flügeln und Kammrücken (alis depressis, dorso cristato).

54. *Pudibunda*, der *Kopfhänger*.

*Müller* l. c. p. 669. no. 54. der *Kopfhänger*.

*Füeßlins* schweiz. Ins. p. 35. no. 671. der *Rothschwanz*.

Auf *Büchen*, *Eichen und Nußbäumen*.

— Magaz. der Entomol. II. B. p. 3.

*Berlin. Magaz.* II B. p. 418. no. 35.

Phal. *pudibunda*, der *Rothschwanz*. Aschgrau mit drey graubraunen Queerstreifen durch die Oberflügel.

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2te Kl. p. 222. t. 38. die gelbe *Bürstenraupe*, und derselben Verwandlung *).

*Maders* (Kleemanns) Raupenkalender, p. 32. no. 78. Phal. *pudibunda*, der *Kopfhänger* **). p. 111. no. 312. der *Kopfhänger*, *Streckfuß*.

*Gle-*

*) *Rösel* hat beyde Geschlechter, Männchen und Weibchen, mit borstenförmigen Fühlhörnern abgebildet, da doch nur das Männchen *kammförmige* Fühlhörner hat; diesen kleinen Irrthum aber im 3ten B. p. 270. §. 6. berichtiget.

**) Hierbey am Rande *Rösels* t. 37. f. 1-9. unrichtig angeführt, welche

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 569. no. 5. Phal. *pudibunda*, der *Rothschwanz*.

*Fischers* N. G. von Livland, p. 152. no. 355. Phal. *pudibunda; der Kopfhänger; schamhafter Nachtschmetterling.*

*Systemat. Verzeichn.* der Schmetterl. der Wien. Geg. p. 55. G. *Bürstenraupen;* Larvae fasciculatae (Chenilles à brosses); *Streckfüßigte* *) *Spinner;* Phal. Bomb. *Tendipedes.*

1) Beyde Geschlechter mit abhangenden Flügeln.

2) Die Männchen mit flachverbreiteten Flügeln; die *Weibchen flügellos.*

No. 1. der ersten Abtheilung:

*Wallnußspinnerraupe* (Iuglandis regiae): La Chenille à brosses du Châtaigner.

*Wallnußspinner:* Phal. *pudibunda;* la *patte-étendue.*

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 403. Phal. *pudibunda.*

*Bekm.* Epit. Syst. Linn. p. 164. no. 54. Phal. *pudibunda.*

*Raj.* Hist. Inf. p. 185. no. 7. *Phalaena* media cinerea, alis oblongis, exterioribus quatuor lineis nigricantibus transversis distinctis **).

— — p. 309. no. 3. *Eruca* pulcherrima rarius pilosa, cum 4 in medio dorso pilorum fasciculis albicantibus

welche die *Fascelinam* vorstellt; hingegen p. 111. bey der nämlichen pudibunda die rechte Kupfertafel t. 38. f. 1-6. zitirt.

*) Weil alle Falter dieser Klasse das *Familienzeichen* haben: dass sie im Sitzen beyde Vorderfüsse lang vor sich herstrecken, und zwischen denselben den niederhangenden Kopf verbergen.

**) Scapulae, caput, vt et pedes primores, (quos, cum quiescit, antrorsum recta protendit, iisque oculos et caput occultat,) longa et densa lanugine vestiuntur.

tibus cum diluta purpurae tinctura, et *penicillo purpureo* erecto in cauda.

*Raj.* Hist. Inf. p. 344. no. 9. *Eruca* major pulcherrima pilosa, e viridi flavicans, 4 in medio dorso scopulis e flavo albicantibus, cum purpureo penicillo longiore supra caudam.

*Syst. Natur.* du Regne Animal, Tom. II. p. 146. no. 19. *Phalene* de la Chenille à brosses, qui se trouve sur le Châtaigner.

*Scop.* Entom. carn. p. 194. no. 489. Phal. *pudibunda.*

*Long.* lin. 9⅓. Lat. 4½.

Antennae rufae; rachi alba; Alae albidae: *anticae* lineis tribus, repandis, umbrinis fasciatae; pagina alae inter fasciam mediam et posticam vmbrina tota; *posticae* subtus macula media, fusca.

*Fabric.* Syst. entom. p. 570. no. 50. Bomb. *pudibunda.*

Alis deflexis, cinereis; fasciis tribus fuscis, linearibus, undatis.

*Larva* fasciculata, pilosa, flava, capite luteo, caudae fasciculo longiori rubro, dorsi quatuor albis.

*Pupa* folliculata, antice nigra, postice brunnea, flavo-maculata.

*Schaeff.* Icon. t. 44. f. 9. 10. *Foemina.* t. 90. f. 1. 2. 3. (*Wien. Schmett.* p. 151.)

*Mülleri* Faun. Frider. p. 40. no. 364. Ph. B. *pudibunda.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1367. Phal. B. *pudibunda.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 113. no. 15.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis deflexis, cinereo-undulatis, fasciis transversis obscurioribus, capite inter pedes porrectos.

La *patte-étendue.*

*Long.* 1 pouce.

*Degeer* Inſ. I. Mém. 7. p. 243. t. 16. f. 7 - 12.

*Belle Chenille* velue jaune, à broſſes et à aigrettes, qui a des bandes transverſales noires et veloutées à la jonction de quelques anneaux, et qu'on trouve en Automne ſur les Poiriers, les Châtaigners et d'autres arbres.

— — p. 697. t. 16. f. 11. 12.

*Phalene* à antennes à barbes brun - jaunâtres, ſans trompe; gris - blanchâtre à quelques rayes transverſales ondées brunes.

— Tom. II. Part. 1. p. 317. no. 6. *Phalene patte-étendue blanche.*

*Phalene* à antennes à barbes jaunes ſans trompe; à corcelet huppé, à ailes cendrées blancheatres avec des rayes transverſes ondées brunes et cendrées.

— *Ueberſ.* I. 7 Abh. II Quart. p. 27. t. 16. f. 7-12.

Die ſchöne, rauche, gelbe *Bürſten-* und *Büſchelraupe*, mit ſammtſchwarzen Queerſtreifen in einigen Ringgelenken, die man im Herbſt auf den Birn - Kaſtanien - und andern Bäumen findet.

— IV Quart. p. 120. t. 16. f. 11. 12. Ein weiſslichgrauer *Nachtvogel* mit braungelblichen bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, und einigen wellenförmigen braunen Queerſtreifen.

— II Th. I B. p. 229. no. 6.

Die ohnzüngige *Phaläne*, mit gelben bärtigen Fühlhörnern; einem Rückenkamm, und weiſslich aſchgrauen Flügeln mit braunen und aſchgrauen gewäſſerten Queerſtreifen.

Der *weiſſe Streckfuſs.*

*β.* Phal. *Scopularia.*

*Linn.* Syſt. Nat. ed. 10. p. 521. no. 144.

*Clerk* Icon. t. 5. f. 8.

*Cathol.*

*Cathol.* A. p. 352. *Chenille annulaire;* Annularia*).
Eruca *annularis Friſch.*
*Neuſtria* major *Mouffet.*
*Eruca* ſepiaria gregaria maior pulchre colorata. *Raj.*

55. *Faſcelina*, die *Bürſtenmotte.*

*Müller* Erl. des L. N. S. V B. I Th. p. 669. no. 55. t. 14. f. 6. der *Büſchelraupenvogel.*

*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 35. no. 672. die *Bürſtenmotte.*
Auf dem Weiſsdorn, etwas ſelten.

— Magaz. der Entomol. II. p. 4. Phal. *Faſcelina.*
In Bündten im Frühjahr gemein, auf dem *Klee* beſonders mehrere beyſammen.

*Berlin. Magaz.* II. p. 422. no. 41. Phal. *Faſcelina*, die *Bürſtenmotte.*
Aſchfarbig mit vielen feinen braunen Punkten, und einem ſchmalen braunen Queerſtreif durch die Oberflügel.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 K. p. 217. t. 37.
Die graue *Bürſtenraupe*, und derſelben Verwandlung.

*Maders* (Kleem.) Raupenkalender p. 15. no. 18. Phal. *faſcelina*, *Bürſtenmotte.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 683. no. 7. Phal. *faſcelina*, das *geſtreifte Band.*

— II. p. 740. no. 28. Ph. *faſcel.* *das geſtreifte Band.*

 *Wien.*

*) Die *Ringelraupe*, d. i. eine 16füſſige Raupe, welche ihre Eyer um die höchſten Zweige der Obſtbäume, ſehr nahe bey einander, in einem Kreis oder Ring herumlegt. Dieſe Raupe hat ſehr ſchöne Farben. Sie iſt die Larve des Nachtſchmetterlings, der beym *Linné* Phalaena *Scopularia* heiſst, und eine Gattung der Phal. *pudibunda* iſt.

Beyde, Larve und Phaläne, mir völlig unbekannt. Bloſs im Clerk eine Abbildung der Phaläne. Wer ſie kennet und beſitzt, mache ſie doch im *Naturforſcher* bekannter.

*Wien. Schmett.* p. 55. G. no. 3. *Kleeblumenſpinnerraupe.* (Trifol. pratenſe.) La *Limaçonne.* Goed. *Kleeblumenſpinner.* Phal. B. *faſcelina.*

*Onomatol.* hiſt. nat. P. I. p. 469. Antennulata *Mouff.* die *Löwenzahnraupe;* die *Butterblumenraupe.*

— P. 6. p. 366. Phal. *faſcelina*, der *Büſchelraupenvogel.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 164. no. 55. Phal. *faſcelina.*

*Catholic.* A. p. 359. Antennulata *Mouff. Löwenzahnraupe.*

*Syſt. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 147. no. 20. *Phalene du Trefle.*

*Goed.* belg. I. p. 84. t. 36. Eruca *faſciculata.*

*Merian.* Europ. t. 18. *Taraxacum.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 186. no. 8.

*Phalaena* obſolete cinerea, alas corpori velut circumvolvens, pedes primores longa et denſa lanugine hirſutos antrorſum longiſſime porrigens.

— — p. 334. *Phalaena* e cinereo albicans, corpore habitiore; antennis plumoſis rubentibus, primores pedes, cum ſedet, protendens, et alas corpori velut circumvolvens.

— — p. 344. *Eruca* nigra media, longis pilis hirſutis, quinque medio dorſo innaſcentibus pilorum longiorum ſcopulis nigro albo et ex luteo viridi coloribus variis.

*Fabric.* Syſt. entom. p. 571. no. 51. B. *faſcelina.*

Alis deflexis cinereis; atomis nigris ſtrigisque duabus fulvis, repandis.

*Larva* piloſa, *faſciculata*, rubro-punctata; faſciculis quinque dorſalibus albis, capitis anique fuſcis.

*Pupa* folliculata, brunnea, linea dorſali piloſa.

*Mülleri*

*Mülleri* Faun. Frider. p. 40. no. 365. Phal. B. *fasce-lina.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1368. Nom. *Linn.*

*Degeer* Inf. I. Mém. 7. p. 261. t. 15. f. 12 - 15.

*Chenille* noire très-velue, à cinq brosses demi-noires et demi-blanches sur le dos, et à trois longues aigrettes noires.

— — p. 697. t. 15. f. 15. Phalene à antennes à barbes, sans trompe, d'un gris d'achate, à deux rayes noires bordées de jaune et à tache noire bordée de blanc.

— Tom. II. Part. I. p. 318. no. 7. *Phalene* à antennes barbues sans trompe, à corcelet huppé, d'un gris d'agathe, avec deux rayes noires bordées de jaune et une tache noire bordée de blanc sur les ailes supérieures.

*Phalene patte-étendue agathe.*

— *Uebers.* I. 2 Qu. 7 Abh. p. 40. t. 15. f. 12 - 15.

Die schwarze rauche Raupe, mit fünf halbschwarzen und halbweissen Rückenbürsten, sammt drey langen schwarzen Haarbüscheln.

— 4 Qu. p. 119. t. 15. f. 15.

Ein achatgrauer *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüssel, mit zwo schwarzen gelbbordirten Streifen, und einem schwarzen Fleck mit weissem Rande.

— II Th. I B. p. 230. no. 7.

Die ohnzüngige Phaläne mit bärtigen Fühlhörnern, einem achatgrauen Rückenkamm, und zwo schwarzen gelbgerändelten Streifen, nebst einem schwarzen weissgerändelten Fleck, auf den Oberflügeln.

Der *achatfarbige Streckfuß.*

56. *Antiqua*, der *Sonderling* *).

*Müller* l. c. p. 670. no. 56. der *Sonderling.*
*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 35. no. 673. der *Laſtträger.*
— Magaz. der Entomol. II B. p. 4. Phal. *antiqua.*

„Auf dem neunten und zehnten Gelenke ha„ben die Raupen *kleine rothe Knöpfchen*, die ſie „aus- und einziehen können, welches weder „*Reaumur* noch *Röſel* bemerkt haben" **). — Nach der *fünften* und letzten Häutung bekommen ſie alle die *Bürſten*, die einige nach der *vierten* noch nicht haben. (Chorh. *Meyer.*)

*Berlin. Mag.* II. p. 408. no. 21. Phal. *Antiqua*, der *Laſtträger.*

Das *Weibchen* weiſs, und *ohne Flügel.* Die Flügel des Männchens glänzend braun, mit weiſſen und oraniengelben Zeichnungen.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 225. t. 39. f. 1 - 4.

Die mit rothen Knöpflein gezierte graue Bürſtenraupe, nebſt derſelben Verwandlung.

— — Fig. 4. das *ungeflügelte Weibchen.*
— III B. p. 81. t. 13. das *Männchen* ***).

*Maders*

*) Das Weibchen dieſes Nachtvogels iſt völlig *flügellos*, und ſiehet aus wie ein *Kellerwurm.* Man kennet bis jezt unter den *Spinnern* nur zwo Arten, deren Weibchen *flügellos* ſind: dieſe, und Ph. *Gonoſtigma.* Unter den *Spannern* giebt es mehrere.

**) Herr *Kleemann* ſagt ausdrücklich in ſeiner Anmerkung zum *Röſelſchen* Text I. B. p. 227. Zwiſchen dem letzten Paar der rothen Knöpflein auf dem *neunten und zehnten Abſatz* ſtehet ein noch viel mehr hochrother fleiſchiger blaſenartiger Knopf, den die Raupen einziehen und wieder hervortreiben können.

***) Schleppt das Weibchen nicht durch die Luft, da ſolches gleich befruchtet wird, wie es aus der Puppe kömmt, und ſich nicht von der Stelle bewegt, ſondern ſeine Eyer gleich an das Gewebe

*Maders* (Kleem.) Raupenkalender, p. 32. no. 79. Phal. *Antiqua*, der *Laſtträger; Sonderling.*

*Swammerd.* Bib. der Nat. p. 223. t. 33. f. 3. 6. 8.

*Altes Hamb. Magaz.* I B. 6 St. p. 167. *Ungeflügelte Schmetterlinge.*

*Neue Mannichfalt.* II Jahrg. p. 516. 612.

*Naturforſcher* V St. p. 253. Phal. *Antiqua.* Das Weibchen legt auf 300 Eyer.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 388. no. 4. Phal. *antiqua*, der *Laſtträger.*

— — p. 549. no. 4.

*Wien. Schmetterl.* p. 55. G. No. 5. *Abrikoſenſpinnerraupe* (Pruni Armeniacae); *Abrikoſenſpinner;* Ph. B. *antiqua.*

*Schriften* der königl. *norwegiſchen* Geſellſch. der Wiſſenſchaften, IV. p. 281. no. 37. t. 16. f. 14. Phal. *antiqua.*

*Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 370. no. 9. Ph. *antiqua.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 315. Phal. *antiqua*, der *Sonderling.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 164. no. 56. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

*Syſt. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 146. no. 18. *Phalene de la Chenille à broſſes* ſur le Prunier.

*Cathol.* A. p. 372. Ph. *antiqua.*

*Act. Vpſal.* 1736. p. 25. no. 74. *Papilio* alis depreſſis cinereo-fuſcis; antennis pectinatis.

*Liſt. Goed.* p. 185. no. 78. a b. *) Eruca *miranda; Antik peregrinum.*



webe auf einen Haufen legt, und ſtirbt; die jungen Räupchen aber ſich von einem Baum auf den andern zerſtreuen.

*) Es iſt doch ſonderbar, daſs ſchon *Goedart* und *Liſer* Erfahrungen gehabt, daſs aus Schmetterlingseyern, ohne Zukunft des Männchens, junge Räupchen ausgekommen ſeyn ſollen.

*Raj.* Hist. Inf. p. 173. no. 24. *Phalaena* cinericea ventricosa corpore brevi, *alarum expers (Foemina).*

— — p. 200. no. 24. *Phalaena* minor rufa, in utravis ala exteriore macula alba rotunda prope angulum imum interiorem insignita *(Mas).*

— — p. 344. no. 8. *Eruca* sublutea pilosa, quatuor in medio dorso agminulis seu penicillis pilorum longiorum luteorum, et longo pilorum nigrorum penicillo in cauda.

*Scop.* Entom. carn. p. 198. no. 496. Phal. *antiqua.*

*Long.* lin. 7. *Lat.* 5½.

Antennae longitudo est dimidia latitudinis alae anticae, quibus macula corticina alba linea terminata ad apicem, nec non lunula alba prope posticum angulum.

*Folliculus duplex* ut in *pudibunda.*

*Fabric.* Syst. Entom. p. 584. no. 98. B. *antiqua.* Nom. *Linn.*

*Larva* fasciculata; fasciculis dorsalibus quatuor albis, antennalibus caudalique obscuris.

*Pupa* folliculata, nigro luteoque variegata.

*Mülleri* Faun. Frider. p. 41. no. 366. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1369. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 119. no. 23.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis rotundatis fusco-ferrugineis, superioribus macula alba anguli ani; *foemina aptera.*

L' *étoilée.*

*Long.* 7 lign.

*Degeer* Inf. I. Mém. 7. p. 253. t. 17. f. 1-15.

*Chenille* très-commune, noire à quatre brosses jaunâtres sur le dos, et à cinq aigrettes noires

en

en forme de pinceaux, qui a des tubercules rouges, et qui mange les feuilles de plusieurs especes d' arbres.

*Degeer* Inf. I. Mém. 7. p. 697. t. 17. f. 13. 14. 15.

*Phalene* à antennes à barbes, sans trompe, dont la femelle est grise et sans ailes, et dont le mâle est jaune brun, à deux taches blanches.

— Tom. II. Part. I. p. 292. no. 2.

*Phalene* à antennes barbues sans trompe, à ailes étendues d'un brun jaunâtre, avec une tache blanche; dont la femelle est grise et sans ailes.— *Phalene paradoxe.*

— *Uebers.* I B. 2 Qu. 7 Abh. p. 33. t. 17. f. 1-15.

Die sehr gemeine schwarze *Raupe*, mit vier gelblichen Rückenbürsten, fünf schwarzen Haarpinseln und rothen Knöpfen, fast auf allen Bäumen.

— — 4 Qu. p. 120. t. 17. f. 13-15.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern ohne Saugrüssel; das Weibchen grau und ungeflügelt; das Männchen gelbbraun mit zween weissen Flecken.

— II Th. I B. p. 208. no. 2.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Sauger, welche die Flügel breit trägt, die gelbbraun sind und einen weissen Fleck haben; das Weibchen grau und ungeflügelt.

Das *Paradoxum.*

57. *Gonostigma*, der *eckfleckige Spinner.*

*Müller* l. c. p. 671. no. 57. der *Eckfleck.*

*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 36. no. 674. der *Eckfleck.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 6. Phal. *gonostigma.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 32. no. 80. Phal. *Gonostigma*, der *Eckfleck.*

*Rösels*

*Röſels* Inſektenbel. I B. N. V. 2 Kl. p. 229. t. 40. die *ſchön pomeranzengelbgeſtreifte Bürſtenraupe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 55. G. no. 6. *Zwetſchkenſpinnerraupe* (Pruni domeſticae). La Chenille *à broſſes* du Prunier. *Réaum.* La *Soucieuſe.* Goed. *Zwetſchkenſpinner.* Phal. B. *Gonoſtigma.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 373. Phal. *Gonoſtigma.*

*Scop.* Entomol. carn. p. 199. no. 497. Phal. *Gonoſtigma.*

*Long.* lin. 6. *Lat.* $3\frac{2}{3}$.

*Ochreacea*, alis anticis macula *trigona*, alba — *differt* ab antiqua antenn. rachi ochreacea. Alis ſubtus concoloribus: primoribus ſupra faſcia antica obſoleta obſcuriore, atmoſphaera fuſca circa maculam albam.

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 585. no. 99. B. *Gonoſtigma.*

Alis incumbentibus fuſcis; maculis duabus albis oppoſitis; *foemina aptera.*

*Differt* manifeſte a praecedente. Alae ochreaceae, maculis duabus albis, altera ad angulum ani, altera oppoſita ad marginem craſſiorem maculae ferrugineae innata.

*Larva* gregaria, faſciculata, faſciculis octo dorſalibus albis, collaribus duobus analique nigris.

*Pupa* antice flava, poſtice nigra.

58. *Tremula*, der *Eſpenſpinner.*

*Müller* l. c. p. 671. no. 58. der *Zahnflügel.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 675. *der Zahnflügel.*

*Wien. Schmetterl.* p. 49. A. *Scheinſchwärmerraupen: Mondmaklichte Spinner* mit geründeten Flügeln. No. 4. *Aeſpenſpinnerraupe* (Populi tremulae); *Aeſpenſpinner.*

*Fiſchers*

*Fischers* N. G. von Livl. p. 152. no. 356. Ph. *Tremula; Zitterschmetterling; Zahnflügel.*
*Naturforscher* VI. p. 116. t. 5. f. 4.
*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 298. no. 1121. *)

59. *Coeruleocephala*, der *Blaukopf* **).

*Müller* l. c. p. 671. no. 59. der *Blaukopf.*
*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 36. no. 676. Ph. *Coeruleocephala*, der *Blaukopf.*
— Magaz. der Entomol. II. p. 6. Phal. *coeruleocephala* ***).

*Frisch*

*) Daselbst die Beschreibung sehr genau, und mit der im Naturforscher befindlichen Abbildung übereinstimmend.

**) Auch an dieser hat der grosse *Bernoulli* das Vermögen bemerkt, fruchtbare Eyer zu legen, ohne sich begattet zu haben. S. *Erxlebens* physik. Bibl. II B. p. 363.

So wenig wir geneigt sind, die Erfahrungen eines *Bernoulli* und anderer abzuleugnen; so sehr empfehlen wir bey Wiederholung solcher Versuche Genauigkeit und Vorsicht. Denn dies wäre sicher der Fall, worinn sich die Natur von ihren gewöhnlichen, und in dem grosen unermeslichen Thierreiche durchgängig bestätigten Gesetzen am weitesten entfernte. Man müste von dergleichen, aus unbefruchteten, oder vaterlosen Eyern ausgekommenen Raupen wieder welche zur Verwandlung zu bringen suchen, um zu sehen, wie weit sich dann diese vermeinte Fruchtbarkeit erstrecke.

***) „Viele dieser Raupen, sagt der Herr Chorherr *Meyer*, die an einem Tage ganz gesund schienen, traf ich am folgenden wie verfault an, indem aus jeder eine ungeheure Menge sehr kleiner Würme oder Larven kamen, nachdem sie die Raupe bis auf den Balg, und dieses, wie es scheint, in wenigen Stunden, ausgehöhlt hatten. Dies hemmet die starke Vermehrung dieser gefrässigen Baumraupe."

Dieser Umstand ist mir in Ansehung des vorigen Phänomens von den fruchtbaren Eyern dieser Phaläne ohne Begattung sehr wichtig. Wie wenn dergleichen *Ichneumonslarven* in den Eyern gestekt,

*Frisch* Inf. X. p. 5. no. 3. t. 3.

Die *blaugrünliche Raupe* mit gelben Streifen, und der Papilion davon.

*Berlin. Magaz.* II. p. 410. no. 22. Phal. *coeruleocephala*, der *Blaukopf*.

Braun, etwas ins Graue und Bläuliche fallend; die Oberflügel mit drey an einander stofsenden gelblich weissen Flecken.

*Rösels* Insektenbelust. I. N. V. 2 Kl. p. 105. t. 16. die *dicke meergrüne gelbgestreifte und schwarzpunktirte Raupe.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkalender, p. 13. no. 12. Ph. *coeruleocephala*, der *Blaukopf*.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 785. no. 6. Phalaena *coeruleocephala*, der *Blaukopf*.

*Bonnets* und anderer etc. Abhandl. aus der Insektologie p. 97. no. 20. Phal. *coeruleocephala*.

Die *Raupe* hat auch das *Fleischhorn* unten am ersten Ringe zwischen der Unterlippe, und dem ersten Paar Füssen.

*Wiener Schmetterl.* p. 59. M. *Halbhaarraupen*, Larvae *subpilosae; grosstirnichte Spinner;* Phal. Bomb. *Capitones*.

No. 3. *Mandelnspinnerraupe* (Amygdali communis); La tête bleue. *Goed. Mandelnspinner*. Ph. *coeruleocephala*.

*Fischers* N. G. von Livland, p. 152. no. 357. Phal. *coeruleocephala*, *Blaukopf*.

*Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 370. no. 10. Phal. *coeruleocephala*.

*Onomat.*

gesteckt, und etwas vor der Zeit aus diesen Eyern ausgekommen wären? Hab' ich doch Erfahrungen, dass sich in den Eyern der Phal. *castrensis* die kleinen Ichneumons bis zur *Fliege* verwandelt haben. S. *Naturforsch.* 15 St. p. 49.

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 326. Phal. *coeruleocephala*, der *Blaukopf*.

*Bekm.* Epit. S. L. p. 164. no. 59. Phal. *coeruleocephala*.

*Fabric.* Syſt. entom. p. 572. no. 53. B. *coeruleocephala*.

Alis deflexis griſeis; faſciis duabus ferrugineis, maculaque albida duplicato - didyma.

*Larva* nuda, coeruleſcens, luteo - lineata, nigro punctata.

*Pupa* folliculata, brunnea.

*Imago* thorace antice ferrugineo, poſtice griſeo.

— Reiſe durch Norwegen p. 69. Ph. *coeruleocephala*. Die *Raupen* faſt alle Obſtbäume kahl gefreſſen.

*Raj*. Hiſt. Inſ. p. 163. no. 17.

*Phalaena* alis exterioribus pullis duabus tribusve maculis albis, e duobus circulis compoſitis, contiguis notatis.

— — p. 163. no. 17. *Eruca* rarius piloſa, mali, pyri.

*Mülleri* Faun. Frider. p. 40. no. 363. Ph. B. *coeruleocephala*. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1370. Phal. *coeruleocephala*. Nom. *Linn*.

*Syſtem. Nat.* du Regn. anim. II. p. 149. no. 27.

*Phalene* du Poirier, qui eſt le *bleu - Céphale*, *coeruleocephalus*.

*Geoffr*. Inſ. II. p. 122. no. 27.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis deflexis fuſcis, macula duplici albido - flaveſcente geminata.

Le *double - omega*.

*Long*. 10. lign.

60. *Di-*

60. *Dictaea*, der *brandflüglichte Spinner* *).

*Müller* l. c. p. 672. no. 60. der *Brandflügel.*

*Wien. Schmetterl.* p. 62. R. *Buckelraupen*, Larvae *gibbosae; rückenzähnichte Spinner.* Phal. B. *Dorso dentatae.*

1) mit unrichtigen *Hoekern*, vornehmlich auf dem *eilften Ringe.*

No. 1. *Schwarzpoppelspinnerraupe.* (Populi nigrae): *Schwarzpappelspinner.* B. *Dictaea.*

*Fabric.* Syst. Nat. App. p. 831. 55-56. Phal. *Dictaea.* Nom. *Linn.*

Habitat in Europae populo nigra, betula alba.

61. *Ziczac*, der *Zickzackspinner* **).

*Müller* l. c. p. 672. no. 61. der *Zickzack.* Die *Raupe*, die *Sattel- Drachen- Kameelraupe.*

*Füeßl.* schweiz. Inſ. p. 36. no. 677. das *Zickzack.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 7. Phal. *Ziczac.* Raupe häutet ſich *fünfmal.*

*Friſch* Inſ. III. p. 4. no. 2. 1 Pl. t. 2. von der Raupe mit den *Kameelbuckeln.*

*Berlin. Magaz.* II. p. 410. no. 23. Phalaena *Ziczac*, das *Zickzack.*

Weiſslichgrau und gelblich; an einigen Orten braun; die Unterflügel weiſsgrau.

*Leſſers* Theol. der Inſ. p. 263. not. o. die *Kameelraupe*, ὁ φοβερός.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 129. t. 20. die *Kameelraupe* mit ihrer Verwandlung.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 740. no. 29. Ph. *Ziczac*, das *Zickzack.*

*Wiener*

*) *Nicht abgebildet.*

**) Der Feind der Raupe iſt der Ichneumon *pugillator* Linn. S. N. ed. 12. p. 936. no. 50.

*Wiener Schmetterl.* p. 63. R.

3) mit buckelförmigen Erhöhungen auf den Mittelringen.

No. 5. *Flechtenweidenspinnerraupe* (Salicis pentandrae): *Flechtenweidenspinner.* Ph. B. *Ziczac.*

*Neuer Schaupl.* der Natur, IV. p. 361. *Kameelraupe.*
*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 418. Ph. *Ziczac*, der *Kameelraupenvogel.*
*Bekm.* Epit. S. L. p. 164. no. 61. Ph. *Ziczac.*
*Schaeff.* Icon. t. 69. f. 2. 3.
*Fabric.* Syst. Ent. p. 573. no. 55. B. *Ziczac.* — antennis *squamatis.*

*Larva* solitaria, nuda, dorso gibberibus duobus, cauda rufa.

*Pupa* folliculata, brunnea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 40. no. 362. Ph. *Ziczac.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1371. Ph. *Ziczac.* Nom. *Linn.*
*Geoffr.* Inf. II. p. 123. no. 29.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis exterioribus fuscis, venis plurimis, fascia circulari, et marginis interioris appendice nigricantibus; inferioris albidis, limbo lineari fusco.

Le *bois veiné.*

*Long.* 7. lign.

*Degeer* Inf. I. Mém. 3. p. 116. t. 6. f. 1 - 10.

*Chenille* rase, à trois tubercules charnus en forme de cornes sur le dos, qui mange les feuilles de l'Ozier et du Saule, et qu'on a nommée le *Ziczac.*

— — p. 696. t. 6. f. 7. 10.

*Phalene* à antennes à barbes, ſans trompe; d'un brun pâle, dont les ailes ſupérieures ſont marquées vers leur baſe d'une grande tache obſcure.

*Degeer* Tom. II. Part. I. p. 309. no. 1.

*Phalene* à antennes barbues ſans trompe; à corcelet huppé, dont les ailes ſont d'un brun clair à nuances couleur d'agathe, avec une grande plaque ovale nuancée et bordée de brun obſcur ſur les ſupérieures.

*Phalene Ziczac à trois tubercules.*

— No. 2. Phalene à antennes barbues ſans trompe, à corcelet un peu huppé, d'un brun obſcur, avec des rayes ondées transverſes d'un roux foncé ſur les ailes ſupérieures, et une tache couleur de ſouffre à leur origine.

*Phalene Ziczac à cinq tubercules.* Tab. 4. f. 17.

Chenille raſe d'un verd jaunâtre *à cinq éminences charnues* en forme de cornes ſur le dos. Tab. 4. f. 13.*)

— Ueberſ. I. 1 Quart. p. 90. t. 6. f. 1-10. die glatte *Weidenraupe* mit drey *Fleiſchhoekern* auf dem Rücken, das *Zickzack* genannt.

— — 4 Quart. p. 118. t. 6. f. 7. 10.

Ein fahlbrauner *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, deſſen Oberflügel am Hinterrande einen groſsen dunklen Fleck haben.

— II Th. 1 B. p. 222. No. 1.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Kammrücken und hellbraunen Flü-

*) Dem Anſchein nach eine bloſse Abänderung von Phal. Ziczac.

Flügeln, die eine Schattirung von Achat, und besonders die Oberflügel ein grosses schattirtes, und dunkelbraun geründeltes Feld haben.

Das *dreyhökrige Zickzack.*

No. 2. t. 4. f. 17.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, und einem kleinen dunkelbraunen Rückenkamm. Die Oberflügel haben dunkelbraune gewässerte Queerstreifen, und bey der Wurzel einen schwefelgelben Fleck.

Das *fünfhökrichte Zickzack.*

Die *Raupe*, t. 4. f. 13. glatt gelblichgrün, mit *fünf* hörnerförmigen Fleischhökern auf dem Rücken.

62. *Dromedarius*, der *Dromedarspinner.*

*Müller* l. c. p. 672. no. 62. der *Dromedar.*

*Berlin. Magaz.* II. p. 416. no. 33.

Phalaena *Dromedaria*, der *Kameelbuckel.*

Die Oberflügel schwärzlichgraubraun mit verschiedenen, theils okergelben graubraunen, theils dunkelgrauen Flecken und Strichen; die Unterflügel weissgrau.

*Wiener Schmetterl.* p. 63. R. no. 7. *Birkenspinnerraupe* (Betulae albae): *Birkenspinner;* Ph. B. *Dromedarius.*

*Fabric.* System. Entom. App. p. 831. 55 - 56. Nom. *Linn.*

63. *Cossus*, der *Weidenbohrer* *).

*Müller* l. c. p. 673. no. 63. der *Holzdieb.*



*) Eins der merkwürdigsten Insekten. An der Raupe besondere Eigenschaften:

*Füeßl.* ſchweizer. Inſ. p. 36. no. 678. Ph. *Coſſus*, der *Holzbohrer.*

*Friſch* Inſ. VII. p. 1. 1 Pl. t. 1.
Von der wurmförmigen Erdraupe und ihrem Papilion.

*Berlin. Magaz.* II. p. 410. no. 24.
Phal. *Coſſus*, der *Weidenbohrer.* Grau und weiſs marmorirt; die Unterflügel ganz grau.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 113. t. 18.
Die groſse, roth- und fleiſchfarbige *Holzraupe* mit ihrer Verwandlung.

— — p. 120. *Brummvogel.*

*Stral-*

1) ſie lebt ganz allein von faulem Weidenholze, und hat den widrigſten, penetranteſten Geruch, den man ſich denken kann. S. *Degeer* Ueberſ. I. 1 Quart. p. 31. 32. *Anmerk.*

2) ſie ſpritzt einen ekelhaften Saft von ſich, und beiſst ſtark mit ihren Freſszangen. *Röſel* l. c. p. 117. t. 18. f. 1. a.

3) ſie freſſen ſich unter einander ſelbſt auf, wenn ſie eingeſperrt ſind. *Röſel* l. c. p. 118.

4) ihr innerer Bau ganz bewundernswürdig. Hierüber giebt *Lyonets* eigenes anatomiſches und unnachahmliches Werk von dieſer Raupe die Erklärung. Auſser den Nerven, Luftröhren und andern Gefäſsen

| | |
|---|---|
| allein für den Kopf | 228 *Muskeln.* |
| für den Körper | 1647 — — |
| für den Magenſchlund, Magen und Gedärme | 2186 — — |
| | In allen 4061 *Muskeln.* |

S. *Degeer* Ueberſ. I. 1 Qu. p. 10 - 15. *Anmerk.*

5) hat verſchiedene Feinde, als die *Schlupfweſpen* und eine gewiſſe Art *Läuſe.* S. *Börners* Sammlung aus der N. G. etc. I. p. 164. 165. aus *Lyonets* Traité anatom.

6) häutet ſich auf *achtmal*, da ihr Wachsthum langſamer als bey andern Raupen iſt. S. *Stralſ. Mag.* I. p. 236.

7) das Weibchen legt mehr als 1000 Eyer. *Röſel* l. c. p. 120.

*Stralsund. Magaz.* I. p. 236. Phal. *Cossus*, *Weidenholzraupe.*

*Börners* Samml. aus der N. G. etc. I. p. 157. Naturgeschichte des *Weidenbohrers* (aus *Lyon.* Traité anat.),

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 742. no. 33. Phal. *Cossus*, der *Weidenbohrer.*

*Wien. Schmetterl.* p. 60. *N. Holzraupen*, Larvae *Lignivorae; bleichringigte Spinner;* Ph. B. *Albocinctae.*

1) mit blätterichten Fühlhörnern.

No. 1. *Kopfweidenspinnerraupe* (Salicis pentandrae etc. *Truncatae*): *Kopfweidenspinner.* Ph. B. *Cossus.*

*Neuer Schaupl.* der Nat. IV. p. 73. *Holzraupe; Holzdieb.* Phal. *Cossus.*

*Blumenbachs* Handbuch der Nat. p. 371. no. 11. Phal. *Cossus*, *Weidenraupe.*

*Bekmanns* phys. ökonom. Bibl. VII. p. 293. Phal. *Cossus* *).



*) Eine sehr gegründete Anmerkung: „Unmöglich können die Römer die häslich stinkende Raupe dieser Phaläne als einen Leckerbissen gegessen haben, sondern ihre Cossi müssen Larven von Käfern oder Holzböcken (Cerambyx) gewesen seyn, so wie noch in Indien die vom Curculio Palmarum und Cerambyx cervicornis gegessen werden. *Plinius* Lib. 17. c. 24. (auf den sich *Linné* beruft,) sagt auch deutlich, dass es Würmer aus *Eichbäumen* gewesen, in welchen man diese rothe Raupen nicht findet“.

Herr Hofr. *Beireis* hat in einem Progr. de vsu historiae naturalis bewiesen: dass die Cossus der Römer die Larven des *Hirschkäfers* oder *Feuerschröters*, Lucanus Cervus *Linn.* gewesen sind. S. *Leske* Uebers. der philos. Transact. II. p. 44.

Wenn also *Lister* im *Goedart* p. 108. not. 1. sagt: Hanc Erucam in Trunco Quercino recens exciso et in partes serra diviso reperi

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 460. no. 9. Phal. *Cossus*, der *Holzbohrer.*

— dess. Uebers. der philos. Transact. II. p. 45. Ph. *Cossus.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 165. no. 63. Phal. *Cossus.*

*Onomat.* hist. nat. P. 3. p. 444. *Cossus.*

— — P. 6. p. 345. Ph. *Cossus.*

*List. Goed.* p. 105. no. 39. f. 39. *Eruca Cancer: Olens hircus.*

*Răj.* Hist. Inf. p. 150. no. 2.

*Phalaena* grandis, alis cinerascentibus, lineolis creberrimis nigricantibus.

— — p. 351. no. 25.

*Eruca* maxima subterranea, raris pilis obsita, supina parte tota, excepto capite, rubra, prona flava.

*Lyonet* sur Lesser t. 1. f. 17-22.

— Traité anatomique de la *Chenille*, qui ronge le bois de Saule. à la Haye 4. 1762 *).

*Schaeff.* Icon. t. 61. f. 1. 2.

*Syst. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 142. no. 4. Le *Cossus.*

*Mouffet* Inf. p. 196. f. 1. *Spondyla* rubra.

*Scop.* Entom. carn. p. 200. no. 500. Phal. *Cossus.*

*Long.* Unc. 1. et lin. 5. *Lat.* 9½.

*Thorax* antice linea transversa cerea, postice maculis binis nigris lateralibus. *Alae posticae* murinae, basi albidae, obscurioribus anastomosanti-

reperi — so ist es ganz gewiss nicht diese, sondern eine *Käferlarve* gewesen.

*) Zeugnisse von diesem ganz unnachahmlichen Werke s. *Blumenbachs* Handb. der Nat. p. 366. *Anmerk. Rösel* l. c. p. 113. *Anmerk. Degeer* Tom. II. Part. I. p. 370. Ouvrage surprenant, et un vrai chef-d'œuvre inimitable.

ſantibus lineis reticulatae; *anticae* baſi et medio murinae, alibi albae, utrinque lituris ſtrigisque transverſis nigris lineolisque murinis ramoſisque variegatae.

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 569. no. 48. B. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

*Larva* ſubpiloſa incarnata, dorſo ſanguineo, capite nigro.

*Pupa* folliculata, antice brunnea, poſtice flava.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 40. no. 358. Phal. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1372. Phal. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 102. no. 4.

*Phalaena* pectinicornis, elinguis, alis albo-cinereis, ſtriis transverſis nebuloſis nigris; abdomine annulis albis.

Le *Coſſus.*

*Long.* 15. lign.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 368. no. 1.

*Phalene* à antennes filiformes feuilletées, ſans trompe, à corcelet huppé, avec une bande noire et un collier blanc, à ailes d'un gris cendré, avec une infinité de veines transverſes noires.

Phalene *Coſſus.*

*Chenille* raſe luiſante d'un rouge-brun en deſſus, et blanc-jaunâtre en deſſous, avec deux plaques écailleuſes brunes ſur le premier anneau.

— Ueberſ. II Th. I B. p. 268. no. 1.

Eine *Phaläne* mit fadenförmigen geblätterten Fühlhörnern ohne Saugrüſſel, mit ſchwarzgeſtreiftem Rückenkamm und weiſſem Hals-

bande, und aschgrauen Flügeln mit vielen schwarzen Queeradern.

Die *Kossusphaläne.*

Die *Raupe* glänzend glatt, oben braunroth, unten weissgelblich, mit zween hornartigen braunen Flecken auf dem ersten Ringe.

— Etwas von der Oekonomie dieser *Raupen* und von ihren *Puppen* ib. p. 270. *Anmerk.*

64. *Palpina*, der *Rüsselspinner* *).

*Müller* l. c. p. 673. no. 64. der *Sichelfühler.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 36. no. 679. Phal. *Palpina*, die *Schnauzmotte.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 85. Phal. *Palpina.*

*Berlin. Magaz.* II. p. 422. no. 40. Phal. *Palpina*, die *Rüsselmotte.*

Gelblichgrün, mit etwas dunklerm schattirt; an dem innern Rande der Oberflügel drey Spitzen, und am Munde 2 *lange Rüssel.*

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 743. no. 35. Phal. *Noctua* palpina, die *Rüsselmotte.*

*Wiener Schmetterl.* p. 62. G. *Scheinspannraupen*, Larvae *Geometriformes*; *großzähnichte Spinner;* Ph. B. *Erosae.*

No. 2. *Weißweidenspinnerraupe* (Salicis albae): *Weißweidenspinner:* Ph. B. *Palpina.*

*Naturforscher* II. p. 14. t. 1. f. 6. *Fischschwanzmotte*, *Männchen* allein mit dem *Fischschwanz* (D. *Kühn*).

— — VIII. p. 107. no. 40. Phal. *Palpina.*

Das

*) Stellt sich wie tod an. Giebt kein Gefühl des Lebens von sich, auch wenn man sie mit der Nadel aufspiesst, ausser wenn man ihre *Bartspitzen* berührt, so fängt sie an zu flattern.

Das *Weibchen* gröſser, grauer, und die Fühlhörner etwas dünner (*von Rottemburg*).

*Fabric.* Syſt. Entom. p. 575. no. 64. B. *palpina.* Nom. *Linn.*

*Larva* ſolitaria, nuda, viridis; linea laterali flava.

*Sepp* Nederl. Inſ. IV. p. 17. t. 4. De *Snuit-Vlinder* *).

*Degeer* Inſ. I. Mém. II. p. 61. t. 4. f. 7.

— — p. 665. t. 4. f. 7. *Phalene* à antennes à barbes et à trompe; griſe à ailes en toit, dont le corcelet eſt raboteux, et dont les barbillons longs et larges s'avancent en Muſeau.

— Tom. II. Part. I. p. 334. no. 2.

*Phalene* à antennes barbues à trompe, à corcelet huppé, à ailes en toit aigu dentelées griſes, dont les barbillons de la tête s'avancent en long muſeau applati.

*Phalene à muſeau.*

*Chenille* à ſeize pattes raſe verte, à lignes longitudinales blanches, avec du jaune citron ſur le devant du corps, qui vit ſur le Saule.

— *Ueberſ.* I B. 1 Quart. p. 52. t. 4. f. 7.

— — 4 Quart. p. 117. t. 4. f. 7.

Der graue *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel; dachförmigen Flügeln, hökrichem Bruſtſchilde, und langen, breiten, wie eine Schnauze vorſtehenden Bartſpitzen.

— II Th. 1 B. p. 242. no. 2.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, grauen gezackten, wie ein ſpitziges Dach ſtehenden Flügeln, und langen, wie ein flacher Rüſſel vorſtehenden Bartſpitzen.



*) Die ganze Naturgeſchichte vom Ey an.

Die *Rüſſelphaläne.*

Die *Raupe* ſechzehnfüſsig, grün, glatt, am Vordertheile des Körpers zitrongelb, mit weiſſen längſt laufenden Linien: auf den Sohlweiden.

65. *Arenacea*, der *kapenſiſche Sandflügelſpinner.*

*Müller* l. c. p. 674. no. 65. der *Sandflügel.*
*Catholicon* A. p. 462. Phal. *arenacia.*
*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 33. t. 18. f. 1. Ph. *arenacea.*

— du Cap. de B. E.

Les taches noires ſur les ailes ſupérieures, vuës à l'aide du microſcope, paroiſſent comme des écailles dreſſées.

66. *Morio*, der *Mohrenkopfſpinner* *).

*Müller* l. c. p. 674. no. 66. das *Mohrenköpflein.*
*Wien. Schmett.* p. 50. C. *Knoſpenraupen*, Larvae *Tuberoſae; nacktflüglichte Spinner*, Phal. B. *Subnudae.*

No. I. *Lülchſpinnerraupe* (Lolii perennis): *Lülchſpinner:* Ph. B. *Morio.*

67. *Purpurea*, der *Purpurbärſpinner.*

*Müller* l. c. p. 674. no. 67. der *Purpurbär.*
*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 680. der *Purpurbär.*
*Wiener Schmetterl.* p. 53. E. *Bärenraupen*, Larvae *Urſinae;* ädle *Spinner:* Ph. B. *nobiles.*

3) auf den einfarbigen Oberflügeln ſchwärzliche Fleckchen, Punkte und Striche.

No.

*) *Nicht abgebildet.*

No. 9. *Megerkrautſpinnerraupe* (Galii Molluginis); *Megerkrautſpinner:* B. *purpurea.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 54. no. 148. Ph. *purpurea*, der *gelbe Purpurbär;* der *gelbe S - Bär.*

— — p. 73. no. 207.

— — p. 100. no. 284.

*Röſels* Inſektenbeluſt. I. N. V. 2 Kl. p. 65. t. 10.

Die ſchnell kriechende hell - und rothgelbe haarige *Raupe* mit weiſsen Flecken.

*Naturforſcher.* VI. p. 75. die ſchnell laufende rare Raupe des gelben *S - Bärs.* Ph. *purpurea.*

Im März und April unter den auf der Erde liegenden Blättern der gemeinen Klette — in ihrem Winterlager. (D. Kühn.)

*Onomatol.* hiſt. nat. P. 6. p. 404. Phal. *purpurea*, der *Stachelbeervogel.*

*Schaeff.* Icon. t. 59. f. 4. 5.

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 580. no. 82. B. *purpurea.* Nom. *Linn.*

*Larva* hirſuta, griſea, albo - maculata: odorem *Mari veri* ſpargens.

*Pupa* nuda, brunnea.

*Sebae* Theſ. IV. t. 59. f. 4. 5.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 105. no. 6.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus flavis, maculis fuſcis; inferioribus rubris, nigro - maculatis.

L' *écaille mouchetée.*

*Larg.* 23 lign. *Long.* 10 lign.

4. Ge-

4. *Gezüngelte Spinner mit glattem Rücken und niedergebogenen Flügeln* (B. ſpirilingues, dorſo laevi, alis deflexis).

68. *Aulica*, die *Hofdame*.

*Müller* l. c. p. 675. no. 68. t. 22. f. 5. die *Hofdame*. (Die Abbildung eine *Chineſiſche*.)
*Füeſsl.* Magaz. der Entomol. II. p. 231. p. 226-231. Phal. *aulica* *).
*Naturforſcher* III. p. 141. t. 1. f. 8.
— — VI. p. 115. t. 5. f. 3.
*Wiener Schmetterl.* p. 53. E.

2) auf den dunklen Oberflügeln bleiche Makeln (*Guttae*).

No. 6. *Tauſendblattſpinnerraupe* (Achillaeae Millefolii).

La dure-peliſſe. *Goed. Tauſendblattſpinner.* Ph. B. *aulica*.

*Catholicon* A. p. 651. Ph. *aulica*, die *Hofmotte*.
*Fabric.* Syſt. Ent. p. 576. no. 67. B. *aulica*. Nom. *Linn.*

Parva. Alis anticis *maculis quinque*, anteriore longiore.

69. *Lubricipeda*, der *Haſenſpinner* (der *Haſe*)**).

*Müller* l. c. p. 675. no. 69. der *Glitſchfuſs*.
*Füeſsl.* ſchweizer. Inſ. p. 36. no. 981. die *Tigermotte*.
— Magaz. der Entom. II. p. 7. Ph. *Lubricipeda*.

Auf

*) Wo erwieſen wird, daſs die im *Naturforſcher* vom ſel. *Walch* und *Meineke* angebene ſeltene Phaläne keine andere als dieſe *aulica* L. ſey.

**) Weil die Raupe auſserordentlich ſchnell zu laufen pflegt.

Auf den *Zichorienblättern.* Die Raupen pflegen sich durch die Papierdeckel auf den Gläsern durchzuarbeiten, und die Stelle vorher zu benetzen. (Chorherr *Meyer.*)

*Berlin. Magaz.* II. p. 412. no. 25. Ph. *lubricipeda alba*, die *Hermelinmotte* *).

Weiss mit schwarzen Punkten.

— — no. 26. Phal. *lubricipeda lutea*, die *Tigermotte.*

Okergelb mit kleinen schwarzen Flecken.

*Naturforscher* VIII. p. 104. no. 25. 26. Ph. *Lubricipeda alba et lutea* **).

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 116. no. 327. Phal. *lubricipeda*, der *Glitschfuss*, die *Hermelinmotte.*

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 257. t. 46. die schwarz- und streifhaarichte *Raupe* mit dem gelben Rückenstreif. (Ph. lubr. *alba.*)

— — p. 260. no. 47. die weissliche oder hellbraune, haarichte, geknöpfelte und gestreifte *Raupe.*

(Dies die Phal. lubricipeda *lutea.*)

*Frisch* Ins. III. p. 22. no. 11. 2 Pl. t. 8. f. 1-5. Von der *braunhaarichten Nessel- oder Meldenraupe.*

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 646. no. 11. Phal. *lubricipeda*, die *Tigermotte* (*lutea*).

*Wie-*

*) *Hufnagel* hält nach p. 436. L. die folgende no. 26. Ph. *lubricipeda lutea*, die *Tigermotte*, *Rös.* II. N. V. 2. t. 47. die *Linné* für eine Spielart der ersten ansiehet, für eine besondere Gattung.

**) Herr von *Rottemb.* ist der Meynung des *Hufnagels* und *Rösels*, dass es zweyerley besondere Arten sind, indem sich die weissen allezeit mit den weissen, die gelben aber mit den gelben gepaart haben. Er hat sie ferner aus den Eyern gezogen, und unter den weissen sowohl, als gelben, *Männchen und Weibchen* gefunden. Das sind entscheidende Beweise.

*Wiener Schmetterl.* p. 54. F. *Hasenraupen*, Larvae *celeripedes*, *gelbfüßige Spinner.* Phal. B. *luteopedes.*

No. 1. *Hollunderspinnerraupe* (Sambuci nigrae).

La *roulante. Goed.*

*Hollunderspinner.* Ph. B. *lubricipeda.*

*Glaser* von schädlichen Raupen p. 35. *Schnellfüßige Raupe:* Ph. *lubricipeda.*

— Neue verbess. Aufl. 1780 mit *illum. K.* p. 43. Ph. *lubricipeda.*

*Onomatol.* hist. nat. P. 6. p. 381. Phal. *lubricipeda.*

*Bekm.* Epit. Syst. Linn. p. 165. no. 69. Phal. *lubricipeda.*

*Systen. Nat.* du Regn. anim. II. p. 145. no. 15. *Phalene blanc à points noirs.*

*Act. Upsal.* 1736. p. 124. no. 59.

*Papilio* alis depressis albis, punctis nigris, ventre quinque punctorum.

*Raj.* Hist. Ins. p. 196. no. 155.

*Phalaena* media, ex albido sublutea, alis exterioribus punctis paucis nigris στικτοῖς (*lutea*).

— — p. 195. no. 40. *Phalaena* media pulcherrima, *alba*, alis exterioribus punctis nigris perbelle στικτοῖς.

*Réaum.* Ins. II. t. 1. f. 7-9. La *lièvre.*

*Scop.* Entom. carn. p. 208. no. 513. Phal. *lubricipeda.*

*Long.* lin. 9. *Lat.* 5.

Alba; oculis antennisque nigris, alis deflexis, anticis nigro-punctatis, abdomine supra paleaceo, punctorum nigrorum ordinibus quinis.

*Fabric.* Syst. Entom. p. 576. no. 68. Bomb. *Lubricipeda.* Nom. *Linn.*

*Variat* alarum colore et punctorum numero.

*Larva*

*Larva* pilosa, fusca, punctis coeruleis lineaque dorsali pallida.

*Pupa* folliculata, coerulescens, stigmatibus rubris.

*Geoffr.* Inf. II. p. 118. no. 21.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis, punctis nigris, abdomine ordinibus quinque punctorum.

La *Phalene - tigre.*

*Long.* 9 lign.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 42. no. 374. Ph. *lubricipeda.* Nom. *Linn.*

-- Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1375. Nom. *Linn.*

*Variat* punctis sparsis; linea punctorum interrupta transversa, ac punctis binis, altero remotiore aegre conspicuo.

*Schaeff.* Icon. t. 24. f. 8. 9.

— — t. 114. f. 2. 3.

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 7. t. 3. f. 2. 3.*)

— de la *nouelle York*, du *Maryland* et de la *Virginie*, où elles engendrent deux fois l'année.

*Degeer* Inf. I. Mém. 5. p. 178. t. 11. f. 1-8.

*Chenille* velue brune, à dix tubercules, qu'on trouve en automne sur plusieurs arbres, et qu'on a nommée le *Lievre* ou *Chenille de la Vigne.*

— — p. 696. t. 11. f. 7. 8.

*Phalene* à antennes à barbes, sans trompe, à ailes ou blanches, ou d'un jaune clair, à points noirs.

*Degeer*

*) Dies scheinen doch verschiedene, obgleich ähnliche Arten zu seyn: die eine mit weissgraulichen, etwas gelblichen, schwarzpunktirten Ober- und Unterflügeln; die andere mit solchen Ober- aber ganz okergelben Unterflügeln; auf jedem der letztern drey, im Dreyeck stehende schwarze Punkte.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 304. no. 3.

*Phalene* à antennes barbues noires ſans trompe, à ailes en toit blanches ou d'un jaune clair, picquées de points noirs, dont le ventre eſt jaune à cinq rangs de points noirs.

Phalene *lievre.*

*Chenille* très-velue, à tubercules brunes et rouſſes, dont les poils ſont de la même couleur.

— *Ueberſ.* I. 1 Qu. 5te Abh. p. 132. t. 11. f. 1-8.

Die braune rauche *Raupe*, mit zehn Buckeln; im Herbſt auf allerley Bäumen: der *Haſe*, oder die Weinraupe.

— — 4 Quart. p. 118. t. 11. f. 7. 8.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel: entweder mit weiſſen, oder mit hellgelben ſchwarzpunktirten Flügeln.

— — II Th. I B. p. 218. no. 3.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit ſchwarzen bärtigen Fühlhörnern, und dachförmigen, weiſſen oder hellgelben, mit ſchwarzen Punkten geſprenkelten Flügeln; gelbem Körper mit fünf Reihen ſchwarzer Punkte.

Der *Haſe.*

Die *Raupe* haaricht, mit braunen und fuchſichten Knöpfen, deren Haare eben ſolche Farbe haben.

70. *Lota*, der *Schwarzpunkt.*

*Müller* l. c. p. 675. no. 70. der *Schwarzpunkt.*

*Füeſſl.* Magaz. der Entom. II. p. 9. Phal. *Lota.*

Die ſchwarzgraue *Raupe* mit weiſs- und ſchwarzen Streifen, und weiſslichen Pünktgen.

*Wien. Schmetterl.* p. 76. L. *Spreckenraupen*, Larvae *Albopunctatae;* geradgeſtrichte *Eulen*, Phalaenae *Noctuae* Rectolineatae.

2) Die

2) Die Raupen bräunlicht.

No. 6. *Wasserweideneulenraupe* (Salicis pentandrae), *Wasserweideneule.* Ph. N. *Lota.*

71. *Russula*, der *Rothrand.*

*Müller* l. c. p. 676. no. 71. der *Rothband.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 36. no. 682. Phal. *Russula*, der *Rothrand.*

*Wien. Schmett.* p. 54. E. No. 13. *Apostemkrautspinnerraupe* (Scabiosae arvensis); *Apostemkrautspinner.* Ph. B. *Russulae.*

*Raj.* Hist. Ins. p. 228. no. 75.

*Phalaena* minor, corpore crasso, e fusco et rubro diversicolore; alis exterioribus obscure rufis seu pullis, duobus maculis nigris notatis, interioribus e pullo et rubro variis.

*Linn.* Syst. Nat. ed. 10. p. 520. no. 136. Phal. *Vulpinaria.*

— Faun. Suec. ed. 2. no. 1135. Phal. *Sannio.*

*Syst. Natur.* du Regn. anim. II. p. 149. no. 28. *Phalene du Gramen ou Chiendent.*

*Act. Upsal.* 1736. p. 23. no. 41.

*Papilio* alis planis fulvis, macula rubente.

*Schaeff.* Icon. t. 83. f. 4. 5.

*Fabric.* Syst. Ent. p. 579. no. 80. B. *Russula.* N. *Linn.*

*Geoffr.* Ins. II. p. 129. no. 39.

*Phalaena* pectinicornis, spirilinguis, alis deflexis, pallido-luteis, limbo roseo, superioribus macula, inferioribus fascia duplici fusca.

La *bordure ensanglantée.*

*Long.* 10 lign.

*Scop.* Entom. carn. p. 211. no. 520. Phal. *Sannio.*

Alae omnes macula media obscuriore; anticae subtus, posticae supra fascia fusca.

4. *Variat.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1389. Phal. *Sannio.* Nom. *Linn.*

β. Phalaena *Russula.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 48. no. 130. Phal. *Russula* β. der *Rothrand.* p. 67. no. 191.

*Kleem.* Beytr. I. p. 172. t. 20. die kleine überaus-ſchnell laufende, mit braunrothen Haaren, einem gelben Rückenſtreif und ſchwarzen als Kupfer glänzenden Kopfe verſehene Raupe.

*Geoffr.* II. p. 129. no. 39. N. B.

Il y en a une variété plus petite, qui n'a que ſix lignes de long. Elle eſt beaucoup plus jaune, de couleur de Tabac d'Eſpagne, et reſſemble tout-à-fait à l'autre, mais ſes antennes ſont moins barbues.

72. *Rufina*, der *Rothflügel.*

*Müller* l. c. p. 676. no. 72. der *Rothflügel.*

*Wien. Schmetterl.* p. 85. R. *Halsſchildraupen*, Larvae *Scutellatae*, *röthlichbraune Eulen*, Ph. *Noctuae Badiae.*

No. 9. *Loheichenenlenraupe* (Quercus Roboris *Tuberiferae*). *Loheicheneule*, Ph. *Noctua* Rufina.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. no. 1142. Phal. *Helvola.*

73. *Graminis*, der *Grasſpinner.*

*Müller* l. c. p. 676. no. 53. der *Grasmäher.*

*Friſch.* Inſ. X. p. 24. no. 21. 3 Pl. t. 21. f. 1. 2. 3. Von einer grauen *Erdraupe*, die nur vier Rückenknöpfe und den Seitenſpiegel hat.

*Allgem. Magaz.* der Natur etc. IX. p. 328. §. 3. *Wieſenlarven; Wieſenwürmer* *).

*Ab-*

*) Ihretwegen thörichte Gottesdienſte gefeyert: zu Anfang des Som-

*Abhandl.* der ſchwed. Akad. der Wiſſ. IV. p. 51. Abr. *Becks* Beſchr. der *Grasraupen* t. 2. f. A-E.

— — XII. p. 185.

— — XX. p. 48. *Grasraupen.*

*Wiener Schmetterl.* p. 81. O. *Breitſtreifraupen*, Larvae *Largoſtriatae*, *jaſpisfarbige Eulen.* Phal. *Noctuae* venoſae.

2) Graulicht mit weiſſen Linien.

No. 3. *Futtergraseulenraupe* (Poae pratenſis); *Futtergraseule.* Phal. *Noctua* Graminis.

*Naturforſcher* VIII. p. 105. no. 27.

Dieſe Ph. *graminis* (*Berl. Magaz.* II. p. 412. no. 27. Ph. *graminis*, der *Grasmäher*) iſt nicht *Linn.* Ph. *gram.* ſondern deſſen Ph. Noct. *Mi.* No. 106.

*Fiſchers* N. G. von Livland, p. 152. no. 358. der *Grasmäher.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 373. Ph. *graminis*, der *ſchädliche Grasraupenvogel.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. no. 826. Phal. *calamitoſa.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 165. no. 73. Phal. *graminis.*

— Phyſik. ökon. Bibl. II. p. 313. Phal. *graminis.* Die *Krähen* (Cornix) verzehren die Raupen. S. *Hannov. Magaz.* 1767. St. 39.

*Syſt. Nat.* du Regn. anim. II. p. 146. no. 17. *Phalene* de la Chenille, que l'on trouve ſur la Tithymale.

*Act. Vpſal.* 1736. p. 25. n. 75.



Sommers Buſs- und Bettage, um Iohannis Dankfeſte, da ſie weg waren. Das war ihre Verwandlungszeit. S. *Neue Mannichfalt.* I Jahrg. p. 303-316. 319-334. vom *Aberglauben* in der Naturgeſchichte. *Martini* Naturlex. I. p. 92.

*Papilio* alis depreſſis fuſcis, faſcia pallida longitudinali ramoſa, ſubtus puncto nigro notatis.

*Cathol.* G. p. 235. *Chenille* du *Gramen*, die *Grasraupe;* der *Grasmäher:* Ph. *Graminis.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 228. no. 104.

*Phalaena* e minoribus majuscula, alis oblongis, exterioribus e cinereo albicantibus, nigris punctis et maculis variis, et linea alba tridente in medio.

*Fabric.* Syſt. entom. p. 586. no. 106. B. *Graminis.* Nom. *Linn.*

Otto *Fabric.* Faun. Groenland. *) Hafn. et Lipſ. 8. 1780. p. 193. no. 144. Phal. *Graminis.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 42. no. 375. Phal. *graminis.* ſpirilinguis, alis depreſſis griſeis; *linea ramoſa lunulaque glaucis.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1376. Phal. *graminis.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. II. Part I. p. 340. no. 5. *Phalene* à antennes barbues à trompe, à ailes rabatues d'un gris brun, avec une raye longitudinale branchue blancheâtre, et trois taches jaunâtres ſur les ſupérieures.

*Phalene de l' herbe.*

*Chenille*

*) Magna copia 1778 omne gramen conſumſit in ſinu dicto *Angmakſivik* e regione boreali Coloniae Friderichshaab. Omni conſumto, ſe in mare et aquas propinquas plures praecipitarunt. *Groenlandi* illas faſtidientes, dum tentoria illorum intrant metamorphoſeos gratia, pellere conantur incendio graminis, illis nulli uſui.

Eines der herrlichſten Werke zur Naturgeſchichte, worinn das *Wurmgeſchlecht* vorzüglich bereichert iſt.

*Chenille* rase d'un gris obscur, avec une raye jaune de chaque côté du corps et une ligne jaune le long du dos.

*Degeer Uebers.* I. 1 Qu. p. 42. *Anm.* Phal. *graminis.*

— — II Th. 1 B. p. 39. *Anm.* Phal *graminis.*

— — — p. 247. no. 5.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, und graubraunen herabhangenden Flügeln mit einer weisslichen längstgehenden ästigen Streife, und drey gelblichen Flecken auf den Oberflügeln.

Die *Grasmotte.*

Die *Raupe* glatt, dunkelgrau, mit einer gelben Streife auf jeder Seite, und einer gelben längst dem Rücken gehenden Linie.

74. *Lusoria*, die *Spielart.*

*Müller* l. c. p. 676. no. 74. die *Spielart.*

*Wiener Schmetterl.* p. 94. Aa. *Schlangenraupen*, Larvae *Serpentinae*, *spannerförmige Eulen*; Ph. *Noctuae* Geometriformes.

1) Mit einer schwärzlichen unvollkommenen Mondmakel auf den Oberflügeln.

a) Mit einigem Anfange von allen Bauchfüssen.

No. 2. *Lekritzwickeneulenraupe* (Astragali Glycyphylli); *Lekritzwickeneule.* Phal. *Noctua* Lusoria.

75. *Grammica*, der *Streifflügel.*

*Müller* l. c. p. 677. no. 75. der *Streifflügel.*

*Füessl.* schweiz. Ins. p. 36. no. 683. Phal. *grammica.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 23. no. 84. Ph. *grammica*, der *Streifflügel.*

*Berlin. Magaz.* II. p. 418. no. 34. Phal. *grammica*, das *Eichhörnchen.*

Die Oberflügel gelb mit ſchwarzen Streifen der Länge nach. Die Unterflügel oraniengelb mit einem breiten ſchwarzen Rande.

*Naturforſcher* VIII. p. 106. no. 34. Ph. *grammica.* Die *Weibchen ſehr rar.*

*Röſels* Inſektenbeluſt. IV. p. 150. t. 21. f. a b c d. das *Männchen.*

Die kleine ſchwarzbraune und kurzhaarichte Raupe, mit dem rothgelben Rückenſtreif, und einer weiſſen Einfaſſung an jeder Seite.

*Wiener Schmetterl.* p. 54. E. no. 12. *Schwingelſpinnerraupe* (Feſtucae duriuſculae); *Schwingelſpinner*, Ph. B. *Grammica.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 169. n. 28.

*Phalaena* media pulla, corpore et alis valde longis et anguſtis.

— — p. 280. no. 13. *Eruca* coeruleo-viridis glabra, linea alba in medio dorſo a capite ad caudam ſecundum longitudinem decurrente, lutea in utroque latere hinc inde ſupra pedes.

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 579. no. 81. B. *grammica.* Nom. *Linn.*

*Larva* fuſca, linea dorſali alba, pedibus rufis.
*Pupa* nuda, brunnea.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 115. no. 17.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus faſciis pallido-flavis nigriſque alternis longitudinalibus, inferioribus croceis faſcia marginali nigra.

La *Phalene chouette.*

*Long.* 5-7 lign.

*Schaeff.* Icon. t. 92. f. 2.

β) Pha-

β) Phalaena ſtriata.
*Linn.* Syſt. Nat. ed. 10. p. 502. no. 31.

76. *Cribrum*, der *Siebflügel.*

*Müller* l. c. p. 677. no. 76. der *Siebflügel.*
*Wien. Schmett.* p. 68. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; ſchabenartige Eulen*, Phal. *Noctuae* Tineiformes.
No. 8. Unbekannte Raupe, *Weiſſe ſchwarzpunktirte Eule.* Ph. *Noctua* Cribrum.
Le *Manteau à points. Geoffr.*
*Fiſchers* N. G. von Livland, p. 152. no. 359. das *Sieb.*
*Fabric.* Syſt. Ent. p. 588. no. 112. B. *Cribrum.* Nom. *Linn.* Anus flaveſcens.
*Geoffr.* Inſ. II. p. 190. no. 21.
*Taenia* alis argenteis, corpori circumvolutis, faſcia duplici transverſa punctorum nigrorum.
Le *Manteau à points.*
*Long.* 8 lign.
*Réaum.* I. t. 38. f. 7. 8. 9.

5. *Kammſauger* (*Bombyces* ſpirilingues, dorſo criſtato, alis deflexis).

77. *Celſia*, das *Roßkreuz.*

*Müller* l. c. p. 677. no. 77. das *Roßkreuz.*
*Neuer Schaupl.* der Nat. II. p. 247.
Phal. *Celſia*, *Roßkreuz.*
*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. no. 1141. t. 2. f. 1141. (umſtändl. Beſchr.)
*Syſt. Nat.* du Regn. anim. II. p. 143. no. 8. *Phalaena* pectinicornis, alis ſupra viridibus, faſcia transverſali ſinuato-dentata glauca.

78. *Libatrix*, der *Näſcher* *).

*Müller* l. c. p. 677. no. 78. der *Näſcher*.

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 684.
Die *Sturmhaube*.

— Magaz. der Entomol. II. p. 10. Phal. *Libatrix*. (Einige Merkwürdigkeiten bey der Verwandlung. Chorh. *Meyer*.) **)

*Berlin. Magaz*. II. p. 414. no. 28. Phal. *Libatrix*, die *Sturmhaube*.
Theils oraniengelb, theils braunroth mit 2 weiſſen Queerſtreifen, und ſtark ausgezakten und ausgeſchwungenen Flügeln.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 742. no. 31. Phal. *Libatrix*, die *Sturmhaube*.

*Wien. Schmetterl.* p. 62. Q. No. 1. *Dotterweidenſpinnerraupe* (Salicis vitellinae); *Dotterweidenſpinner*. Ph. B. *Libatrix*.

*Sulzers* Geſchichte der Inſ. p. 160. t. 21. f. 7. Ph. *Libatrix*, die *Sturmhaube*.

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 10. *Dotterweidenſpinner*.

*Bekm.* Epit. S. L. p. 165. no. 78. Phal. *Libatrix*.

*Syſt. Nat.* du Regn. anim. II. p. 148. no. 24. Phalene *Libatrix*.

*Act. Vpſal.* 1736. p. 25. no. 63.
*Papilio* alis depreſſis eroſis, croceo-rufis.

*Schaeff.* Icon. t. 124. f. 1. 2.

*Scop.* Entom. carn. p. 209. no. 516. Phal. *Libatrix*.
*Long.* lin. 9. *Lat.* 5.
Alae *anticae* cervinae, baſi maculis 4 ochreaceis: media longa prismatica: faſciis binis linearibus

*) Wohnet gern in *Kellern* und dunklen Speiſekammern.

**) Hält die *Röſelſche*, IV. t. 20, welche der Staatsr. *Müller* modeſtam nennet, mit dieſer Libatrix für einerley.

aribus pallidioribus: poſtica duplici, punctis duobus albis, margine externo denticulato, ita ut diſtantia apicis a primo dente eadem ſit, quae ab eodem dente ad angulum poſticum.

*Fabric*. Syſt. Ent. p. 604. no. 62. *Noctua* Libatrix. Nom. *Linn*.

*Larva* nuda, viridis, flavo-annulata; lineis tribus fuſcis; ſtigmatibusque rubris.

*Pupa* folliculata, nigra.

*Raj*. Hiſt. Inſ. p. 183. no. 2.

*Phalaena* media, domeſtica, alis exterioribus rubro, rufo, cinereo et albicante colore variis, cum transverſa linea albicante, imo margine laciniato.

*Poda* Muſ. graec. p. 92. t. 2. f. 9. Phal. *Salictaria*.

*Mülleri* Faun. Frider. p. 42. no. 377. Ph. *Libatrix*. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1377. Phal. *Libatrix*.

— Strigis obliquis tribus, poſtica pallida — cet. *Linn*.

*Geoffr*. Inſ. II. p. 121. no. 26.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis cinereo-flavoque rufis, margine laceris.

La *Découpure*.

*Long*. 10 lign.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 332. no. 1. t. 5. f. 5.

*Phalene* à antennes barbues ſans trompe, à corcelet huppé, à ailes découpées voutées griſes nuancées d'orange, avec deux lignes blancheatres, et deux points blancs.

*Phalene friande*.

*Chenille* à 16 pattes, raſe, veloutée, verte, à deux lignes longitudinales noires bordées de blanc. f. 3.

*Degeer* Inſ. *Ueberſ.* II Th. I B. p. 240. no. 1. t. 5. f. 5. Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, mit einem Kamm auf dem Bruſtſchilde, mit ausgezackten, gewölbten, grauen, orangegelbſchattirten, mit zwo weiſslichen Linien, und zween weiſſen Punkten bezeichneten Flügeln.

Der *Näſcher.*

Die *Raupe* ſechzehnfüſsig, glatt, ſammetgrün, mit zwo längſtheruntérlaufenden ſchwarzen, weiſsgerändelten Linien. f. 3.

79. *Capucina,* der *Kapuzinerſpinner* *).

*Müller* l. c. p. 678. no. 79. der *Kapuziner.*

*Füeßlins* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 685. der *Kapuziner.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 742. no. 32. Phal. *Capucina,* die *Kapuzinermotte.*

*Neuer Schaupl.* der Nat. II. p. 43. die *Kapuzinermotte.*

*Wien. Schmetterl.* p. 63. R.

1) Die Raupen unrichtige Höker, vornämlich auf dem eilften Ringe.

No. 4. *Bachweidenſpinnerraupe* (Salicis vitellinae); *Bachweidenſpinner.* Ph. B. *Capucina.*

*Fabric.* Syſt. Entom. p. 575. no. 65. B. *Capucina.* Nom. *Linn.*

80. *Camelina*, der *Kameelſpinner.*

*Müller* l. c. p. 678. no. 80. t. 22. f. 6. der *Kronenvogel.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 686. der *Flügelzehe.*

*Füeßl.*

*) *Nicht abgebildet.*

*Füeßl.* Magaz. der Entomol. II. p. 11. Phal. *Camelina.*

Häufig und allemal auf *Erlen.* Die *ſeltſame Stellung* ſ. *Réaum.* II. t. 20. f. 10. 11. *Sepp* I. t. 1. f. 2. 7. 10. hat *Röſel* nicht angemerkt. (Chorherr *Meyer.*)

*Berlin. Magaz.* II. p. 414. no. 29. Phal. *Camelina,* die *Kameelmotte.*

Gelbbraun, mit ſtark ausgezackten Oberflügeln, in deren Mitte ein weiſser Punkt und eine Kappe über dem Kopfe; ingleichen eine Spitze am Rande der Oberflügel.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 164. t. 28.

Die meergrüne, glatte, mit einzelnen Härchen beſetzte, und auf dem hinterſten Abſatze mit zwey rothen Stacheln verſehene *Raupe.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 389. no. 5. Phal. *Camelina*, die *Kameelmotte.*

*Wien. Schmetterl.* p. 63. R. no. 3. *Erlenſpinnerraupe* (Betulae Alni); *Erlenſpinner.* Phal. *Camelina.*

La Crête de Coq. *Geoffr.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 335. Phal. *Camelina,* der *Kameelvogel.*

*Fabric.* Syſt. Entom. p. 575. no. 66. B. *Camelina.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, vireſcens, corniculis duobus caudalibus, ſtigmatibus purpureis.

*Pupa* folliculata, antice brunnea, poſtice fuſca.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 111. no. 12. *Phalaena* pectinicornis elinguis, pallido-ruſa, criſta dorſali nigra.

La *crête de coq.*

*Long.* 8 lign.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1378. Phal. *Camelina.* Nom. *Linn.*

*Sepp* Nederl. Inſ. IV. p. 1. t. 1. f. 1-10. *Kroon-Vogeltje.*

81. Oo, das *doppelte O.*

*Müller* l. c. p. 678. no. 81. die *Nullnull.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 687. das *doppelte O.*

*Berlin. Mag.* II. p. 414. no. 30. Phal. *O o*, das *doppelte O.*

Weiſsgrau, mit röthlichen Zeichnungen auf den Oberflügeln, welche unter andern zwey *O* vorſtellen.

*Maders* (Kleemanns) Raupenkalender, p. 17. no. 25. Phal. O o, das *doppelte O.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 311. t. 63.

Die glatte, braunrothe, mit beſondern weiſſen Flecken gezierte, ſchwarzköpfige *Raupe.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 647. no. 12. Phal. Oo, das *doppelte O.*

*Wiener Schmetterl.* p. 87. T. *Mordraupen*, Larvae *Larvicidae; gewäſſerte Eulen.* Phal. *Noctuae* undatae.

1) Die Oberflügel gelblicht.

No. 1. *Viereicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Viereicheneule.* Phal. *Noctua* O o.

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 390. Phal. O o.

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 575. no. 63. B. *Oo.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, rubra; punctis lineisque albis, dorſali interrupta, capite nigro.

*Pupa* nuda rubra, ſtigmatibus albis.

*Unab-*

## *Unabgebildete Spinner.*

(Bombyces.)

1. No. 60. *Dictaea.*
2. No. 66. *Morio.*
3. No. 79. *Capucina.*

## *Neue Arten von Spinnern* *).

Phal. *Bombyces.*

1. Ph. BOMB. *Diaphana*, der *durchsichtige Spinner.*

*Seligm.* ausl. Vögel, II B. t. 70.

Corpus craſſum; colore glauco, ſtriga longitudinali, quatuorque transverſis flavis, tribusque alternantibus atris. Abdomine binis flavis lunulis lateralibus. Alae *hyalinae*, Tipuliformes, vero ſenſu *alepidopterae.*

2. *Porcellanea*, der *Porzellanſpinner.*

*Berlin. Magaz.* II. p. 420. no. 38.

Albo-griſea; margine interiore toto, anteriore ſemifuſco.

3. *Veſtigialis*, der *Erdläufer.*

*Berlin. Magaz.* II. p. 422. no. 42.

Albogriſea; alis *anticis* fuſco-maculatis; *poſticis* albogriſeis concoloribus.

*Naturforſcher* VIII. p. 107. no. 43.

Ph. *Veſtigialis.* Statura Phal. Chryſorrhoeae (vom Hrn. *von Rottemburg* umſtändlicher beſchrieben).

4. *Pu-*

*) Ich habe bloſs die allgemeine *Klaſſe*: Spinner oder Bombyx, beybehalten, ohne mich auf die beſondern Eintheilungen des *Linné* einzulaſſen.

4. *Putris*, der *Einſiedler.*

*Berlin. Magaz.* II. p. 424. no. 44.
Obſcure griſea, virideſcens, fuſco-ſparſim maculata.

*Naturforſcher* VIII. p. 108. Ph. *Putris.*
Nicht *Putris* L. (vom Hn. v. *Rottemb.* umſtändlich beſchrieben).

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 651. no. 26. Phal. *Putris*, der *Einſiedler.*

5. *Clavis*, die *Nagelmotte.*

*Berlin. Magaz.* II. p. 426. no. 47.
Griſea; anticarum macula fuſca *Reni*-ſ. *Claviformi.*

*Naturforſcher* VIII. p. 109. no. 47. Phal. *Clavis.*
(Hr. *von Rottemb.* macht es wahrſcheinlich, daſs dieſe Clavis eine beſondere Gattung, und nicht das Weibchen von der in dem folgenden von *Hufnagel* angeführten Phal. *Clavus* oder *Exclamationis* Linn. ſey.)

6. *Gibboſa*, der *Buckelſpinner.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 39. no. 355.
*Criſtata; alis* griſeis nigro-punctatis, ſtriga maculisque flavis; *tergo* tuberculis duobus.

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1374. Ph. *gibboſa.*
In *Pruno ſpinoſo.*

7. *L nigrum*, der *ſchwarze L-Spinner.*

*Mülleri* Faun. Frid. p. 40. no. 360. Elinguis, criſtata: *alis* candido-pellucidis: primoribus littera *L nigra.*

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1373. Ph. *L nigrum.*
In *pratis.*

8. *Mo-*

8. *Modesta*, der *sanftfarbige Spinner.*

*Mülleri* Faun. Frid. p. 42. no. 378.

Alis erosis flavo-rubentibus; strigis obliquis tribus, postica pallida, punctisque duobus albis. In *Salice.*

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1377.*)

*Rösels* Insektenbel. IV. p. 141. t. 20. die schöne gelblichtgrüne *Raupe* des Weidenbaums.

9. *Similis*, der *Schwan.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 35. no. 662.

Auf den *Schwarzdornen* und Obstbäumen ziemlich gemein; lebt niemals gesellschaftlich unter einem Gespinnst, wie die Chrysorrhoea und andere.

— Magaz. der Entomol. I. p. 287. Phal. *Similis*, der *Schwan.*

Die Raupen *häuten* sich öfter als irgend eine bekannte Art. (Chorh. *Meyer.*)

*Maders* (Kleem.) Raupenkalender, p. 101. no. 287. p. 111. no. 310. Phal. *Similis*, der *Schwan.*

*Frisch* Ins. III. t. 1? **).

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 134. t. 21. die kleine, haarige, schwarze, rothgestreifte und weißgefleckte *Raupe.*

10. *Sphinx*, der *Storch.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 400. no. 75. Schwärzlich grau, flammicht gezeichnet.

*Na-*

*) Dem Anschein nach seine Meynung geändert, und mit *Libatrix* L. für einerley gehalten.

**) Dies Zitatum hat Hr. *Füeßl.* nur fragweise gesetzt, und es trifft auch nicht zu.

*Naturforscher* IX. p. 133. no. 75. Ph. *Sphinx* — keine Noctua, sondern ein *Bombyx.*

*Röſels* Inſektenbel. III. p. 239. t. 40. f. 1-5. Die auf Eichen und Linden ſich aufhaltende blaſsgrüne *Raupe*, mit vier gelben, und einer weiſsen Linie, an welcher der letzte Abſatz mehr als die übrigen erhöhet iſt.

11. *Auſtralaſiae*, der *neuholländiſche groſsbärtige Spinner.*

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 562. no. 22. Bomb. *Auſtralaſiae.*

Alis reverſis *helvolis:* poſticis baſi ſubtus ferrugineis.

*Palpi* magni, valde compreſſi, obtuſiſſimi.

12. *Stigma*, der *ſüdamerikaniſche weiſspunktirte Spinner.*

*Fabric.* S. E. p. 563. no. 25. B. *Stigma.*

Alis reverſis, teſtaceis, fuſco-irroratis, *punctoque centrali niveo.*

13. *Amphimene*, der *ſüdländiſche braunpunktirte Spinner.*

*Fabric.* S. E. p. 563. no. 27. B. *Amphimene.* — In *Terra del Fuego.*

Alis ſubreverſis, integris, cineraſcentibus; ſtrigis duabus nigris; *anticis puncto medio fulvo.*

14. *Ocularia*, der *ſüdamerikaniſche Augenſpinner.*

*Fabric.* S. E. p. 564. no. 29. B. *ocularia.* *Magna.*

Alis ſubreverſis albis: *punctis ocellaribus* nigris numeroſis.

15. *Hibi-*

15. *Hibiſci*, der *oſtindianiſche Ibiſch-Ketmiaſpinner.*

*Fabric.* S. E. p. 564. no. 30. B. *Hibiſci.*

Alis ſubreverſis concoloribus luteis; anticis ſtrigis duabus, poſticis unica.

16. *Ceraſi*, der *engliſche Kirſchenſpinner.*

*Fabric.* S. E. p. 564. no. 31. B. *Ceraſi.*

Alis reverſis luteis, ſtrigis duabus punctoque medio fuſcis poſticoque albo.

17. *Lagopus*, der *chineſiſche ſtreckfüſsige Spinner.*

*Fabric.* S. E. p. 568. no. 45. B. *Lagopus.*

Alis deflexis flaveſcentibus; atomis ſtrigisque duabus fuſcis; *pedibus anticis porrectis* hirſutiſſimis.

18. *Imperialis*, der *indianiſche Kaiſerſpinner.*

*Fabric.* S. E. p. 569. no. 46. B. *Imperialis.*

Alis flavis fuſco-maculatis, omnibus macula ſubocellari ferruginea.

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 17. t. 9. f. 1. 2.

Il déploye ſes ailes environ *quatre pouces et trois quarts.* — de la *Nouvelle York.* Ils engendrent *deux fois* l'année: en Juin et Septembre.

19. *Craſſicornis*, der *indianiſche dickhornichte Spinner.*

*Fabric.* S. E. p. 569. no. 47. B. *Craſſicornis.*

Alis deflexis cinereis: atomis ſtrigisque undatis fuſcis.

*Antennis* pectinatis, flexuoſis, *baſi craſſiſſimis*, apice tenuioribus.

20. *Dione*, die *amerikaniſche Dione.*

*Fabric.* S. E. p. 572. no. 54. B. *Dione.*

Alis deflexis albis, nigro-ſtriatis, punctatisque, ſubtus margine purpureo.

21. *Alphaea*, die *neuholländiſche braune Punktſtreiſe.*

*Fabric.* S. E. p. 573. no. 57. B. *Alphaea.*

Alis deflexis ferrugineis; puncto medio albo ſtrigaque punctata fuſca.

22. *Flava*, der *indianiſche Gelbling.*

*Fabric.* S. E. p. 574. no. 59. B. *flava.*

Alis deflexis *flaviſſimis;* apice punctis tribus nigris.

23. *Lutea*, der *neuholländiſche leimfarbige Spinner.*

*Fabric.* S. E. p. 574. no. 60. B. *Lutea.*

Alis deflexis, flaviſſimis, immaculatis.

24. *Laeta*, der *ſchwediſche Weißling.*

*Fabric.* S. E. p. 576. no. 69. B. *Laeta.*

Alis deflexis; *anticis niveis*, faſcia lata nigra; antennis ſimplicibus.

25. *Milhauſeri*, der *dresdenſche braungefleckte Spinner.*

*Fabric.* S. E. p. 577. no. 70. B. *Milhauſeri.*

Alis deflexis, canis; *maculis duabus dorſalibus fuſcis;* antennis apice ſetaceis.

*Larva* viridis, *ſpinis dorſalibus furcatis;* pedibus ſubcaudalibus nullis.

*Pupa* folliculata, brunnea, antice acuminato-emarginata.

26. *Popularis*, der *deutſche Landmann.*

*Fabric.* S. E. p. 577. no. 71. B. *popularis.*

Alis deflexis, fuſcis, albo-ſtriatis; *ſtigmatibus albis*, *pupilla brunnea.*

27. *Strigula*, der *dresdensche Streifling.*

*Fabric.* S. E. p. 577. no. 72. B. *Strigula.*

Alis deflexis; *anticis* griseis apice albo-nigroque striatis.

28. *V nigrum*, das *sächsische schwarze V.*

*Fabric.* S. E. p. 577. no. 73. B. *V nigrum.* In Saxoniae *tilia.*

Alis deflexis, albis, *V nigro* notatis.

*Larva* fasciculata; fasciculis dorsalibus octo, anticis posticisque albis, collari hirsutissimo.

*Pupa* viridis, macula thoracis nigra.

*Füeßl.* Magaz. der Entomol. II. p. 86. no. 3. Bomb. *V nigrum.*

*Naturforscher* II. p. 16. §. 6. no. 1. t. 1. f. 1. (D. *Kühn.*)

Eine *weißgrüne Phaläne* zu Ende des Junius, aus einer weissbuschichten Raupe auf den *Linden.* Sie unterscheidet sich besonders durch *zwey schwarze Haken* auf den Oberflügeln, und durch die schwarzgefleckten Füsse.

— XII. p. 56. (*Walch*) *Raupe* t. 1. f. 8. *Puppe* t. 1. f. 9. 10.

29. *Tibialis*, der *neuholländische gelbschenklichte Spinner.*

*Fabric.* S. E. p. 578. no. 76. B. *tibialis.*

Alis deflexis niveis; *tibiis anticis flavescentibus*, nigro-punctatis.

30. *Obsoleta*, der *neuholländische verwischte Spinner.*

*Fabric.* S. E. p. 579. no. 77. B. *obsoleta.*

Alis deflexis, albidis; costa palpisque ferrugineis.

31. *Corones*, der *neuholländische Blutmund.*

*Fabric.* S. E. p. 579. no. 78. B. *Corones.*

Alis deflexis; *anticis* cinereis, *posticis* niveis — *ore subsanguineo.*

32. *Festiva*, der *amerikanische Staatsspinner.*

*Fabric.* S. E. p. 579. no. 79. B. *Festiva.*

Alis deflexis, flavescentibus, basi coeruleo-maculatis, apice nigro-punctatis.

33. *Vidua*, die *englische Wittwe.*

*Fabric.* S. E. p. 580. no. 84. B. *Vidua.*

Alis deflexis fuscis; *anticis* cinereo-subfasciatis; *posticis* macula baseos fasciaque rufis.

34. *Deflorata*, die *amerikanische Schwarzstirn.*

*Fabric.* S. E. p. 582. no. 89. B. *deflorata.*

Alis deflexis, albis, nigro-maculatis; *posticis* subtus atris, fasciis albis.

35. *Crotalariae*, der *ostindische Klapperschotenspinner.*

*Fabric.* S. E. p. 583. no. 90. B. *Crotalariae.*

Alis incumbentibus; *anticis* purpurascentibus, maculis ocellaribus atris; *posticis* rubris, nigro-maculatis.

36. *Ricini*, der *ostindische Wunderbaumspinner.*

*Fabric.* S. E. p. 583. no. 91. B. *Ricini.*

Alis incumbentibus, obscuris, maculis numerosis subocellaribus, fuscis, posticis rubris, nigro-maculatis.

37. *Credula*, der *amerikanische Blutfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 584. no. 94. B. *Credula.*

Alis

Alis incumbentibus, corporeque atris, albo-punctatis. — *Macula oblonga sanguinea* punctis duobus nigris ad basin alae *anticae* *).

38. *Jesuita*, der *indianische Jesuit*.

*Fabric*. S. E. p. 586. no. 104. B. *Jesuita*.

Alis incumbentibus atris, stria fulva.

39. *Vestita*, das *sächsische Haarkleid*.

*Fabric*. S. E. p. 586. no. 105. B. *vestita*.

Alis incumbentibus nigris immaculatis, *abdomine subtus villoso*, albo. In *Saxoniae Corylo*.

*Larva* grisea, nigro-punctata, degit intra cylindrum e graminibus aridis filo connexis constructum, quem foliis adfigit.

40. *Gloriosae*, der *ostindische Prachtlilienspinner*.

*Fabric*. S. E. p. 587. no. 40. B. *Gloriosae*.

Alis incumbentibus atris, rubro-flavoque variegatis; *posticis* nigris, margine flavo.

41. *Crini*, der *ostindische Liliennarcissenspinner*.

*Fabric*. S. E. p. 587. no. 108. B. *Crini*.

Alis incumbentibus atris, ante marginem subferrugineis; posticis albis.

42. *Rosea*, der *rosenflüglichte Spinner*.

*Fabric*. S. E. p. 587. no. 109. B. *rosea*.

 Alis

*) Hier folgt im *Fabric*. no. 100. B. *Pylotis*, wobey Drury II. t. 6. f. 3. angeführt, und ihr der Name Phal. *Pylotis* beygelegt ist; allein im *Drury* selbst ist sie Phal. *Noctua Astrea* genannt: mithin scheint es wohl eine Verwechselung zu seyn, da kurz vorher t. 5. f. 3. Phal. *Bomb*. *Pylotis* stehet, den *Fabric*. aber schon unter seinen Zygaenis p. 554. no. 19. aufgestellet hat. Denn

Alis incumbentibus *roſeis*, ſtrigis tribus fuſcis, ſecunda undata, tertia punctata.

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 227. no. 86.

*Phalaena* minor, alis velut miniaceis, punctis et lineolis nigris in medio notatis.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 121. no. 25.

*Phalaena* pectinicornis, elinguis, alis deflexis, roſeis; ſuperioribus punctorum arcuumque nigrorum ordine duplici.

La *Roſette.*

*Long.* 6 lign.

*Forſteri* Nov. ſpec. Inſ. p. 75. no. 75. Phal. GEOMETRA *) *Miniata.*

Seticornis, alis rotundatis, *omnibus pallide miniatis*, anticis linea undata ad baſin, characteribus in medio et punctis verſus marginem poſticum nigris.

In *Quercetis Angliae.*

*Harris* Inſ. t. 30. f. p.

*Wiener Schmetterl.* p. 68. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; ſchabenartige Eulen*, Ph. *Noct. tineiformes.*

No. 10. Unbekannte *Raupe; fleiſchfarbene rothgerändelte Eule*, Ph. *Noct. Rubicunda.*

43. *Sulphurea*, der *ſchwefelgelbe Spinner.*

*Fabric.* Gen. Inſ. c. Mant. p. 279. 60 · 61. B. *Sulphurea.*

Alis deflexis flaviſſimis, ſtrigis duabus obliquis obſcurioribus.

44. *Gno-*

Denn dieſe Phalaena *Aſtrea* iſt offenbar eine Noctua, obgleich die vom Fabricio gegebene Beſchreibung richtig zutrifft.

*) Da die Schriftſteller wegen dieſer Phaläne ſo uneins ſind, und ſie der eine unter die *Bombyces*, der andere unter die *Noctuas*, der dritte unter die *Geometras* rechnet, ſo ſind wir bey dem Fabric. geblieben.

44. *Gnoma*, der *Haubenſpinner*.

*Fabric*. Mant. p. 279. 64-65. B. *Gnoma. Hamburgi.*
Alis deflexis ſubdentatis cinereo-albis; *vitta marginali atra* macula alba.

45. *Compreſſa*, der *Weißmond*.

*Fabric*. Mant. p. 279. 69-70. B. *compreſſa.*
Alis compreſſo-adſcendentibus niveis, macula communi fuſca, centrali griſea; *lunula alba.*
*Naturforſch.* XIII. p. 27. t. 3. f. 4. a. f. 4. b. Phal. *Geometra modeſta.*
Seticornis, antrorſum alis ſuperioribus dilute cinereis, macula fuſca nigro-punctata, inferioribus cinereis unicoloribus.
(Dieſe Phal. iſt die Phal. *compreſſa* Fabric. Mant. 1. *Walch.*)

46. *Colon*, der *Kolonſpinner*.

*Fabric*. Mant. p. 281. 95-96. B. *Colon.*
Alis incumbentibus griſeo-fuſcis, punctis duobus nigris diſtantibus.

47. *Annulata*, der *Weißringel*.

*Fabric*. Mant. p. 281. 106-7. B. *annulata.*
Alis incumbentibus, atris, niveo-maculatis; *tibiis* albo-annulatis.

48. *Fulminea*, die *Braunſchecke*.

*Fabric*. Mant. p. 282. 106-7. B. *fulminea.*
Alis incumbentibus griſeo-fuſcoque variegatis; thorace antice albo ſtriga nigra.
*Naturforſcher* XIII. p. 29. t. 3. f. 6. a. b. Phal. *Noctua* nebuloſa.
Antrorſum alis ſuperioribus fuſcis nebuloſe maculatis, inferioribus dilute cinereo-fuſcis, retror-

trorſum alis unicoloribus dilute fuſcis leviſſime viridescentibus, nigro puncto in medio fere notatis.

(Dies Ph. *fulminea* Fabric. Mant. 1. *Walch.*)

49. *Praelata*, der *Prälat.*

*Scop.* Entom. carn. p. 198. no. 494.

*Long.* lin. 9½. *Lat.* 4⅓.

Alba; alis politis; abdominis apice barbato; tibiis fuſcis, albo-annulatis. In *Salice.*

Subelinguis, corpore nigro, ſed albis villis undique tecto. Antennae foeminae ſetaceae, albidae.

Hoc poſui, ut diſtinguatur a *Chryſorrhoea* et *Salicis.*

50. *Pyri*, der *Birnſpinner.*

*Scop.* Ent. carn. p. 199. no. 498.

*Long.* lin. 7½. *Lat.* 5.

Cinnamomea; dorſo tomentoſo; alis *anticis* ſupra ſtrigis duabus pallidioribus; *poſticis* ſubtus limbo pallidiore.

In *Pyro* larva reperta et in foliis *Populi albae.*

*Larva* ſuperne nigra, linea dorſali et laterali glaucis, quibus adjacet linea alia fulva; capite glauco, punctis duobus nigris. Folliculus duplex, albus, tenuis, oblongus.

51. *Eremita*, der *Eremit.*

*Scop.* Ent. carn. p. 201. no. 501.

*Long.* lin. 9½. *Lat.* 6.

Alae cinereae; *anticae* atomis faſciisque abruptis fuſcis tribus, dorſo faſciis tribus nigris.

Inveni

Inveni 30 April. in *Sylva Idrienſi*, inſidentem Eccleſiae muro.

52. *Idrienſis*, der *idriſche Waldſpinner.*

*Scop.* Ann. 5. hiſt. nat. p. 113. no. 121.

Alae *anticae* fuſco-flavae, maculis luteis marginalibus 5; *poſticae* luteae maculis nigris 4; ambae ſubtus concolores, flavae nigro-maculatae et faſciatae. Statura *Cajae.*

Diverſa a *Dominula Linn.*

53. *Bicoloria*, der *weiſſe gelbgefleckte Spinner.* — *Unbekannte Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 49. A. No. 3.

54. *Querna*, *Hageichenſpinner* (Quercus Roboris).
*Wiener Schmetterl.* p. 49. A. No. 5.

55. *Dodonaea*, *Kahneichenſpinner* (Quercus Roboris).
*Wiener Schmetterl.* p. 49. A. No. 6.

56. *Chaonia*, *Steineichenſpinner* (Quercus Roboris).
*Wien. Schmetterl.* p. 49. A. No. 7. *)

57. *Rubea*, *Heckeichenſpinner* (Quercus roboris).
*Wien. Schmetterl.* p. 51. C. No. 2. **)

58. *Nivoſa*, *Wintereichenſpinner* (Quercus Roboris).
*Wien. Schmetterl.* p. 52. D. No. 1.

D 5 59. *Au-*

*) Dieſe 4 *mondmaklichte Spinner:* Ph. Bomb. *Lunigerae; Scheinſchwärmerraupen*, Larvae *Sphingiformes.*

**) Zu den *nacktflüglichten Spinnern:* Ph. B. *Subnudae; Knoſpenraupen*, L. *Tuberoſae.*

59. *Auriflua*, *Gartenbirnſpinner* (Pyri communis *Sativae*).
*Wien. Schmetterl.* p. 52. D. No. 4. *)

60. *Maculoſa*, *Klebekrautſpinner* (Galii Apparines).
*Wien. Schmetterl.* p. 54. E. No. 10. **)

61. *Menthaſtri*, *Roßmünzenſpinner* (Menthae Sylveſtris).
*Wien. Schmetterl.* p. 54. F. No. 2.

62. *Luctifera*, *Spitzwegerichſpinner* (Plantaginis lanceolatae).
*Wien. Schmetterl.* p. 54. F. No. 4. ***)

63. *Abietis*, *Tannenſpinner* (Pini Abietis. *Cluſ.* Piceae *Linn.*).
*Wien. Schmetterl.* p. 55. G. No. 2. †)

64. *Anachoreta*, *Korbweidenſpinner* (Salicis Amygdalinae).
*Wien. Schmetterl.* p. 56. H. No. 3.

65. *Recluſa*, *Rosmarinweidenſpinner* (Salicis Rosmarinifoliae).
*Wien. Schmetterl.* p. 56. H. No. 4. ††)

66. *Lobulina*, *Kienbaumſpinner* (Pini Sylveſtris).
*Wien. Schmetterl.* p. 57. K. No. 6.

67. *Tri-*

*) Dieſe beyden zu den *weiſslichten Spinnern*: Phal. B. *Albidae*; *Knöpferaupen*, Larvae *Nodoſae*.

**) Zu den *edlen Sp.* Ph. B. *Nobiles*; *Bärenraupen*, L. *Vrſinae*.

***) Dieſe beyde zu den *gelbfüßigen* Sp. Ph. B. *Luteopedes*; *Haſenraupen*, L. *Celeripedes*.

†) Zu den *ſtreckfüßigten* Sp. Ph. B. *Tendipedes*; *Bürſtenraupen*, L. *Faſciculatae*.

††) Dieſe beyde zu den *ſtirnſtreifichten* Sp. Phal. B. *Signatae*; *Schopfraupen*, L. *criſtatae*.

67. *Trifolii*, *Wiesenkleespinner* (Trifolii pratensis).
*Wien. Schmetterl.* p. 57. K. No. 4. *)
La Chenille du Gazon *Réaum.* Tom. I. p. 520. t. 2. f. 19.

68. *Rimicola*, *Zerreichenspinner* (Quercus Cerris).
*Wien. Schmetterl.* p. 57. L. No. 1.

69. *Franconica*, *Quekeneichenspinner* (Tritici repentis).
*Wien. Schmetterl.* p. 57. L. No. 6.

70. *Taraxaci*, *Butterblumspinner* (Leontodontis Taraxaci).
*Wien. Schmetterl.* p. 57. L. No. 7.

71. *Pityocampa*, *Fichtenspinner* (Pini Sylvestris et piceae).
*Wien. Schmetterl.* p. 58. L. No. 11. **)
La Chenille du Pin. *Réaum.* (Πιτυοκάμπη *Dioscor.*)
*Füeßl.* Magaz. der Entomol. II. p. 232. t. 3. f. 1-5. Geschichte des *Fichtenspinners* ***).
— *Neues Magaz.* der Ent. I. p. 44. Nachtr. zur Geschichte des *Fichtenspinners* (vom D. *Amstein*).

*Réaum.*

*) Diese beyde zu den *weißmaklichten* Sp. Ph. B. *Centropunctae*; *Pelzraupen*, L. *Villosae*.

**) Diese 4 zu den *wollichten* Sp. Ph. B. *Tomentosae*; *Haarraupen*, L. *Pilosae*.

***) 1. Die Raupen leben gesellschaftlich in einem Gespinnste, kommen nur des Nachts heraus und fressen, verspinnen aber am Tage die Oeffnung wieder.

2. Ihre Länge anderthalb Zoll, schwarzleibig, mit grauen Haaren absatzweise auf beyden Seiten, und dergleichen gelben, nebst einer Art Wulst auf jedem Absatz oben auf dem Rücken. 16 rothgelbe Füsse.

3. Ge-

*Réaum.* Mém. pour ſervir à l'hiſt. des Inſ. Tom. II. p. 149. La Chenille *du Pin.* t. 8. f. 1-12.

72. *Oleagina, Schlehenſpinner* (Pruni ſpinoſae). *Wien. Schmett.* p. 59. M. No. 2.

73. *Trimacula, graulichter Spinner mit drey vereinigten weiſſen Makeln.*
*Wien. Schmetterl.* p. 59. M. No. 4. *Unbekannte Raupe* *).

74. *Terebra, Salbenbaumſpinner* (Populi nigrae). *Wiener Schmetterl.* p. 60. N. No. 2. **)

75. *Hamma, zimmetbräunlicher, dunkel- und weiſsgezeichneter Spinner* (Weibchen).
*Wien. Schmetterl.* p. 61. O. No. 2. *Unbekannte Raupe.*

76. *Flina, rothbrauner, ſilberweiſs* — das Weibchen, *braungraulichter blaſs-gezeichneter Spinner.*
*Wiener Schmetterl.* p. 61. O. No. 3. *Unbekannte Raupe.*

77. *Jo-*

3. Gehen wie die *Prozeſſionsraupen*, eine voran, auf einem mit Seide beſponnenen Wege, vier Zoll tief in die Erde zur Verwandlung.

4. Die Haare verurſachen ein empfindliches Jucken im Geſicht und an den Händen.

6. Nach *Füeſsl.* Abbild. geb' ich folgende Beſchreibung: Ph. B. Corpore aurantiaco, ano cinereo; alis *anticis* cinerascentibus, binis faſciis transverſis fuſcis undulatis; *poſticis* pallidioribus, macula nigricante marginali.

*) Dieſe beyde zu den *groſsſtirnichten* Sp. Ph. B. *Capitones; Halbhaarraupen*, L. *Subpiloſae.*

**) Zu den *bleichringichten* Sp. Phal. B. *Albocinctae*; *Holzraupen*, L. *Lignivorae.*

77. *Jodutta*, *hellbrauner* — das Weibchen *graubräunlicher*, *weiſsgezeichneter Spinner*.
*Wien. Schmetterl.* p. 61. O. No. 6. *Unbekannte Raupe.* *)

78. *Caſſinia*, *Graslindenſpinner* (Tiliae Europ.)
*Wien. Schmetterl.* p. 61. P. No. 1. *Graslindenſpinnerraupe.* La *Caſſini* Valm.

79. *Plumigera*, *Ahornſpinner* (Aceris campeſtris).
*Wien. Schmetterl.* p. 61. P. No. 2.
*Naturforſch* III. p. 3. t. 1. f. 2. der *groſse Schnurrbart.* (D. Kühn.)
*Füeſsl.* Magaz. der Entomol. II. p. 106. Ph. B. *Plumigera.* **)

80. *Argentina*, *Eichbuſchſpinner* (Quercus Roboris frutesc.).
*Wien. Schmetterl.* p. 62. R. No. 2. Tab. I. b. fig. 2.
— — p. 250. §. 5. La *Phalène* à antennes en peigne et à taches argentées; L' *Argentée.*

81. *Tritophus*, *Zitterpappelſpinner* (Populi Tremulae).
*Wien. Schmetterl.* p. 63. R. No. 6. ***)

82. *Terrifica*, *Truffeichenſpinner* (Quercus Roboris).
*Wien. Schmetterl.* p. 63. S. No. 1. †)

83. *Si-*

*) Dieſe 3 zu den *ſchmalflüglichten Sp.* Ph. B. *Lanceolatae*; *Wurzelraupen*, L. *Radicivorae.*

**) Dieſe 2 zu den *haarichten* Sp. Ph. B. *Hiſpidae*; *Scheineulenraupen*, L. *Noctuiformes.*

***) Dieſe beyde zu den *rückenzähnichten* Sp. Ph. B *Dorſo-dentatae*; *Buckelraupen*, L. *Gibboſae.*

†) Dieſer zu den *zackenſtriemichten* Sp. Ph. B. *Flexuoſo-ſtriatae*; *Gabelraupen*, L. *Furcatae.*

83. *Sicula, Magenſpinner* (Betulae albae).
*Wien. Schmetterl.* p. 64. T. No. 1.

84. *Flexula, röthlichgrauer Spinner mit doppelt ausgeſchweiftem Unterrande.*
*Wiener Schmetterl.* p. 64. T. No. 3. *Unbekannte Raupe.*

85. *Hamula, Rothbuchenſpinner* (Fagi Sylvaticae).
*Wien. Schmetterl.* p. 64. T. No. 4.
Le Cheval marin *Réaum.*

86. *Spinula, Schlehendornſpinner* (Pruni ſpinoſae).
*Wien. Schmetterl.* p. 64. T. No. 6. *)
La Chenille *à queue ſimple* de l'aubépine. *Réaum.*

87. *Teſtudo, Zwergeichenſpinner* (Quercus Roboris *pumilae*).
*Wien. Schmetterl.* p. 65. V. No. 1.

88. *Aſella, Alberbuſchſpinner* (Populi nigrae *frutic.*).
*Wien. Schmetterl.* p. 65. V. No. 2.

89. *Auſtera, röthlichgrauer braungezeichneter Spinner.*
*Wien. Schmetterl.* Nachtr. p. 310. N. 9. (7-8.) Familie A. Unbek. *Raupe.*

90. *Populifolia, Weiſsäſpenſpinner.*
*Wien. Schmetterl.* Nachtr. p. 310. No. 5. (1-2.) Familie I.

91. *Carna, trübgrauer weiſspunktenſtreiſiger Spinner.*
*Wien. Schmetterl.* Nachtr. p. 310. No. 7. (3. 4.) Familie O. Unbek. *Raupe.*

92. *Cu-*

*) Dieſe drey zu den *ſpannerförmigen* Sp. Ph. B. *Geometriformes; Spitzraupen,* L. *Cuſpidatae.*

92. *Cucullina*, *brauner*, *abwärts weiſsgerändelter Spinner.*

*Wien. Schmetterl.* Nachtr. p. 311. No. 8. (4.5.) Familie R. Unbek. *Raupe.*

93. *Caeſarea*, das *Kaiſervögelein.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 246. t. 30. f. 1-5.

Die ſchnelllaufende ſchwarzhaarichte mit einem gelben Rückenſtreif gezierte *Bärenraupe.*

Alis triſtiſſimis nigris, *poſticarum* margine interiore, abdomineque luteis.

Viel ähnliches mit der Phal. *proceſſionea* L. S. *Naturf.* XIII. t. 2. f. 11.

*Maders* (Kleem.) Raupenkalender, p. 49. no. 133. das *Kaiſervögelein*, et no. 193.

94. *Alpina*, das *Alpenvöglein.*

*Sulzers* Geſch. der Inſ. p. 159. Ph. B. Alpina. t. 21. f. 5. *Mas.*

Silberfarb; auf den Vorderflügeln drey, auf den hintern zween undeutliche bräunliche Queerſtreifen. Fig. 6. das *Weibchen:* ſammetſchwarz, vorn an der Bruſt dicke, ſonſt dünne mit grauen Haaren beſetzt; *kaum Spuren der Flügel.*

95. *Viridi-alata*, der *Grünflügel.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 120. no. 124.

*Phalaena* pectinicornis, elinguis, antennis et corpore luteis, alis deflexis viridibus.

La *Phalene jaune à ailes vertes.*

*Long.* 6 lign.

96. *Gagathes*, der *achatfarbige Spinner.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 124. no. 30.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis superioribus cinereis fusco-marmoratis, inferioribus cinereis.

La *Phalene agathe.*

*Long.* 9. *lign.*

97. *Bipunctata*, der *Zweypunkt.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 124. no. 31.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, limbo nigro-punctato, superioribus fascia duplici nigro-lutea, maculaque duplici alba puncto nigro insignita.

Le *double point.*

*Long.* 8 lign.

98. *Vndulata*, der *gewässerte Spinner.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 130. no. 41.

*Phalaena* pectinicornis, spirilinguis, alis deflexis nigro-fuscoque undulatis, inferioribus albis.

La *Phalene brune à ailes inférieures blanches.*

*Long.* 7. Lign.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 337. no. 1. t. 5. f. 8.

*Phalene* à antennes barbues, à trompe; à corcelet huppé, avec une ligne noire, à ailes rabatues égales, d'un brun griseatre avec trois cercles ovales d'un brun obscur, et dont les ailes inférieures sont blanches.

*Phalene brune* à ailes inférieures blanches.

— Uebers. II Th. 2 B. p. 244. no. 1. t. 5. f. 8.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern; einem Saugrüssel, einem Rückenkamm mit schwarzer Linie, und gleich niederhangenden braungraulichen Flügeln, mit drey eyrunden dunkelbraunen Zirkeln, aber weissen Unterflügeln.

Die

Die *braune Phaläne mit weissen Unterflügeln.*

99. *Damaretta*, die *Damarette.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 130. no. 42.

*Phalaena* pectinicornis ſpirilinguis triangularis, alis deflexis nigro-roſeis, faſciis transverſis nigricantibus.

La *Damarette.*

*Long.* 4½ lign.

100. *Criſtata*, der *Toupéſpinner.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 131. no. 43.

*Phalaena* pectinicornis ſpirilinguis, corniculis criſtatis, alis deflexis ochroleucis, linea duplici transverſa ſaturatiore.

Le *toupet tanné.*

*Long.* 5 lign.

101. *Cuneata*, der *neuyorkiſche Keilſpinner.*

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 15. t. 7. f. 3.

— Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.*

Alis flavicantibus; *anticis cuneo*, faſcia longitudinali, margineque interiore *aterrimis*; *poſticis* binis punctis margineque exteriore fuſceſcentibus: corpore quinis lituris transverſis nigris.

102. *Fulminea*, der *ſmyrniſche Blitzſtrahl.*

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 31. t. 16. f. 3.

Ses ailes près de *quatre pouces et demi.*

*Magna.* Alis fuſco-rubeſcentibus; *anticis* binis lineis *obliquo-fulmineis.*

103. *Liturata*, der *neuyorkiſche ſchwarzgeſtrichelte Spinner.*

*Drury* Illuſtr. of. nat. hiſt. Vol. I. p. 36. t. 18. f. 4.

Ses ailes *un pouce et trois huitiemes.*

Alis albicantibus; maculis numeroſis *nigro-lituratis.*

104. *Rubro-collaris*, das *bengaliſche rothe Halsband.*

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 11. t. 6. f. 4. Phal. Bomb. *Glaucopis.*

Ses ailes *deux pouces et un quart.*

Alis nigro-glauceſcentibus concoloribus; *anticis* binis faſciis transverſis niveis; *collari hilari-rubro.*

105. *Figurata*, der *virginiſche Bilderſpinner.*

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 22. t. 12. f. 4.

Ses ailes presque *un pouce et demi.*

Alis concoloribus atris; *anticis* flavo-*poſticis* hilari-rubro-*figuratis.*

106. *Virginienſis*, das *virginiſche Weißauge.*

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 23. t. 13. f. 2.

Ses ailes presque *deux pouces*, *et cinq huitiemes.*

Alis concoloribus fuſcis; *anticis puncto ocellari* albo, pupilla glauceſcente.

107. *Egle*, die *neuyorkiſche Schwarzader.*

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 35. t. 20. f. 3.

Ses ailes *un pouce et ſept huitiemes.*

Alis concoloribus fuſcis, nigro-venoſis.

108. *Marginata*, der *jamaische weisse Punktrand.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 38. t. 22. f. 2.

Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*

Alis concoloribus furvis; *posticis* basi albofasciatis, disco ovali albo, antice acuminato margine exteriore quinis punctis albicantibus; ano sanguineo.

109. *C nigrum*, das *schwarze C.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 338. no. 3. t. 5. f. 10.

*Phalene* à antennes barbues, à trompe, à ailes rabatues égales grises nuancées de brun, et marquées d'un C noir.

*Phalene C noir.*

— *Uebers.* II B. I Th. p. 245. no. 3. t. 5. f. 10.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, und gleich herabhangenden grauen, braunschattirten, und mit einem schwarzen C bezeichneten Flügeln.

Das *schwarze C.*

110. *Vmbratica*, der *Schattenspinner.*

*Degeer* Inf. II. Part. I. p. 338. no. 2. t. 5. f. 9.

*Phalene* à antennes barbues, à trompe, à corcelet huppé, à ailes rabatues, égales d'un brun obscur noirâtre, avec des points d'un gris clair le long du bord extérieur.

*Phalene Sombre.*

— *Uebers.* II Th. I B. p. 245. no. 2. t. 5. f. 9.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, Rückenkamm, und gleich niederhangenden dunkelbraunschwärzli-

chen Flügeln, längst dem Aussenrande mit hellgrauen Punkten.

Der *Nachtschatten.*

111. *Cinerea*, der *aschfarbige Spinner mit weissen Flecken.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 339. no. 4. t. 5. f. 11.

*Phalene* à antennes barbues, à trompe, à ailes en toit d'un cendré blancheâtre avec des nuances et des rayes noirâtres et deux taches ovales blancheâtres bordées de noir.

*Phalene* cendrée à deux taches blancheâtres.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 246. no. 4. t. 5. f. 11.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und aschgrauweisslichen dachförmigen Flügeln mit schwärzlichen Streifen, Schattirungen, und zween eyrunden weisslichen schwarzgerändelten Flecken.

*Die aschgraue Phaläne mit zween weisslichen Flecken.*

112. *Dimas*, der *ostindische Dimas.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 92. t. 59. Fig. C.

Alis albo-glaucescentibus, nigro-venosis; *anticis* ochreo-marginatis, fasciaque transversa incurvata ferruginea; *posticis* nigro-bimarginatis.

113. *Dryas*, der *westindische Dryas.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 110. t. 70. Fig. C.

Alis *anticis* furvis; lineis longitudinalibus fuscis lituratis; *posticis* fusco-pallidioribus, basi glaucis.

114. *Eridanus*, der *ſurinamiſche Eridanus.*
*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 107. t. 68. Fig. G.
Alis concoloribus niveis, nigro-venoſis; abdomine aurantiaco-annulato.

115. *Ebalus*, der *ſurinamiſche Ebalus.*
*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 79. t. 50. Fig. G.
Antennis, thorace, abdominisque margine ochreaceis; alis concoloribus rubicundis, atro-punctatis.

116. *Helops*, der *ſurinamiſche Helops.*
*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 113. t. 72. Fig. C. *Foemina.*
Alis fuſcis, aurantiaco-maculatis, *poſticis* ferrugineis; abdomine nigro-annulato.

117. *Ilirias*, der *ſurinamiſche Ilirias.*
*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 15. t. 10. Fig. E.
Alis hilare-viridibus, fuſco-marginatis; *anticis* tribus lineis transverſis nigricantibus apice luteis; *poſticis* binis maculis fuſcis marginalibus: ano-flavo-piloſo.
*Müllers* Suppl. und Reg. B. p. 311. no. 193. b. Phal. *Ilirias*, die *grüne Eule.*

118. *Lincus*, der *ſurinamiſche Linkus.*
*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 79. t. 50. Fig. H.
Alis furvis; *anticis* apice, *poſticis* diſco aurantiacis.

119. *Liris*, der *weſtindiſche Liris.*
*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 98. t. 63. Fig. F.
Alis vireſcentibus nigro-venoſis, areis quatuor caneſcentibus.

120. *Meon*, der *ſurinamiſche Meon.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 113. t. 71. Fig. F.

Alis furvis; *anticis* quatuor lineis totidemque maculis albis; *poſticis* baſi albis, linea flaviſſima marginali incurvata.

121. *Metabus*, der *ſurinamiſche Metabus.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 117. t. 74. Fig. D. *Foemina.*

Alis concoloribus brunneis, nigro-venoſis.

122. *Narciſſus*, der *chineſiſche Narziſſus.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 116. t. 73. Fig. E F. *Foemina.*

Alis *anticis* furvis, faſcia longitudinali dilute alba, lineola nigra ſerpentina; *poſticis* baſi luteis, margine glauco-fuſcis.

123. *Noëma*, der *ſurinamiſche Noëma.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 27. t. 18. Fig. E.

Alis *anticis* variegato-hieroglyphicis, *C nigro; poſticis* griſeo-albeſcentibus.

124. *Ophis*, der *konſtantinopolitaniſche Ophis.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 20. t. 13. Fig. C.

*Antennis* flavis; alis *anticis* atris, flavo-hieroglyphicis; *poſticis* ciliatis nigricantibus.

125. *Orſilochus*, der *ſurinamiſche Orſilochus.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 72. t. 46. Fig. D.

Alis niveis, maculis numeroſis rubro-fuſcis.

126. *Pandroſa*, die *ſurinamiſche Pandroſa.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 122. t. 77. Fig. D.

Alis fuſco-teſtaceis; *anticis* faſcia longitudinali alba, nigro-lineata, ſex haemiſphaeriis impoſitis atris, albo-marginatis; *poſticis* lineis transverſis nigris undulatis.

127. *Promula*, die *bataviſche Promula*.

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 114. t. 72. Fig. D. *Foemina.*

Alis concoloribus furvis; *poſticis* margine interiore luteo.

128. *Rhodope*, die *chineſiſche Rhodope*.

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 49. t. 30. Fig. E.

Statura Papil. *Heliconii.*

Alis omnibus *foliaceis; anticis* furvis nigro-venoſis; *poſticis* cyaneo-faſciatis.

129. *Tiberina*, die *chineſiſche Tiberina*.

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 52. t. 32. Fig. C D. *Foemina.*

Alis nigro-luteis, antennisque pulchre *deauratis.*

*Edw.* hiſt. of Birds, t. 226.

130. *Vmber*, der *ſurinamiſche Nachtſchatten*.

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 24. t. 15. Fig. F.

*Fabric.* Mantiſſ. p. 281. 99 - 100. Bomb. *Vmber.*

Alis convolutis atris; fronte abdomineque fulvis.

131. *Aconyta*, der *bengaliſche Akonyta*.

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 51. t. 131. Fig. A. *Foemina.*

Alis concoloribus brunneo-rubeſcentibus; *anticis* faſciis pallidioribus.

132. *Alſas*, der *ſurinamiſche Alſas.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 26. t. 113. Fig. E. *Foemina.*

Alis *anticis* teſtaceis, lineis fuſcis nigrisque undulatis; *poſticis* albidis, flavo-marginatis.

133. *Aſtur*, der *ſurinamiſche Aſtur.* *)

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 35. t. 120. Fig. B.

Alis *anticis* albis variegato-hieroglyphicis; *poſticis* violaceis.

134. *Crocos*, der *ſurinamiſche Krokos.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 44. t. 126. Fig. E.

Alis *anticis* viridi-micantibus, areis fulvo-rubellis, fuſco-punctatis; *poſticis* abdomineque rubicundis.

135. *Encelada*, der *ſurinamiſche Enzelada.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 130. t. 182. Fig. F.

Alis fuſco-maculatis, faſciis lineisque undulatis nigris; *poſticis* baſi glauceſcentibus, apice rubellis.

136. *Hermia*, der *ſurinamiſche Hermia.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 136. t. 185. Fig. F.

Affinis Phal. *Crocos.*

Alis *anticis* viridi-micantibus atro-punctatis, areis fulvis rubro-punctatis; *poſticis* incarnatis, linea marginali obſcure-rubra, incurvata.

137. *Hipparchia*, die *ſurinamiſche Hipparchia.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 135. t. 185. Fig. D. *Foemina.*

Alis

*) Im Texte eine Phal. *Noctua*; im Indice Bombyx, und ſo bey mehreren.

Alis teſtaceis, flavo - maculatis, atroque punctatis.

138. *Hyphinoë*, die *amboiniſche Hyphinoë.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 91. t. 154. Fig. B. *Foemina.*

*Magna.* Alis omnibus purpuraſcentibus; *anticis* flavo - maculatis.

139. *Icaſia*, die *ſurinamiſche Ikaſia.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 130. t. 181. Fig. E.

Alis pallide - teſtaceis; *anticis* ocellis fuſcis albo - pupillatis; *numerisque* 8 ſolitariis et continuis.

140. *Lactinea*, die *bataviſche Laktinea.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 58. t. 133. Fig. D.

Alis concoloribus albicantibus; *anticis* margine anteriore rubro; *poſticis* binis in diſco punctis, lineisque in margine nigris interruptis.

141. *Mineus*, der *bataviſche Mineus.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 52. t. 131. Fig. D.

Alis concoloribus ochreaceis; areis cyaneis *aureo - punctatis;* toto corpore aureo - liturato et annulato. *Splendida.*

142. *Peripheta*, der *weſtindiſche Peripheta.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 54. t. 131. Fig. G.

Alis concoloribus fuſco - teſtaceis, falcato - dentatis, *foliis* albicantibus, fuſco - ſtriatis.

143. *Rivuloſa*, der *ſurinamiſche Bachſpinner.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 15. t. 107. Fig. A. *Mas.*

Alis fuſco-caneſcentibus; tribus *anticarum rivulis* longitudinalibus nigris.

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. t. 14. f. 5. *Foemina.*

144. *Somniculoſa*, der *ſurinamiſche Schläfer.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 6. t. 100. Fig. A B. *Foemina.*

*Magna.* Alis concoloribus fuſco-rubellis, albo-ſtriatis.

145. *Tymber*, der *ſurinamiſche Tymber.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 109. t. 167. Fig. D.

Alis concoloribus furvis; *anticis* pallidioribus.

146. *Verago*, der *ſurinamiſche Verago.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 102. t. 162. Fig. D E. *Mas. Vol. IV.* p. 34. t. 306. Fig. D E. *Foemina.*

Alis fuſco-variegatis; *anticis* binis ocellis albis atro-pupillatis.

147. *Alope*, die *ſurinamiſche Alope.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 168. t. 286. Fig. E F. *Foemina.*

Alis furvo-gagatheis, nigro-lineatis.

148. *Alphea*, die *koromandelſche Alphea.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 99. t. 250. Fig. E.

Alis incarnatis; *anticis* triangulo recto atro-fuſco, transverſe albo-faſciato.

149. *Amaſis*, der *ſurinamiſche Amaſis.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 33. t. 206. Fig. B. *Foemina.*

Alis

Alis *anticis* albicantibus, lineis curvis transversis atris lituratis, macula fere media rubicunda; *posticis* flavis atro-maculatis.

150. *Amilia*, die *surinamische Amilia.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 130. t. 265. Fig. DE. *Mas et Foemina.*

Alis dentatis fusco-cinerascentibus; *anticarum* una *numerus* 18, altera *littera* B.

151. *Bifasciata*, die *surinamische Doppelstreife.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 104. t. 252. Fig. F. *Foemina.*

Alis concoloribus ochreaceis; *anticis* binis fasciis transversis nigris.

152. *Caprotina*, die *virginische Kaprotina.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 170. t. 287. Fig. C. *Foem.*

Alis *anticis* albis, *posticis* luteis, omnibus nigro-maculatis.

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. t. 3. f. 3.

153. *Circe*, die *surinamische Zirze.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 124. t. 263. Fig. D. *Mas.*
— — p. 147. t. 274. Fig. E. *Foem.*

Alis *anticis* viridi-nigricantibus, albo-fasciatis; *posticis* purpurascentibus: *Foemina* alis anticis pallidioribus.

154. *Cocala*, die *surinamische Kokala.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 145. t. 273. Fig. D. *Mas.*

Alis furvis; *anticis* pallidioribus atro-lineatis, binis apice maculis luteis: *antennis pedibusque posterioribus* longissimis.

155. *Do-*

155. *Dominia*, die *koromandelſche Dominia.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 123. t. 263. Fig. A B. *Foemina.*

Alis concoloribus niveis; *anticis* viridi-micantibus nigro-venoſis; *poſticis* binis maculis atris *teſſellatis;* antice longis, poſtice brevioribus faſciis longitudinalibus aterrimis.

156. *Erycata*, die *ſurinamiſche Erykata.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 170. t. 287. Fig. D. *Foemina.*

Alis falcato-dentatis rubeſcentibus, variegatis, lineis transverſis atris; margine nigro-punctato.

157. *Famula*, die *guineiſche Magd.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 61. t. 228. Fig. E. *Mas.*

Alis nigerrimis, baſi albicantibus; *anticis* binis maculis ovatis albis incurvatis.

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. t. 11. f. 3.

158. *Hyrtaca*, die *ſurinamiſche Hyrtaka.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 97. t. 249. Fig. F. *Mas.*

Alis concoloribus teſtaceis; *anticis* apice obſcurioribus; binis *cuneis* perforatis atris.

159. *Javana*, die *ſurinamiſche Javana.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 146. t. 274. Fig. C. *Foemina.*

Alis *anticis* diſco furvo-rubris, antice margineque flaveſcentibus, binis punctis albis; *poſticis* obſcurioribus margine ſulphureis.

160. *Ido-*

160. *Idonia*, die *neuyorkische Idonia.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 150. t. 275. Fig. H. *Mas.*

Alis fuscis, atro-flavoque variegatis; *posticis* disco albo.

161. *Lanata*, der *surinamische Wollspinner.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 130. t. 265. Fig. F. *Mas;* Fig. G. *Foemina.*

Alis concoloribus incarnatis, nigro-venosis. *Merian.* Surin. t. 19.

162. *Membliaria*, die *ostindische Membliaria.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 139. t. 269. Fig. CD. *Foemina.*

Alis pallide-testaceis, margine albo-lineato.

163. *Micilia*, die *surinamische Mizilia.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 62. t. 228. Fig. G.

Alis *anticis* nigerrimis, albo-glaucoque fasciatis; *posticis* coeruleis albo-fasciatis.

164. *Mummia*, die *surinamische Mummia.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 61. t. 228. Fig. C. *Mas.*

Alis concoloribus furvis, margine atro-punctatis; *posticis* basi albis.

165. *Nausica*, die *surinamische Nausika.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 97. t. 249. Fig. DE. *Mas.*

Alis *anticis* testaceis, fasciis pallidioribus; *posticis* canescentibus, atris figuris: fasciis, clavis, cuneisque notatis.

166. *Regina*, die *ſurinamiſche Königinn.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 142. t. 272. Fig. A. *Mas.*

Alis *niveo-argenteis*, ciliatis.

167. *Sanguinolenta*, der *ſurinamiſche Blutſpinner.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 102. t. 252. Fig. A. *Mas.*

Alis concoloribus *ſanguinolentis; anticis* binis maculis albis.

168. *Tomyris*, der *ſurinamiſche Tomyris.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 123. t. 262. Fig. F G.

Alis concoloribus furvis, punctis numeroſis albis, cyaneisque in areis nigris.

169. *Venus*, die *kapenſiſche Venus.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 167. t. 286. Fig. CD.

*Splendidiſſima.*

Alis *anticis* ochreaceis maculis oblongis ovatisque *argentatis*, nigro-marginatis; *poſticis* rubicundis, baſi pallidioribus.

170. *Vitrea*, der *ſurinamiſche Glasſpinner.*

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 151. t. 276. Fig. C.

Alis concoloribus albeſcentibus, medio-fulvis, atro-ſtriatis, corpore toto ochreaceo.

171. *Equina*, der *isländiſche Pferdeſpinner.*

*Olaffens* Reiſe durch Island I. p. 320. III. *Lepid.* no. a.

*Phalaena* (*maxima*) colore obſcure-ſericeo palleſcente; toto corpore plumoſo, ore *ſpirilingui.*

*Hroſse Fidrildr; ſetzt ſich auf die Pferde.*

172. *Mo-*

172. *Molina*, die *ſurinamiſche Molina.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 25. t. 302. Fig. EF.

Alis concoloribus ferrugineis; *anticis* luteo-ſtriatis; *poſticis* baſi rubeſcentibus, macula media nigricante.

173. *Neſea*, die *ſurinamiſche Neſea.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 31. t. 305. Fig. C.

Alis *anticis* purpuraſcentibus, *littera P* inſignitis; *poſticis* pallide luteis; *pedes anteriores* porrecti, antice rubri.

174. *Bellatrix*, die *ſurinamiſche Bellatrix.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 32. t. 305. Fig. F.

Alis ſubfalcatis, omnibus ciliatis; *anticis* olivaceo-flavo-nigricantibus; in medio congeries punctorum alborum; baſi quinis punctis luteis; *poſticis* baſi admodum piloſis.

175. *Amynta*, die *ſurinamiſche Amynta.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 100. t. 251. Fig. E. *Foem.*
— — IV. p. 33. t. 306. Fig. C. *Mas.*

Alis *anticis* baſi flavis, faſcia transverſa rubra, poſtice incarnatis, margine aurantiaco; atro-maculatis: *tectiformibus.*

176. *Agreſta*, die *ſurinamiſche Agreſta.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 32. t. 306. Fig. A.

Alis cinnamomeis albo-maculatis.

177. *Nuda*, der *ſurinamiſche Kahlflügel.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 33. t. 306. Fig. B.

Alis nudis cineraſcentibus flavo-nigroque ſtriatis.

178. *Do-*

178. *Dolabrata*, die *ſurinamiſche Dolabrata.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 34. t. 306. Fig. F.
Alis concoloribus luteis, *anticis* fuſco - lituratis.

179. *Ornata*, die *ſurinamiſche Schöne.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 34. t. 306. Fig. G.
Alis *anticis* albidis, binis lineis undulatis fuſcis, una interrupta; *poſticis* luteſcentibus.

180. *Netrix*, die *ſurinamiſche Netrix.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 35. t. 307. Fig. B.
Alis albidis, faſciis transverſis flavis.

181. *Flavata*, *der javaniſche Gelbling.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. C.
Alis omnibus flavis, *anticis* baſi atro - lituratis; *poſticis* pallidioribus.

182. *Pilumnia*, die — *Pilumnia.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. D.
Alis flaveſcentibus; *anticis* punctis nigris obſoletis, lineisque nigris nigro - punctatis.

183. *Altrix*, die *ſurinamiſche Altrix.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. E.
Alis *anticis* fuſceſcentibus, nigro - lineatis.

184. *Punctata*, der *ſurinamiſche Schwarzpunkt.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 37. t. 307. Fig. F.
Alis *anticis* olivaceis, nigro - punctatis; *poſticis* purpuraſcentibus, diſco flavo.

185. *Fuſca*, der *ſurinamiſche Bräunling.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 37. t. 307. Fig. G.

Alis *anticis* fuſcis, punctis tribus flavis; *poſticis* incarnatis, baſi aurantiacis.

186. *Simois*, die *ſurinamiſche Simois.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 39. t. 308. Fig. F.

Alis fuſcis, nigro-venoſis; *anticis* triangulo furvo; omnibus margine flavo, ciliato.

187. *Tharis*, die *ſurinamiſche Tharis.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 38. t. 308. Fig. D.

Alis *anticis* furvis, variegatis, nigroque punctatis; *poſticis* concoloribus fuſcis.

188. *Eueria*, der *Wollträger.*

*Knochs* Beyträge zur Inſektengeſchichte I St. p. 26. t. 2. f. 3. *Larva.* f. 6. Mas. f. 7. Foem.

Ph. B. elinguis; alis reverſis pallide corticinis; ſuperioribus baſi ſtrigaque poſtica flavis puncto albo.

(Eine *Ringelraupe;* auch in *den Eyern Ichneumons.*)

189. *Vidua*, die *junge Witwe.*

*Knochs* Beytr. zur Inſektengeſch. I St. p. 48. no. 9. t. 3. f. 3.

Elinguis, alis albo-cineraſcentibus nigro-variis, faſcia ſublutea inaequali.

## III. NACHTEULEN: *Noctuae.*

### 1. *Ohne ſichtbaren Saugrüſſel* (Elingues).

82. *Strix*, die *ſüdamerikaniſche Eule.* *)

*Müllers* L. N. S. 5 B. 1 Th. p. 679. no. 82. die *Trauereule.*

*Fabric.* S. E. p. 591. no. 2. NOCTUA *Strix.* Nom. *Linn.*

*Sebae* Theſ. IV. t. 39. f. 12. 14.

— — t. 57. f. 7. 9.

*Cramer* Pap. exot. II. p. 77. t. 145. Fig. A. Ph. *Strix* — *d'Amboine.* **)

83. *Aeſculi*, das *Blauſieb.*

*Müller* l. c. p. 679. no. 83. der *Blauſieb.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 290. no. 36.

Phal. *pirina*, der *Lindenbohrer.* Weiſs, mit vielen ſtahlblauen Flecken.

*Naturforſcher* IX. p. 114. no. 36. Ph. *Pirina.* (von *Rottemb.*)

— — XII. p. 73. no. 4. Ph. N. *Aeſculi.* t. 2. f. 7. *Weibchen* (*Capieux*).

*Beſchäf-*

*) Die vom Linn. hierbey zitirte *Merian.* Sur. t. 20. gehört nicht hieher, ſondern zu *Cramers Agrippina:* Pap. exot. I. p. 136. t. 87. A. t. 88. A.

*Linné* ſagt mit Recht von ihr: *Maxima* omnium notarum Noctuarum.

**) Nach Cramer müſste ſie eigentlich zu den *Bombycibus* gerechnet werden.

Der Körper und Hinterleib *ſpitzſpindelförmig*, wie bey den *Schwärmern.*

*Beſchäftig.* der Berl. Geſellſch. naturf. Fr. III. p. 30. §. 1. Phal. *Aeſculi*, das *Blauſieb.* t. I. f. 1. *Männchen;* f. 2. *Weibchen.* *)

Die *Puppe* im veſteſten *Büchenholz.* (D. *Kühn.*)

*Fiſchers* N. G. v. Livl. p. 152. no. 360. Ph. *Aeſculi*, das *Blauſieb.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 688.

Ph. Aeſculi, die *Punkteule.*

Bey *Genf.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 391. no. 10. Phal. *pirina*, der *Lindenbohrer.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 1. no. 2.

Ph. *Aeſculi*, das *Blauſieb.*

*Röſels* Inſektenbel. III. p. 276. t. 48. f. 5. 6.

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige ſchöne hochgelbe *Holzraupe* in den Apfelbäumen. **)

*Wiener Schmetterl.* p. 59. N. *Holzraupen, bleichringichte Spinner* ***).

No. 3. *Pferdekaſtanienſpinnerraupe* (Aeſculi Hippocaſtani); *Pferdekaſtanienſpinner.* Ph. *Aeſculi.* (Noctua Linn.)

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 306. no. 1150. Phal. N. *Pyrina.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 165. no. 83. Ph. *Aeſculi.* Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 31. f. 8. 9.

*Fabric.* S. E. p. 590. no. 5. HEPIALUS *Aeſculi.*



*) Von der *Capieuxſchen* in der Gröſse, Fühlhörnern, und ganzem Bau ſehr verſchieden. Die erſtere hat zwo ganz kurze haarförmige Fühlſpitzen.

**) Die Raupe wird gröſser, als ſie *Röſel* abgebildet hat.

***) Mit Rechte unter die *Bombyces* geſetzt.

Niveus, alis punctis numerosis coeruleo-nigris; thorace senis.

*Larva* flava, nigro punctata, capite caudaque nigris.

84. *Humuli*, die *Hopfeneule.*

*Müller* l. c. p. 679. no. 84. die *Hopfeneule.*

*Füeßl.* schweizer. Ins. p. 36. no. 689. Phal. *Humuli*, *Hopfeneule.*

Bey uns etwas selten.

*Wien. Schmetterl.* p. 61. O. *Wurzelraupen*; *schmalflüglichte Spinner.*

No. 1. *Hopfenspinnerraupe* (Humuli Lupuli); *Hopfenspinner.* Ph. *Humuli.*

*Sulzers* Gesch. p. 160. t. 22. f. 1. die *Hopfeneule*; Ph. *Humuli.*

Kothgelb; die Vorderflügel mit hellbraunen Wolken; unten braun behaart, die Hinterflügel halb federlos, schwärzlich. Kurze Fühlhörner. Bey dem *Männchen* alle Flügel oben weiss, perlenfarb, ohne Flecken, unten gelblichbraun.

*Neuer Schaupl.* der Nat. IV. p. 104. Phal. nocturna *Humuli.*

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 11. Phal. *Humuli*, *Hopfeneule.*

*Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 371. no. 12. Ph. *Humuli.*

*Raj.* Hist. Ins. p. 157. no. 3.

*Phalaena* media, alis longis, in *foemina* flavis, cum lineis rubentibus, in mare albis.

*Bekm.* Epit. S. L. p. 165. no. 84.

Ph. *Humuli.* Nom. *Linn.*

*Onomat.* hist. natur. P. 6. p. 377.

Ph. *Humuli*, der *Hopfenvogel.*

*Cathol.* H. p. 308. Ph. *Humuli.*

*Fa-*

*Fabric.* S. E. p. 589. no. 1. HEPIALUS *Humuli.*
Alis flavis, fulvo-ſtriatis; *maris* niveis.
Habitat in Lupuli radicibus, *Eryſiphen* cauſſans.
*Ova* innumera, minima, nigra.
*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1380. Ph. N. *Humuli.* Nom. *Linn.*
*Degeer* Inſ. Tom. I. Mém. 15. p. 487. t. 7. f. 1-6.
*Chenille* raſe, blanche, à tête d'un brun jaunâtre, qui ronge et mange les racines du *Houblon.*
— — p. 698. t. 7. f. 5. 6.
*Phalene* à antennes très-courtes, dont le *mâle* eſt blanc, et la femelle d'un jaune d'ocre.
— Tom. II. Part. I. p. 365. no. 1.
*Phalene* à antennes filiformes très-courtes, ſans trompe, dont le *mâle* eſt blanc, et la *femelle* d'un jaune d'ocre.
*Phalene du Houblon.*
— *Ueberſ.* I. 3 Qu. 15te Abh. p. 66. t. 7. f. 1-6.
Die glatte und weiſse *Raupe*, mit gelblichbraunem Kopfe an den *Hopfenwurzeln.*
— — 4 Quart. p. 121. t. 7. f. 5. 6.
Ein *Nachtvogel* mit ſehr kurzen Fühlhörnern; das *Männchen* weiſs; das *Weibchen* okergelb.
— II Th. I B. p. 266. no. 1.
Eine *Phaläne* mit fadenförmigen überaus kurzen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel; das *Männchen* weiſs, das *Weibchen okergelb.*
Die *Hopfeneule.*

85. *Hecta*, das *Punctband.*

*Müller* l. c. p. 679. no. 85. das *Punktband.*
*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 690.

Phal. *Hecta*, das *Punktband.*

Bey *Genf.*

*Wien. Schmetterl.* p. 61. O. No. 4. *Unbekannte Raupe.*

Oraniengelber ſilberglänzend—das *Weibchen*, grauer düſtergeſtreifter Spinner. Ph. *Hecta* *).

*Cathol.* H. p. 94. Phal. *Hecta.*

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 589. no. 2. HEPIALUS *Hectus.* Nom. *Linn.*

Veſpere in aëre fluctitat motu pendulo, at ſolitarius.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1381. Ph. *Hecta.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. Tom. I. Mém. 15. p. 495. t. 7. f. 12.

*Papillon nocturne* à antennes très-courtes, dont les ailes ſupérieures ſont d'un jaune couleur d'ocre, tirant ſur le roux, à taches d'un blanc argenté. (Mâle.)

— — p. 698. t. 7. f. 12.

*Phalene* à antennes très-courtes, d'un jaune rouſſâtre, à taches blanches et argentées.

— Tom. II. Part. I. p. 366. no. 2.

*Phalene* à antennes filiformes très-courtes, ſans trompe, d'un jaune rouſſâtre, avec des taches blanches argentées ſur les ailes ſupérieures.

*Phalene à pattes en maſſe.*

— Tom. VII. p. 596. no. 4. t. 44. f. 14. *Foemina*, ſ. Ph. *Vitis Idaeae* L. no. 88.

*Phalene* ſans trompe; à antennes filiformes très-courtes, à ailes d'un jaune rouſſâtre avec des taches blanches dans le *mâle*, et brunes à rayes fauves dans la *femelle.*

*Pha-*

*) Dieſe Hecta, ſagen die Wiener: ſey das *Männchen* von Ph. *Vitis Idaeae* Linn. no. 88; dieſe *letztere* alſo das *Weibchen.*

*Phalene à pattes en masse.*

Phalaena (*Clavipes*) elinguis; antennis filiformibus brevissimis, alis *mari* rufo-fulvis, maculis niveis; *foeminae* fuscis, fasciis fulvis.

*Degeer Uebers.* I B. 3 Qu. p. 71. t. 7. f. 12.

Ein *Nachtsalter* mit sehr kurzen Fühlhörnern, und okergelben, etwas fuchsröthlichen, silberweissgefleckten Oberflügeln (*Männchen*).

— — 4 Quart. p. 121. t. 7. f. 12.

Ein gelbröthlicher *Nachtvogel*, mit kurzen Fühlhörnern und silberweissen Flecken.

— — II Th. I. B. p. 266. no. 2.

Eine gelb-braunröthliche *Phaläne* mit weissen Silberflecken auf den Oberflügeln, und sehr kurzen fadenförmigen Fühlhörnern ohne Saugrüssel.

Die *keulfüssige Phaläne.*

86. *Lupulina*, die *bogenflüglichte Eule.*

*Müller* l. c. p. 680. no. 86. der *Bogenflügel.*

*Wiener Schmetterl.* p. 61. O. No. 5. *Unbekannte Raupe.*

Okergelber, düster- und silberweiss; das *Weibchen* aschgrauer dunkelgestrichter *Spinner.* Ph. *Lupulina.*

*Fabric.* Syst. Ent. p. 589. no. 2. HEPIALUS *lupulinus.*

Alis cinereis; striga albidiore.

87. *Sylvina*, die *Waldeule.* *).

*Müller* l. c. p. 680. no. 87. die *Waldeule.*

*Füessl.* Magaz. der Entom. II. p. 11. Phal. *Sylvina.* (Chorh. *Meyer.*)



*) *Nicht abgebildet.*

Die buntgestreifte *Raupe* mit gelbbraunen Knöpfgen — Nahrung *Eichenlaub.*

— Die Verwandlungshülse, die Grösse abgerechnet, gleicht der von der Raupe der Ph. *Quercus*, worinn die Raupe 10 Tage unverwandelt liegt. Der Schmetterling bleibt 5 Wochen in der Puppe.

88. *Vitis Idaeae*, der *Stumpfsauger*: das *Weibchen* von Ph. *Hecta* no. 85.

*Müller* l. c. p. 680. no. 88. der *Stumpfsauger*.
*Degeer* Inf. Tom. VII. p. 596. t. 44. f. 14.

2. EULEN *mit sichtbarem Saugrüssel und glattem Rücken, ohne Kamm* (Spirilingues, dorso laeves absque crista).

89. *Lectrix*, die *chinesische Scheckeule.*

*Müller* l. c. p. 680. no. 89. die *Scheckeule*.
*Fabric.* Syst. Ent. p. 584. no. 95. BOMBYX *Lectrix*. Nom. *Linn.*
*Cramer* Pap. exot. II. p. 145. t. 192. Fig. C. Phal. *Lectrix* — de la *Chine* (*Foemina*).
*Houttuin* Hist. Nat. I Part. Tom. XI. p. 598. t. 92. f. 5.

90. *Dominula*, das *Frauchen.*

*Müller* l. c. p. 681. no. 90. die *Jungfer*.
*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 36. no. 692. Ph. *Dominula*, die *Jungfer*.
Bey uns *selten.*
*Berlin. Magaz.* III. p. 204. no. 2. Phal. *Dominula*, der *Specht.*

Die

Die *Oberflügel* schwarzblaulichgrau mit weissen und gelben Flecken; die *Unterflügel* roth mit schwarzen Flecken.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 10. no. 3. p. 20. no. 36. Phal. *Dominula*, die *Jungfer*, der *Specht.*

*Rösels* Insektenbel. III. p. 267. t. 47. die auf den Wollweiden und Eschen sich aufhaltende, mit dreyfacher gelber Bordirung ausgezierte schwarze *Raupe.*

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 342. Ph. N. *Dominula*, das *Frauchen;* der *Specht.*

Das schwarze glatte *Nachteulchen* mit blau-, gelb und weissgefleckten Oberflügeln, und rothfleckigen Unterflügeln.

— — II. p. 744. no. 36. Ph. N. *Dominula*, der *Specht.*

*Wien. Schmetterl.* p. 53. E. No. 8. *Hundszungenspinnerraupe* (Cynoglossi oleraceae); *Hundszungenspinner;* Ph. *Dominula.*

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 355. Ph. *Dominula.*

*Bekm.* Ep. S. L. p. 165. no. 90. Ph. *Dominula.* Nom. *Linn.*

*Scop.* Ent. carn. p. 204. no. 506. Ph. *Dominula.*

*Long.* lin. 11 - vnc. 1. *Lat.* lin. 6-7.

Alae ut supra, ita subtus coloratae; *anticae* nigrae cum translucente virore; maculis 10, plerisque albis; *posticae* scarlatinae, binis maculis apiceque nigris.

*Larva* nigra, verrucis haemisphaericis nitidis pilosis aspera; pilis canescentibus, dorso lateribusque albo-flavoque punctatis.

*Pupa* lucida, fusca. *)



*) Des *Scop.* Phal. *Idriensis*: Ann. 5. hist. nat. p. 113. no. 121. von dieser *Dominula* verschieden.

*Poda* Muſ. graec. p. 89.
*Schaeff.* Icon. t. 77. f. 3. 4.
*Fabric.* Syſt. Ent. p. 583. no. 93. BOMB. *Dominula.* Nom. *Linn.*

*Larva* piloſa, atra; lineis tribus flavis, atromaculatis.

*Pupa* brunnea intra folliculum communem.

91. *Hera*, der *ruſſiſche Bär.* *)

*Müller* l. c. p. 681. no. 91. die *ſpaniſche Fahne.* **)
*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 693. die *Hausfrau.*
Bey *Zürch* ſelten, bey *Genf* gemeiner.
*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 27. no. 62. Phal. *Hera*, der *ruſſiſche Bär*; die *ſpaniſche Fahne.*
*Röſels* Inſektenbel. IV. p. 194. t. 28. f. 3.
Ein zur 2 Kl. gehöriger vortrefflicher *Papilion*, mit hochrothen ſchwarzgefleckten *Unterflügeln*; die *Oberflügel* braun geſchillert mit weiſslichgelben Queerſtreifen; der Hinterleib oraniengelb. (*Weibchen.*)
*Kleemanns* Beytr. I. p. 345. t. 41. f. 1. *Raupe*; f. 2. *Geſpinnſte*; Fig. 3. *Puppe*; F. 4. 5. *Schmetterling.*
Die ſchwarzköpfige, hellgelbbordirte, und mit einem oraniengelben Rückenſtreif, nebſt dergleichen ſteifhaarigen Knöpfen gezierte *Raupe.*
*Wien. Schmetterl.* p. 52. E. *Edle Spinner.*
No. 3. *Beinwellſpinnerraupe* (Symphiti tuberoſi); *Beinwellſpinner.* Ph. *Hera.*

*Hot-*

*) *Hera*, *Matronula*, *Dominula* und *Fuliginoſa* ſetzen die *Wiener Entomol.* p. 52. unter die *Spinner*, weil ihre Raupen dahin gehören. Es ſind ſolche *Winterſchläfer* und *Vielfräße* (Polyphagae.)

**) Unmöglich Ph. *Plantaginis* L. no. 42. wie der V. meynt.

*Hotlaar* Inf. t. 8. f. 3. (*Naturf*. IX. p. 223.) Phal. *Hera*.

*Cathol*. H. p. 122. Ph. *Hera*.

*Bekm*. Epit. S. L. p. 165. no. 91. Nom. *Linn*.

*Schaeff*. Icon. t. 29. f. 1. 2.

*Scop*. Entom. carn. p. 203. no. 505. Phal. *Plantaginis*.

*Long*. Vnc. 1. lin. $\frac{1}{2}$. *Lat*. $6\frac{3}{4}$.

Alae *anticae* fuscae cum obscuro quodam translucente virore; margine inferiore litura, fasciaque bifida, Y referente, cerei coloris; *posticae* scarlatinae, supra maculis 4, subtus unica, nigris.

*Poda* Muf. graec. *Quadripunctaria*.

*Fabric*. Syst. Ent. p. 583. no. 92. BOMBYX *Hera*.

Alis incumbentibus, virescenti-nigris; rivulis flavis; *posticis* rubicundis, maculis tribus nigris.

*Geoffr*. Inf. II. p. 145. no. 74.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis deflexis; superioribus atris rivulis flavis; inferioribus rubris maculis nigris.

La *Phalene chinée*.

*Long*. 11 lign.

92. ***Matronula***, der *augsburger Bär*.

*Müller* l. c. p. 681. no. 92. die *Dame*.

*Füeßlins* schweiz. Inf. p. 37. no. 694. die *Matrone* — etwas selten.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 118. no. 334. Phal. *Matronula*, die *Dame*; der *augsburger Bär*.

*Röfels* Insektenbel. III. p. 235. t. 39. f. 1. 2.

— — IV. t. 4. f. 4. die *braunhaarige Bärenraupe*.

*Wien*.

*Wien. Schmetterl.* p. 53. E. No. 5. *Beyfußspinnerraupe* (Artemisiae vulgaris). *Beyfußspinner.*
*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 12. *Beyfußeule.*
*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 383. Ph. *Matronula.*
*Fabric.* S. E. p. 584. no. 97. BOMBYX *Matronula.*
Alis *anticis* fuscis; exterius flavo-maculatis; *posticis* flavis, nigro-maculatis.

93. *Ancilla*, die *Magd.* *)

*Müller* l. c. p. 682. no. 93. die *Kammerjungfer.*
*Wien. Schmetterl.* p. 69. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fusiformes; schabenartige Eulen;* Ph. Noctuae *Tineiformes.*
No. 14. *Wändeflechteneulenraupe* (Lichenis parietini); *Wändeflechteneule*, Ph. *Ancilla.*
*Catholicon* A. p. 326. Ph. *Ancilla.*

94. *Parthenias*, das *Jungfernkind.* **)

*Müller* l. c. p. 682. no. 94. das *Jungfernkind.*
*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 37. no. 695. Ph. *Parthenias.*
Bey uns *sehr selten.*
*Wien. Schmetterl.* p. 91. X. *Franzenraupen, Larvae cilitatae; geschmückte Eulen,* Phal. Noct. *Festivae.*
3) mit gelben Unterflügeln, fast ungezähnt.
No. 9. *Hangelbirkeneulenraupe* (Betulae albae); *Hangelbirkeneule.* Ph. N. *Parthenias.*

95. *Fuliginosa*, der *Rußflügel.*

*Müller* l. c. p. 682. no. 95. der *Rußflügel.*
*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 37. no. 696. Ph. *Fuliginosa*, der *Zartflügel.*

*Berl.*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 206. no. 4. Ph. *Fuliginosa*, die *Frühlingsmotte.*

Die *Oberflügel* koffeebraun; die *Unterflügel* roth mit einigen schwarzen Flecken.

*Maders* (Kleem.) Raupenkalender, p. 116. no. 326. Ph. *Fuliginosa*, der *Rußflügel.*

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 244. t. 43. Eine steifhaarige braune *Raupe.*

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 747. no. 50. Phal. GEOMETRA *Fuliginosa.* Die *Frühlingsmotte.* *)

*Wien. Schmetterl.* p. 54. E. No. 11. *Ampferspinnerraupe* (Rumicis acuti); *Ampferspinner;* Phal. BOMB. *Fuliginosa.*

*Onomat.* hist nat. P. 6. p. 369. Ph. *Fuliginosa.*

*Raj.* Hist. Ins. p. 228. no. 13.

*Phalaena* minor, alis obscure-rufis seu pullis duabus maculis nigris notatis.

*Scop.* Entom. carn. p. 206. no. 508.

*Long.* Lin. $7\frac{1}{2}$. *Lat.* $3\frac{3}{4}$.

Alae *anticae* obsure murinae, punctis 2 fuscis, mediis, approximatis; *posticae* cinnaberinae, punctis binis, mediis, maculisque marginalibus nigris.

*Fabric.* S. E. p. 588. no. 111. BOMB. *Fuliginosa.*

Alis incumbentibus, rubro-fuliginosis, puncto gemino nigro; abdomine sanguineo, dorso nigro.

*Larva* pilosa, ferruginea, capite pedibusque anticis atris.

*Pupa* folliculata, atra, postice flavo-fasciata.

*Fa-*

*) So wird sie hier als ein *Spannmesser* angesehen, weil man vermuthlich die *haarrichte Raupe* nicht gesehen oder gekannt hat.

*Fabric.* Reise durch Norw. p. 334.

Noctua *Fuliginosa.* *)

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 43. no. 381. Phal. N. *Fuliginosa.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1382. Ph. N. *Fuliginosa.* Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 37. f. 7. 8.

96. *Fulvia*, die *indianische löwenfarbige Eule.*

*Müller* l. c. p. 682. no. 96. die *Löwenhaut.*

*Fabric.* S. E. p. 597. no. 29. NOCTUA *Fulvia.* Nom. *Linn.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 101. t. 251. Fig. F. Ph. N. *Fulvia* (Mas) — à *Suriname.*

*Sebae* Thes. IV. t. 31. f. 11. 12. t. 43. f. 27. 28.

97. *Batis*, das *Braunauge.*

*Müller*, l. c. p. 682. no. 97. das *Braunauge.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 37. no. 697. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 204. no. 3. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte.*

Die *Oberflügel* braun mit fünf weissen ins Fleischfarbige vertriebenen Flecken.

*Wie-*

*) Nach Propst *Ströms* Erfahrungen kömmt die Larve derselben in manchen Jahren häufig des Winters auf dem *Schnee* zum Vorschein, und alsdann folgten kalte nasse Jahre, und ein hieraus entstehender Miswachs.

Das erste geschiehet auch in unsern Gegenden, dass die Larve im Winter, wenn warme Sonnenblicke kommen, als ein *Winterschläfer*, erscheint, und wenn wieder Kälte erfolgt, auch wieder beykriecht.

*Wien. Schmetterl.* p. 71. F. *Rinderaupen*, Larvae *Corticinae.* *Fleckige Eulen;* Phal. N. *maculatae.*

3) Die *Raupen mit einer stumpfen Erhöhung.*

No. 7. *Brombeereulenraupe* (Rubi fruticosi); *Brombeereule;* Ph. N. *Batis.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 118. no 335. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte*, das *Braunauge.*

*Rösels* Insektenbel. IV. p. 181. t. 26. f. A B C.

Die zur 2 Kl. der N. V. gehörige hökrichte, braune *Raupe* mit dem getheilten Kopfe, und einem paar in die Höhe stehender Zapfen.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 836. no. 1. Ph. *Batis*, der *Brombeervogel.*

— — p. 1019. no. 4. Ph. *Batis*, die *glatte Brombeermotte mit braunen weißpunktirten Oberflügeln, und weissen Unterflügeln.*

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 320. Ph. *Batis*, der *Hindbeervogel.*

*Fabric.* S. E. p. 597. no. 28. NOCTUA *Batis.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, ferruginea, antice posticeque gibba.

*Pupa* postice attenuata, fusca.

98. *Algira*, die *algirische Eule.* *)

*Müller* l. c. p. 683. no. 98. der *Graurand.*

99. *Trapezina*, der *Tischfleck.*

*Müller* l. c. p. 683. no. 99. der *Tischfleck.*

*Füeßl.* Magaz. der Entomol. II. p. 12. Phal. *Trapezina* —

Ihre Larven fressen gern andere Larven oder *Raupen.* (Chorh. *Meyer.*)

*Ber-*

*) *Nicht abgebildet.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 296. no. 44. Ph. *Rhombica*, das *verſchobene Viereck.*

Röthlichgrau, mit einem groſsen verſchobenen *Viereck*, in deſſen Mitte ein ſchwarzer Punkt.

*Naturforſcher* IX. p. 118. no. 44. Phal. *Rhombica* (von *Rottemb.*).

*Wien. Schmetterl.* p. 88. T. *Mordraupen*, Larvae *Larvicidae*; *gewäſſerte Eulen*; Phal. Noct. *Vndatae.*

No. 13. *Ahorneulenraupe* (Aceris campeſtris); *Ahorneule*, N. *Trapezina.*

*Fabric.* S. E. p. 600. no. 41. *Noctua Trapezina.* Nom. *Linn.*

100. *Ocularis*, das *italiäniſche Weiſsauge.* *)

*Müller* l. c. p. 683. no. 100. das *Weiſsauge.*

*Füeſsl.* ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 698. Phal. *ocularis*, das *Weiſsauge.*

Die *Raupe* auf den Pappelbäumen; nicht *häufig.*

101. *Sanguinolenta*, der *Blutkörper.* **)

*Müller* l. c. p. 683. no. 100. der *Blutkörper.*

102. *Lucernea*, der *Lichtflieger.*

*Müller* l. c. p. 683. no. 101. der *Lichtflieger.*

*Wien. Schmetterl.* p. 71. ***) Ph. N. *Lucernaria.*

*Fiſchers*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) Zu den *Wellenſtrichraupen*, Larvae *Vnda-toſtriatae*, *glänzende Eulen*; Ph. N. *familiares.* Die V. aber ſind noch ungewiſs, ob ſie die rechte haben, da die ihrige nur *zwo* oder *fünf* düſtere Linien hat.

*Fischers* N. G. von Livl. p. 153. no. 361. Ph. *Lucernea*, der *Lichtflieger*.

Den *Bienenstöcken* sehr nachtheilig.

*Fabric.* (Othon.) Faun. Grönland. p. 194. no. 145. Ph. *Lucernea*. Nom. *Linn. Grönl.* Lios - Fluga. Habitat in *domibus*, minus frequens.

103. *Narbonea*, die *portugiesische Doppelstreife.* *)

*Müller* l. c. p. 684. no. 103. der *Portugiese*.

*Fabric.* S. E. p. 595. no. 31. NOCTUA *Narbonea*. Nom. *Linn.*

*Strigae duae* lineares in medio alae. Ante marginem posticum punctum fuscum, annulo dimidiato luteo cinctum.

104. *Pellex*, der *Queerfleck*.

*Müller* l. c. p. 684. no. 104. der *Queerfleck*.

*Cramer* Pap. exot. I. p. 23. t. 15. **) Fig. E. Phal. *Arne* — à *Suriname*.

105. *Glyphica*, der *Bilderflügel*.

*Müller* l. c. p. 684. no. 105. der *Bilderflügel*.

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 37. no. 699. Ph. *glyphica*.

In den *Wiesen* nicht selten.

*Berlin. Magaz.* III. p. 206. no. 5. Ph. *glyphica*, die *Schnellmotte*.

Hellbraun mit dunkelbraunen Flecken; die Unterflügel oraniengelb mit braunen Adern, und zwo braunen Queerstreifen.

*Klee*

*) *Nicht abgebildet.*

**) Wenig verschieden. Bey den *Linnéischen* haben die Unterflügel in der Mitte einen weissen Anstrich; diese aber an den Aussenwinkeln derselben einen weissen Fleck.

*Kleemanns* Beytr. I. p. 206. t. 25.

Die bräunlichgelbe, braungeſtreifte, mit 14 Füſsen beſetzte glatte *Spannenraupe.* *)

— Raupenkal. p. 25. no. 56. Ph. *glyphica*, der *Bilderflügel.*

— — p. 92. no. 265.

*Wien. Schmetterl.* p. 94. A. a. *Schlangenraupen*, Larvae *Serpentinae; ſpannerförmige Eulen*, Ph. N. *Geometriformes.*

2) mit braungelben, düſterneblichten Unterflügeln.

No. 5. *Wieſenkleeeulenraupe* (Trifolii pratenſis); *Wieſenkleeeule*, Ph. N. *glyphica.*

*Schaeff.* Icon. t. 163. f. 4. 5.

*Syſtem. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 152. no. 38. *Phalene*, qu'on trouve dans les *paturages.*

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus, ſupra fuſcis, pone ſubtusque flaveſcentibus.

*Fabric.* S. E. p. 598. no. 31. NOCTUA *glyphica.*

Alis deflexis, cinereo-fuſcoque variegatis, ſubtus luteis, fuſco-faſciatis.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 136. no. 55.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus, ſupra fuſcis, pone ſubtusque flaveſcentibus.

La *doublure jaune.* *Long.* 6. lign.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1385. Ph. *Glyphica.* Nom. *Linn.*

*Degeer*

*) Die ganze Beſchreibung, inſonderheit die okergelben Unterflügel, kommen mit der Linnéiſchen überein. Die Raupen der Klaſſe, wozu dieſe Eulen gehören, ſind auch, wie die Wiener ſagen, *Schlangenraupen*, und die Eulen *Spannerförmige*, Geometriformes. *Füeßlin* hat den Kleemann ſelbſt bey dieſer Glyphica zitirt, und *letzterer* hat ſich ſelbſt im Raupenkal. p. 25. no. 56. dabey angeführt.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 286. *)
*Réaumur* Inſ. II. Mém. 14. p. 603. ed. 4.

106. *Mi*, das *ſchwarze M.* **)

*Müller* l. c. p. 684. no. 106. *das M.*
*Füeßl.* ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 700. Phal. *Mi*, *das M.*
Bey uns nicht ſelten in den *Wieſen.*
*Berlin. Magaz.* II. p. 412. no. 27. Phal. *Graminis*, der *Grasvogel.*
Braun, mit hellen weiſslich gelben Flecken.
*Naturforſcher* VIII. p. 105. no. 27. Ph. *Graminis.* (von *Rottemb.*)
*Wien. Schmetterl.* p. 94. A a. No. 4. *Sichelkleeeulenraupe* (Medicaginis falcatae); *Sichelkleeeule*, Ph. N. *Mi.*

107. *Pallens*, der *Bleicher.*

*Müller* l. c. p. 684. no. 107. der *Bleicher.*
*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 701. Ph. *pallens.* Bey uns *ſelten.*
*Maders* (Kleem.) Raupenkalend. p. 91. no. 261. die glatte, hellblaſſe, ſchlechtbräunliche — *Raupe.*
*Röſels* Inſektenbel. III. p. 431. t. 71. f. e. 11. f. e. 12.
Die auf dem Sauerampfer lebende glatte und fleiſchfarbige *Raupe*, mit grünen und ſchwarzen unterbrochenen Linien.
*Kleemanns* Beytr. I. p. 197. t. 24. die glatte, hellblaſſe, ſchlechtbräunliche, mit einem graubrau-



*) Die Raupen bleiben ohne die mindeſte Nahrung 9 Monat im Geſpinnſte, ehe ſie ſich verpuppen: vom September bis zum Junius des folgenden Jahres. Zu Ende des Julius erſcheint der Vogel.

**) *Nicht abgebildet.*

Staats-Bibliothek Bamberg

nen schwarz bezeichneten Kopfe, braungrauen Rücken und Seitenlinien versehene *Raupe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 85. Q. *Vielstrichraupen*, Larvae *Arctostriatae; tagliebende Eulen*, Ph. N. *Heliophilae.*

2) Ohne Queerstriche.

No. 10. *Butterblumeulenraupe* (Leontodontis Tarax.) *Butterblumeule*, Ph. N. *Pallens.* *)

*Naturforscher* IX. p. 117. no. 42.

Phal. *l. album; Comma; Pallens*, einander sehr ähnlich. (von *Rottemb.*) **)

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1387. Phal. *Pallens.* Nom. *Linn.*

108. *Nivea*, die *Schneeeule.* ***)

*Müller* l. c. p. 685. no. 108. die *weisse Eule.*

*Fabric.* S. E. p. 599. no. 39. NOCTUA *nivea.* Nom. *Linn.*

*Mül-*

*) Mit derjenigen, die *Kleemann* vom *Sauerampfer* (Rumex acetosa) t. 24. erhalten, *einerley*, obschon die Farbe der unsrigen merklich und standhaft unterschieden ist.

**) Die *genaue* Beschreibung der Ph. *Pallens* verdient hergesetzt zu werden:

„Die braunen Adern der Oberflügel sehr fein und blass. Statt des schwarzen Strichs an der Einlenkung nur ein länglicher schwarzer Schatten; der weisse Strich fehlt gänzlich. Nicht weit vom äussern Rande vier *kleine schwarze Punkte*, welche ein ziemlich grosses reguläres Viereck ausmachen, das gegen die Flügel folgende Stellung ⁘ hat. Die beyden obersten Punkte sehr klein, kaum sichtbar, die beyden untersten sehr deutlich."

Nach dieser Beschreibung wird es zweifelhaft, ob die *Kleemannische* Eule t. 24. die wahre *Pallens* L. sey.

***) *Nicht abgebildet.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1383. Ph. *nivea*. Nom. *Linn.*

109. *Leporina*, die *Wolleule*.

*Müller* l. c. p. 685. no. 109. der *Aderpunkt*.

*Füeßl.* schweiz. Inſ. p. 37. no. 702. Phal. *Leporina*, der *Aderpunkt*.

Etwas ſelten auf *Birken*.

— Magaz. der Entomol. II. p. 16. t. 1. f. 1. Raupe; f. 2. Puppe; f. 3. *Schmetterling*. (Füeſsl.) *).

*Berl. Magaz.* III. p. 208. no. 7. Ph. *Leporina*, die *Wollmotte*.

Ganz weiſs, mit verſchiedenen, kurz abgeſetzten irregulären Strichen.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 555. no. 7. Ph. *Leporina*, die *Wollmotte;* das *ganz weiſſe glatte Nachteulchen*.

*Naturforſcher* XIII. p. 225. no. 2. die *rare gelbe Pudelraupe* — alle Herbſte auf den *Weiden*. (D. *Kühn.*)

*Wien. Schmetterl.* p. 67. B. *Scheinſpinnerraupen*, Larvae *Bombyciformes; düſtere Eulen*, Ph. N. *Nubilae*.

3) Raupen ſehr lange Haare *ohne Knöpfe*.

No. 8. *Erleneulenraupe* (Betulae Alni); *Erleneule*, Ph. *Leporina*.



*) Hat daſelbſt, wie auch der Chorherr Meyer, die ganze Verwandlungsgeſchichte dieſer merkwürdigen Phaläne geliefert. Von den Raupen ſagt *Füeßlin:*

„Keiner hat die ſonderbare und ſtandhafte Richtung der *langen Haare* dieſer Raupe bemerkt und angezeigt. Sie laufen nämlich in einem Kreiſe um den Leib der Raupe herum, ſo daſs die der linken Seite vom Kopf bis zum Schwanz mit ihrer Spitze nach dem Hintern, die der rechten Seite aber nach dem Kopfe zu gebogen und gerichtet ſind, t. 1. f. 1."

*List. Goed.* p. 199. no. 85. f. 85. *)
*Degeer* Inſ. I. Mém. 6. p. 210. t. 12. f. 11-17.
*Chenille* extrémement velue, d'un jaune de citron ou verdâtre, dont les poils ſont très-longs, et qui vit ſur le *Saule* et ſur *l' Aune.*
— — p. 699. t. 12. f. 17.
*Phalene* à antennes en filets, très-blanche à points et taches noires.
— Tom. II. Part. I. p. 411. no. 3. Phal. *Leporina.*
*Phalene* à antennes filiformes à trompe, à ailes rabatues en toit evaſé blanches avec quelques points et taches noires.
*Phalene flocon de laine.*
— *Ueberſ.* I. 2 Quart. 6 Abh. p. 4. t. 12. f. 11-17.
Die ſehr rauche, langhaarichte, zitron- oder grünlichgelbe *Weiden- und Erlenraupe.*
— — 4 Qu. p. 122. t. 12. f. 17.
Ein ſehr weiſser *Nachtvogel* mit ſchwarzen Punkten und Flecken, und fadenförmigen Fühlhörnern.
— — II Th. I B. p. 297. no. 3.
Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern; einem Saugrüſſel, mit flachniederhangenden weiſſen Flügeln, die einige ſchwarze Punkte und Flecke haben.
Die *Wollflocke.*

110. *Ornatrix*, die *amerikaniſche geſchmückte Eule.*
*Müller* l. c. p. 685. no. 110. das *Feſtkleid.*
*Fabric.*

*) *Goedart* iſt der erſte, der dieſe Raupe beſchrieben und abgebildet hat. *Eruca* haec Alnorum alitur foliis; totum ejus corpus hirſutum, et ſetis quaſi exiguis ac piloſis obſitum eſt.

*Fabric.* S. E. p. 586. no. 103. BOMB. *Ornatrix.* Nom. *Linn.*

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. I. p. 51. t. 24. f. 2. — de la *Jamaïque.* — Ailes environ *un pouce et trois quarts.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 107. t. 166. Fig. CD. *Foemina.* Fig. F. *Mas* — dans *l'Amérique ſeptentrionale et méridionale.*

*Sebae* Theſ. IV. t. 39. f. 19. 20.

111. *Jacobaeae*, die *Jakobseule.*

*Müller* l. c. p. 685. no. 111. die *Jakobäerin.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 703. Ph. *Jacobaeae*, die *Jakobsmotte.* Die Raupe auf dem *Jakobenkraut.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 20. Phal. *Jacobaeae.*

Die jungen *Raupen* mit mehr weiſslichen, zum Theil ſehr langen Haaren beſetzt, als die Erwachſenen (Chorh. *Meyer*).

*Berlin. Magaz.* III. p. 206. no. 6. Ph. *Jacobaeae*, die *Jakobsmotte.*

Dunkelgrau mit einem rothen Streif am Vorder- und Hinterrande. Die Unterflügel ganz karminroth.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 330. Phal. *Jacobaeae*, *Jakobsmotte.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 268. t. 49. *das ſchöne Jakobsräuplein.*

*Linné* Reiſe durch Oeland p. 133. Ph. *Jacobaeae.*

*Wien. Schmetterl.* p. 67. C. *Spindelraupen.* Larvae *Fuſiformes*; *ſchabenartige Eulen*, Ph. N. *Tineiformes.*

No. 12. *Jakobsblumeulenraupe* (Senecionis Jacobaeae); *Jakobsblumeule*, Ph. *Jacobaeae.*

 *Bekm.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 165. no. 111. Phal. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 378. Ph. *Jacobaeae*, der *Jakobsraupenvogel.*

*Cathol.* J. p. 12. Ph. *Jacobaeae*, *Jakobsblumeule.*

*Syſtem. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 155. no. 59. *Phalene du Senecon.*

*Charlet.* Onom. p. 83 *Eruca Jacobaea.*

*Petiv.* Gazoph. p. 52. t. 33. f. 6.

*Phalaena* ombrica, linea maculisque ſanguineis.

*Derham* Phyſico-Theol. l. 8. c. 6. no. 6. *Papilio Jacobea.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 168. no. 26.

*Phalaena* media, alis exterioribus, colore nigro et ſanguineo variis, extimo duntaxat margine nigro.

— — p. 169. no. 26. *Eruca* glabra ex nigro et flavo annulatim variegata.

*Scop.* Entom. carn. p. 207. no. 511. Ph. *Jacobeae.*

*Long.* lin. 8. *Lat.* 4¾.

Alae *anticae* canae; linea maculisque binis cinnaberinis. *Poſticae* cinnaberinae, fimbria fuſceſcente, terminali.

Statura *Sphingis Phegeae.*

*Fabric.* S. E. p. 588. no. 113. BOMBYX *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

*Larva* ſubpiloſa, atra, flavo-annulata.

*Pupa* tenuiſſime folliculata, teſtacea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 43. no. 380. Ph. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1384. Ph. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 146. no. 75.

*Pha-*

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis, linea punctisque duobus rubris, inferioribus rubris.

La *Phalene Carmin du Senecon.*

*Long.* 8. lign.

*Biblioth.* reg. Pariſ. p. 36. f. *omnes.*

112. *Heliconia*, die *Helikonierin.* *)

*Müller* l. c. p. 685. die *Helikonierin.*
*Cathol.* H. p. 102. Phal. N. *Heliconia.*
*Linn.* Muſ. L. V. p. 385. no. 20. Ph. *Heliconia.*

*Corpus* magnitudine Ph. *Jacobaeae.*
*Thorax* flavus, a tergo maculatus.
*Abdomen* flavum trifariam (dorſo et lateribus) fuſco-maculatum.
*Antennae* et *pedes* fuſci.
*Alae primores* utrinque ſubfuſcae.
Linea alba, longitudinalis, verſus apicem craſſior, a baſi ad medium alae.
— *poſticae* albae a baſi ad medium, fuſcae a medio ad apicem.

113. *Rubricollis*, der *Purpurhals.*

*Müller* l. c. p. 685. no. 113. der *Purpurhals.*
*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 704. Phal. *Rubricollis*, der *Rothhals.*
*Berlin. Magaz.* III. p. 208. no. 8. Ph. *Rubricollis*, der *Rothhals.*

Ganz ſchwarz, mit *einer rothen Halsbinde*, und einer gelben Spitze an dem Hinterleibe.

*Wien. Schmetterl.* p. 67. C. No. 11. *Aftermooseulenraupe* (Jungermanniae complanatae); *Aftermooseule*, Ph. *Rubricollis.*



*) *Nicht abgebildet.*

*Schaeff.* Icon. t. 59. f. 8. 9.

*Fabric.* S. E. p. 587. no. 110. BOMBYX *Rubricollis.*

Alis incumbentibus, atra: *collari ſanguineo;* abdomine flavo.

Habitat in Europae *Sylvis.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 42. no. 379. Ph. *Rubricollis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1388. Ph. *Rubricollis.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 148. no. 79. t. 12. f. 6.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis nigricantibus; *collari purpureo*, abdomine flavo.

La *Veuve.*

*Long.* 8 lign.

114. *Quadra*, der *Vierpunkt.* *)

*Müller* l. c. p. 686. no. 114. das *Viereck.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 705. der *Vierpunkt.* Phal. *Quadra.*

Bey uns etwas ſelten. Bey *Bern* ſehr häufig auf den Roſskaſtanienbäumen.

*Berlin. Magaz.* III. p. 208. no. 9. Ph. *Quadra*, die *Stahlmotte.* — p. 420. B.

Das *Weibchen* ſtrohgelb mit zwey ſtahlblauen Flecken; das *Männchen* graugelb mit einem blauen Vorderrande.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 13. no. 13. Phal. *Quadra*, das *Viereck;* der *Würfelvogel;* der *Strohhut.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 110. t. 17. *Weibchen.*

Die graue, gelb- und ſchwarzgeſtreifte haarige *Raupe*, mit rothen Knöpfgen.

Gle-

*) *Linné* hat das *Weibchen* beſchrieben.

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 502. no. 3. — p. 647. no. 14. Phal. *Quadra*, die *Stahlmotte.*

*Wiener Schmetterl.* p. 68. C. No. 1. *Pflaumeneulenraupe* (Pruni domesticae); *Pflaumeneule*, Phal. *Quadra.*

*Gladbachs* Schmetterl. p. 50. t. 22. f. 5. 6. Ph. *Quadrata foemina;* der *Würfelvogel;* das *Viereck* (Weibchen). *)

*Naturforscher* III. p. 20. no. 3. das *Männchen* gegen das W. sehr klein, von blassgelbgraulicher Farbe, die nach dem Kopfe und dem Aussenrande der Oberflügel zu ins Schwärzliche oder *Stahlblaue* fällt — hat auch keinen schwarzen Würfelfleck auf den Flügeln (D. *Kühn*).

— IX. p. 111. no. 9. Ph. *Quadra.* (von *Rottemb.*)

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 405. Ph. *Quadra.*

*Scop.* Entom. carn. p. 210. no. 519. Phal. *Quadra.*

*Long.* lin. $11\frac{1}{2}$. *Lat.* $4\frac{1}{2}$.

Alae unicolores, anticae lanceolatae, rotundatae, maculis binis cyaneis (*Foemina*).

*Variat* 1) alis *stramineis*, antennis pedibusque cyaneis.

2) — *cereis.*

3) — *albis.*

— Ann. 5. hist. nat. p. 114. no. 123. Ph. *Quadra.* In *Hungaria* variat margine alarum posticarum

*) *Gladbach* behauptet ohne Grund, *Rösel* l. c. habe das *Männchen*, er aber das *Weibchen* beschrieben und abgebildet. Die Sache ist gerade umgekehrt. Einige Naturforscher behaupten auch, Ph. *complana* L. sey das *Männchen* von Quadra. *Linné* sagt aber von der Complana: der Aussenrand sey weiss.

carum interiore, *macula alae ejusdem*, et *margine exteriore ſubtus*, RUBRIS.

*Fabric.* S. E. p. 595. no. 19. NOCTUA *Quadra.*

— anticis punctis duobus cyaneis.

*Larva* piloſa: dorſo punctis rubris maculaque nigro, lateribus lineis nigris.

*Pupa* folliculata, atra.

*Schaeff.* Icon. t. 29. f. 9. 10.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 43. no. 382. Phal. *Quadra.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1389. Phal. *Quadra.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 154. no. 89.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis flaveſcentibus, ſuperioribus ſingulis punctis duobus fuſcis.

La *Phalene jaune à quatre points.*

*Long.* 6. lign.

115. *Complana*, der *Flachflügel.* *)

*Müller* l. c. p. 686. no. 115. der *Flachflügel.*

*Füeßl.* ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 706. Phal. *Complana*, der *Flachflügel.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 647. no. 15. Phal. *Complana*, die *Randmotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 210. no. 10. Ph. *Complana*, die *Randmotte.*

Gelbgrau mit einem *goldgelben Vorderrande*, und dergleichen Unterflügeln.

*Wien. Schmetterl.* p. 68. C. No. 4. *Pappelbaumeulenraupe* (Populi albae); *Pappelbaumeule.* Ph. *Complana.*

*Fabric.*

*) Einige halten dies für das *Männchen* von. Ph. *Quadra.*

*Fabric.* S. E. p. 594. no. 18. NOCTUA *Complana.*
Alis depressis, plumbeis, margine exteriori pallidis —
*Varietatem* vidi alis *anticis* totis pallidis.
*Geoffr.* Inf. II. p. 191. no. 22.
*Tinea* alis albis, corpori circumvolutis; capite collarique flavis.
Le *Manteau à tête jaune.*
*Long.* 7 lign. *Larg.* $1\frac{1}{3}$ lign.
*Réaum.* Inf. I. t. 17. f. 13. 14.

116. *Interrupta*, die *afrikanische unterbrochene Schwarzlinie.*

*Müller* l. c. p. 686. no. 116. der *Fleischflügel.*
*Sulzers* Gesch. p. 161. t. 22. f. 3. Ph. *interrupta*, die *Unterbrochene.*
*Cathol.* I. p. 284. Ph. *interrupta.*
*Cramer* Pap. exot. II. p. 136. t. 185. Fig. E. Ph. *Interrupta.* — *Coromandel.*

3. *Eulen* mit Saugrüssel und *Kammrücken* (*Kammsauger*).

117. *Materna*, das *indianische Waisenkind.*

*Müller* l. c. p. 686. no. 117. das *Waisenkind.*
*Drury* Illustr. of nat. hist. II. p. 24. t. 13. f. 4. Ph. *Materna* — de *Bengal.*
— Ses ailes presque quatre pouces.
*Cramer* Pap. exot. II. p. 118. t. 174. Fig. B. Ph. *Materna* — à *Suriname.*

118. *Sponsa*, die *Braut.*

*Müller* l. c. p. 687. no. 118. die *Braut.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 707. Ph. *Sponſa*, die *Braut*.

Bey uns *etwas ſelten.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 23. no. 47. Ph. *Sponſa*, die *Braut*, das *Wieskind.*

*Röſels* Inſektenbel. IV. p. 137. t. 19. *)

Eine zur zweyten Kl. der N. V. gehörige weiſsgrau und braungefleckte, und mit fleiſchernen Spitzen und Warzen ausgezierte *Raupe*, auf dem Eichenlaube.

*Wien. Schmetterl.* p. 90. X. *geſchmückte Eulen.*

2) mit rothen Unterflügeln.

No. 5. *Rotheicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Rotheicheneule*, Ph. *Sponſa.*

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 13. Phal. *Sponſa*, *Rotheicheneule.*

*Hollar* Inſ. t. 8. f. 6. (*Naturf.* IX. p. 223.) Phal. *Sponſa.*

*Naturforſcher* IX. p. 112. wo der Hr. v. *Rottemb.* auch noch glaubt: *Röſel* I. t. 15. Ph. 2. habe die wahre *Pactam* L.

— *Sponſa* L. *Röſel* IV. t. 19. wird oft mit *Nupta* verwechſelt.

*Fabric.* S. E. p. 602. no. 51. NOCTUA *Sponſa.* Nom. *Linn.*

*Larva* nodoſa, dorſo verrucoſo, capite coerulefcente, corpore variegato.

*Pupa* folliculata, coeruleſcens.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 150. no. 82.

*Pha-*

*) Sponſa und Nupta werden häufig verwechſelt; daher hat auch *Scop.* no. 509. bey ſeiner Pacta, welches eigentlich Nupta L. iſt, *Röſels* IV. t. 19. angeführt.

*Phalaena* ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis; *anticis* cinereo-fuſcoque nebuloſis; *inferioribus* rubris, faſcia duplici transverſa, nigra.

La *Likenée rouge.*

*Long.* 18 lign.

*Biblioth.* Reg. Pariſ. p. 11. no. 1. 2. 3.

*Leche* nov. Inſ. ſpec. p. 35. no. 73.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis cinerea; alis inferioribus faſcia purpurea nigraque alterna. f. 10. A. B.

119. *Nupta*, die *junge Frau.* *)

*Müller* l. c. p. 687. no. 119. die *junge Frau.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 708. Ph. *Pacta*, die *Verlobte.* **)

Bey uns etwas ſelten, *auf Weiden und Linden.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 21.

Phal.

*) Dieſe und die folgende *Pacta* ſind faſt von allen Schriftſtellern verwechſelt, und alle Zitata, welche der erſten gehören, der letzten gegeben worden. Hat doch *Linné* ſelbſt *Röſels* I. N. V. 2 Kl. t. 15. bey beyden angeführt. Die meiſten haben ſich darinn geirrt, daſs ſie die *Röſelſche* Phaläne für die wahre *Pactam* Linn. angeſehen haben, da doch dieſe letztere in Deutſchland entweder gar nicht, oder äuſserſt ſelten anzutreffen iſt. Bey *Petersburg* und in dortigen Gegenden ſoll ſie häufiger ſeyn. Sie iſt der Nupta in allem ſehr ähnlich, hat aber doch einen vom *Linné* ſelbſt richtig angegebenen Unterſcheidungskarakter. Die *Nupta* hat allezeit abdomen canum, ſubtus album, wie beym *Röſel*, *Schäffer*, *Sepp*, und andern, die ſie abgebildet haben; die *Pacta* aber *abdomen ſupra rubrum.* Wer dieſes Merkmal an ſeinem Exemplar findet, der kann ſich rühmen, die wahre *Pactam* L. zu beſitzen. Dieſe iſt auch ein gut Theil *kleiner* als die Nupta, und Herr *Schaller* in Halle ſoll ſie beſitzen.

**) Keine andere, als *Nupta* L. den beygefügten Zitatis zu Folge.

Phal. *Pacta* (Röſels I. N. V. 2. t. 15. Chorh. *Meyer*). (Ebenfalls Nupta.)

*Berlin. Magaz.* III. p. 210. no. 12. Ph. *Pacta*, die *Schlangenmotte.*

Die *Oberflügel* hellgrau, mit dunkelgrauen Zeichnungen. Die *Unterflügel* roth mit breitem ſchwarzen Rande.

*Maders* (Kleem.) Raupenkalender, p. 12. no. 11. Ph. *Nupta*, die *junge Frau.*

*Röſels* Inſektenbel. I. p. 97. t. 15. die groſse ſchlanke erdfarbige *Zapfenraupe.*

*Altes Hamb. Magaz.* XIIX. p. 116. beygef. K. T. f. 1. 2. 3. Beſchr. der *Pappelweidenraupe und ihres Nachtvogels* (*Schulze*).

Der *Hinterleib* mit aſch- und dunkelpurpurfarbnen; der ganze Unterleib aber mit *ganz weiſſen* wollichten Haaren bedeckt *).

*Hollar* Inſ. t. 4. f. 3. 4. Ph. *Nupta.* (*Naturf.* IX. p. 222.)

*Naturforſcher* IX. p. 112. no. 10. Phal. *Pacta.* **)

*Wien. Schmetterl.* p. 90. No. 4. *Bachweideneulenraupe* (Salicis vitellinae); *Bachweideneule*, Ph. *Nupta.*

*Fiſchers* N. G. von Livl. p. 153. no. 362. Ph. *Nupta*, die *Verlobte.*

*Allgem. deutſche Biblioth.* XXVI. p. 11.

Nach

*) Alſo keine von der *Röſelſchen* verſchiedene Gattung, wie der V. meint, ſondern nach Linn. Karakter: Abdomine cano, ſubtus albo, oder die wahre *Nupta.*

**) Hierbey ſagt Hr. v. *Rottemb.* ganz richtig: daſs *Hufnagel* unter ſeiner Pacta die *Linnéiſche Nupta* beſchrieben habe; zugleich verſichert er: daſs die wahre *Pacta* L. auſserordentlich ſelten ſey, und er ſelbige noch nie geſehen habe; es ſey aber die *Röſelſche* I. N. V. 2. t. 15. worinn ſich dieſer groſse Kenner geirrt hat.

Nach *Bernoullis* Bemerkungen ſoll das Weibchen derſelben Eyer legen, aus welchen ohne Befruchtungen *junge Raupen* kommen *).

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 648. no. 16. Phal. *Pacta*, die *Schlangenmotte* (Hufnag. alſo *Nupta*).

*Raj*. Hiſt. Inſ. p. 152. no. 4.

*Phalaena* magna pulcherrima, alis longis, exterioribus cinereo et nigro, interioribus nigro et rubro ſeu phoeniceo coloribus variis.

*Scop*. Entom. carn. p. 206. no. 509.

Phalaena *Pacta*. **)

*Long*. Unc. 1. et lin. 6. *Lat*. 10½.

Alae crenatae; *anticae* cineraſcentes, faſciis undatis fuſcis; *poſticae* cinnaberinae, faſciis duabus nigricantibus. — *Corpus cinereum*.

*Fabric*. S. E. p. 602. no. 52. NOCTUA *Nupta*. Nom. *Linn*.

*Schaeff*. Icon. t. 151. f. 1. 2.

*Sepp* Nederl. Inſ. IV. p. 33. t. 7. het *Roode Weeskind*.

*Cramer* Pap. exot. I. p. 53. t. 33. Fig. BC. Ph. *Ilia* ***) — de la *Jamaïque*.

*Merian*. Europ. p. m. 71. t. 139.

La Chenille s'eſt nourrie de *Saule*, jusqu'au vingt deuxieme de Juillet; — le troiſieme d' Août il en ſortit un beau Papillon nocturne *gris et rouge*. †)

120. *Pa-*

*) Ihre Raupe iſt den Schlupfweſpen aber ſehr unterworfen. S. *Röſels* I. N. V. 2. p. 99. Note **).

**) Alſo auch keine andere, als die *Nupta*.

***) Die Kramerſche hat viel ähnliches mit der Nupta, obgleich dabey *Pacta* L. zitirt iſt. Das Abdomen iſt völlig *cinereum*, alſo nicht die wahre *Pacta* L.

†) Abermal *Nupta* L.

120. *Pacta*, die *Verlobte.* *)

*Müller* l. c. p. 687. no. 120. die *Verlobte.*

*Wien. Schmetterl.* p. 90. No. 3. *Baumweideneulenraupe* (Salicis albae).

La *Chenille lichenée. Réaum. Baumweideneule*, Ph. *Pacta.*

L' *Orpheline rouge. Seba* **).

— — p. 78. (*)

*Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 371. no. 13. Phal. *Pacta.*

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 392. Ph. *Pacta.*

*Fabric.* S. E. p. 602. no. 53. NOCTUA *Pacta.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 43. no. 384. Ph. *Pacta.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1392. Ph. *Pacta.* Nom. *Linn.*

121. *Pronuba*, die *Lichteule.* ***)

*Müller* l. c. p. 687. no. 121. die *Hausmutter.*

*Füeßl.*

*) S. meine Anmerk. bey *Nupta.*
Gesetzt, daſs die *Linnéischen* beyden Zitata mit Abbildungen: *Alb.* Inf. 80. *Wilk.* Pap. 17. t. 2. b. 1. die wahre *Pactam* L. bezeichneten, so wäre sie denn doch noch von keinem *vaterländischen Schriftsteller abgebildet.*

**) Ich vermuthe ganz sicher, daſs die *Chenille lichenée* des *Réaumur*, und l'*Orpheline rouge* des *Seba* keine andere, als *Nupta* L. sey, welche *Sepp* auch das *Roode Weeskind* nennt.

***) Fliegt besonders des Abends gern nach dem Lichte. Der *Flügelstaub* ist unter dem Mikroſkop sehr sehenswürdig. Sie ist der Phal. *Domiduca Hufnagels* sehr ähnlich; s. *Berl. Mag.* III. p. 404. no. 81. wie auch dessen *Orbona* no. 57. nur ist diese letztere viel kleiner. S. *Naturf.* IX. p. 125.

*Füeßl.* ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 709. Ph. *Pronuba*, die *Brautjungfer.*

Die Raupe wohnt gern in *Gärten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 21. Phal. *Pronuba.* Raupe auf dem *Lattich.* (Chorh. *Meyer.*)

*Berlin. Magaz.* III. p. 210. no. 11. Ph. *Pronuba*, der *Läufer.*

Die *Oberflügel* dunkelbraun, bisweilen grau, mit einem nierenförmigen ſchwarzen Flecke; die *Unterflügel* gelb mit ſchwarzem Rande.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 11. no. 7. Ph. *Pronuba*, die *Hausmutter*; der Läufer.

*Friſch* Inſ. X. p. 17. no. 15. 3 Pl. t. 15.

Von der koffeebraunen *Erdraupe* mit ſchwarzen Strichen neben auf ſieben Abſätzen.

*Röſels* Inſektenbel. IV. p. 217. t. 32. die zu der N. V. 2 Kl. gehörige grünlichgelbe *Raupe*, mit abgeſetzten ſchwarzen Strichen.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 746. no. 11. Ph. *Pronuba* der *Läufer.*

*Wien. Schmetterl.* p. 79. M. *Seitenſtreifraupen*, Larvae *Albilateres; ſchwarzgezeichnete Eulen*, Ph. N. *Atroſignatae.*

3) mit *ſchwarzen Punkten* am Auſsenwinkel, und gelben ſchwarzgeränderen *Unterflügeln.*

No. 20. *Sauerampfereulenraupe* (Rumicis acetoſae).

La Chenille de l'Oſeille. *Réaum. Sauerampfereule.* Ph. *Pronuba.*

La *Proſerpine. Seba.*

Der *Dronth. Geſellſch.* Schr. IV. p. 282. no. 38. Ph. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 166. no. 121. Phal. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

*Syst*. *Nat*. du Regn. Anim. II. p. 156. no. 60. *Phalene* du Senecon, de l'Oreille d'Ours etc.

*Act*. *Vpsal*. 1736. p. 124. no. 60.

*Papilio* alis depressis griseis, obscure maculatis, inferioribus flavis, margine nigro.

*Raj*. Hist. Inf. p. 237. no. 18.

*Phalaena* maior, alis praelongis, *exterioribus* vel rufis, vel ex cinereo-nigricantibus; *interioribus* fulvis cum fascia lata nigra prope imum marginem.

*Schaeff*. Icon. t. 196. f. 1. 2.

*Scop*. Entom. carn. p. 210. no. 518. Phal. *Pronuba*.

*Long*. lin. 11. *Lat*. 5.

Alae *anticae* pallide-cervinae, macula rotunda, media, fusca, punctisque binis didymis atris prope apicem; *posticae* paleaceae, fascia nigra submarginali.

*Poda* Mus. graec. p. 90.

*Fabric*. S. E. p. 603. no. 55. NOCTUA *Pronuba*. Nom. *Linn*.

*Larva* virescens, lineis dorsalibus duabus nigris, interruptis.

*Pupa* nuda, rubra.

*Imago alarum anticarum* colore valde variat.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 43. no. 385. Ph. *Pronuba*. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1393. Ph. *Pronuba*. Nom. *Linn*.

*Geoffr*. Inf. II. p. 146. no. 76.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis incumbentibus, *exterioribus* caesiis nebulosis; *interioribus* luteis, fascia atra marginali.

La *Phalene-hibou*. *Long*. 1 pouce.

*Merr*. Pin. p. 198. no. 5.

Pha-

*Phalaena* maior cum exterioribus alis fuscis, internis aureis, nigra linea fimbriatis.

*Biblioth.* Reg. Paris. p. 37. f. *omnes.*

*Degeer* Inf. I. Mém. 3. p. 109. t. 5. f. 17. 18.

*Chenille* rase, assez grosse, brune, avec deux petits traits noirs sur chaque anneau, et à trois rayes jaunâtres, qui vit de plusieurs especes de plantes.

— II. Part. I. p. 399. no. 1.

*Phalene* à antennes filiformes à trompe, à ailes croisées brunes ou grises, dont les inférieures sont jaunes bordées d'une bande noire; *la grande espece.*

*Grande Phalene-hibou.*

— *Uebers.* I. 3 Abh. I Qu. p. 85. t. 5. f. 17. 18.

Die glatte, braune, ziemlich dicke und auf allerley Kräutern lebende *Raupe*, mit zwo kleinen schwarzen Linien auf jedem Ringe, und drey gelblichen Streifen.

— — p. 87. not. †. Phal. *Pronuba*, der *Läufer*; die *Hausmutter.*

— II Th. I B. p. 288. no. 1.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, braunen oder grauen gekreuzten Flügeln, und gelben, mit einer schwarzen Binde eingefaßsten Unterflügeln. *)

Die *große Nachteule.*

122. *Paranympha*, die *Brautjungfer.*

*Müller* l. c. p. 687. no. 122. die *Brautjungfer.*

 *Füeßl.*

*) Noch eine Merkwürdigkeit von den *Raupen.* Sie kommen nie bey Tage, sondern nur des *Nachts* hervor, und fressen die Kräuter ab. Man kann sie leicht bey der Laterne finden. Eine Regel für die Gärtner. Sie überwintern auch in der Erde.

*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 37. no. 710. Phal. *Paranympha*, die *Brautführerinn.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 21. Phal. *Paranympha.*

Die grosse schlanke, graue *Raupe*, mit einem kleinen fleischernen Hörnchen auf dem achten Absatze. — Auf einem *Zwetschgenbaume.* (Chorh. *Meyer.*)

— — p. 270. t. 3. f. A B. *Raupe* und *Puppe*, (Füessl.) auf einem *Weißdornstrauch.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 406. no. 82. Phalaena *Manturna*, die *Spitzmotte.*

Hellgrau, mit Dunkelgrau gezeichnet, so zum Theil in auslaufenden Spitzen bestehet. Die *Unterflügel* oraniengelb mit zwo schwarzen Binden.

*Naturforscher* IX. p. 136. no. 82. Ph. *Manturna*, ist Ph. *Paranympha* L. (von *Rottemb.*)

— XIV. p. 88. t. 4. f. 8. 9. Beschreibung der *Raupe und Puppe* der Ph. *Paranympha* (Capieux).

*Röfels* Insektenbel. IV. p. 132. t. 18. f. 1. 2.

Ein zur N. V. 2 Kl. gehöriger *Nachtpapilion*, mit oraniengelben und schwarzbezeichneten *Unterflügeln.*

*Wien. Schmetterl.* p. 91. X. *Geschmückte Eulen.*

3) mit gelben Unterflügeln, fast ungezähnt.

No. 7. *Unbekannte Raupe. Zackenfleckichte Eule*, Ph. *Paranympha.*

*Gladbachs* Schmett. p. 70. §. 2. das *gelbe Ordensband.*

*Scop.* Entomol. carn. p. 206. no. 510. Phal. *Fulminea.*

*Long.* lin. $11\frac{1}{2}$. *Lat.* $6\frac{1}{2}$.

Alae *anticae* pallide cervinae, fascia macula lunata media, lineaque transversa fulminis ad instar propagata, nigris; *posticae* paleaceae, fasciis duabus fuscis.

*Fabric.* S. E. p. 603. no. 56. NOCTUA *Paranympha.*
Cristata, alis planis; *anticis* fuscis, strigis angulatis, albis nigrisque; *posticis* flavis, fasciis duabus arcuatis, atris.

*Drury* Illustr. of nat. hist. I. p. 49. t. 23. f. 6. — de la *nouvelle York.* — Ses ailes *deux pouces* *).

123. *Fimbria*, die *besäumte Eule.*

*Müller* l. c. p. 688. no 123. der *Saumfleck.*

*Füeßl.* schweizer. Inf. p. 37. no. 711. Phal. *Fimbria*, der *Saumfleck.*

*Naturforscher* IX. p. 90. t. 1. f. 3. Von einer *gefräßsigen Erdraupe.*
— Mit *olivengrünen* Oberflügeln, und viel *breitere dunkle indigblaue* Binde der *Unterflügel.*

*Schriften der Berlin. Gesellsch.* Naturf. Freunde I. p. 297. t. 8. f. 1-3.
Etwas von der Naturgeschichte der Ph. *Fimbria Linn.* (*Bergsträßer*).
Phalaena Noctua *Parthenii*, alis deflexis, *anticis* griseo-fusco-viridique undatis, binisque in disco maculis, altera reniformi; *posticis* aurantiacis, fascia nigra submarginali et latiore.

*Schreber* nov. spec. Inf. p. 13. no. 10. f. 9. Phalaena (*Fimbriata*) seticornis spirilinguis, alis superioribus virente-carneis, inferioribus fulvis, fascia nigra marginali.
Halae *in der Heide* in betula.



*) Ganz der Habitus der *Paranympha* mit allen Karakteren, sogar den beyden Ohrflecken auf den Oberflügeln; nur die Farben derselben dunkelschwärzlich, purpurfarbig.

*Wien. Schmetterl.* p. 78. M. No. 18. *Schlüsselblumeulenraupe* (Primulae Veris); *Schlüsselblumeule*, Ph. *Fimbria.*

*Fabric.* S. E. p. 603. no. 57. NOCTUA *Fimbria.* Nom. *Linn.*

124. ***Maura***, der *mauritanische Zahnflügel.*

*Müller* l. c. p. 688. no. 124. der *Zahnflügel.*

*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 37. no. 722. Phal. *Maura.*

Bey uns etwas *selten.*

*Wien. Schmetterl.* p. 90. X.

1) mit schwärzlichen Unterflügeln.

No. 1. *Unbekannte Raupe; dunkelolivenbraune Eule*, Phal. *Maura.*

*Naturforscher* VI. p. 112. t. 5. f. 1. Lemur, das *Gespenst* (Meineke) *).

*Gladbachs* Schmetterl. p. 25. t. 12. f. 3. 4. das *schöne große schwarze Kind;***) der *Bachvogel;* der *Schiffvogel;* das *Gespenst.*

Gern an den *Wasserbächen* im *Junio und Julio.*

*Schaeff.* Icon. t. 1. f. 5. 6.

*Fabric.* S. E. p. 604. no. 61. NOCTUA *Maura.*

Cristata, alis incumbentibus, *dentatis*, cinereo nigroque variis, subtus margine albo.

In *Anglia frequens.*

125. *Fra-*

*) Hr. *Meineke* sagt unter andern p. 114. Ph. *Nupta* kenne er nicht. Es habe zwar *Linné* dabey auf *Rösels* IV. t. 15. verwiesen; der Augenschein aber lehre, dass sie daselbst nicht abgebildet sey. Hr. M. hat sich hier durch einen Druckfehler im *Linné* irre machen lassen. Denn es muss heissen: *Rösel* I. Ph. 2. t. 15. Und das ist nach der *Linnéischen* Beschreibung Ph. *Nupta* ausser allem Streit.

**) Zum Unterschied des *kleinen schwarzen Kindes*, *Rösel* I. N. V. 2 Kl. t. 56. *Typica* L.

125. ***Fraxini***, das *blaue Ordensband.*

*Müller* l.c. p. 688. no. 125. das *blaue Band.*

*Füeßlins* schweizer. Ins. p. 37. no. 713. das *blaue Band. Selten.*

*Röfels* Insektenbel. IV. p. 190. t. 28. f. 1. (*Weibchen.*)

Der zur 2 Kl. N. V. gehörige, ausserordentlich grosse *Papilion*, mit grau gewässerten *Oberflügeln*, und hellviolettblauen und schwarzen *Unterflügeln.*

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 342. Ph. *Fraxini*, die *eigentliche Eschenraupe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 90. No. 2. *Eschenraupeneule* (Fraxini excelsioris); *Escheneule*, Ph. N. *Fraxini.* Auch auf den *schwarzen Pappelbäumen.*

L'*orpheline bleue. Seba.*

*Naturforsch.* XIV. p. 54. t. 2. f. 4. *Raupe.* (D. *Kühn.*)

*Gladbachs* Schmetterl. p. 69. t. 31. f. 1-5. Ph. *Fraxini* (*Männchen*).

Das *blaue Ordensband* mit seiner *Raupe*, *Gespinnst und Puppe.*

Eine *Waldraupe.*

*Harris.* t. 31. fig. d. e.

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 369. Ph. *Fraxini.**)

*Fabric.* S. Ent. p. 602. no. 54. NOCTUA *Fraxini.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 151. no. 83.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis deflexis, superioribus cinereo fuscoque undulatis, inferioribus nigris, fascia transversa coerulea.

La *Likenée bleue.*

*Long.* 2 pouces.



*) Es ist falsch, wenn hierbey auf die Abbildung im 18ten B. des alten *Hamb. Magaz.* verwiesen wird. Denn dies ist *Nupta* L. wie schon die *Raupe mit dem Rückenzapfen* beweiset.

126. *Chrysitis*, die *Goldeule.* *)

*Müller* l. c. p. 688. no. 126. der *Kupferflügel.*

*Füeßl.* schweizer. Ins. p. 37. no. 714. die *Goldeule.* Ph. *Chrysitis.*

Etwas *selten.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 212. no. 13. Phal. *Chrysitis*, der Messingglanz.

Ist auf den *Oberflügeln* so glänzend wie Messing, mit einer breiten gelbbraunen gewässerten Binde.

*Wiener Schmetterl.* p. 92. Z. *Halbspannraupen*, Larvae *Semigeometrae; reiche Eulen*, Phal. N. *Metallicae.*

1) von mittlerer Grösse.

No. 2. *Hanfnesseleulenraupe* (Galeopsidis Tetrahit.); *Hanfnesseleule.* Ph. N. *Chrysitis.*

*Naturforscher* VI. p. 79. t. 3. f. 5. *Raupe;* f. 6. *Vogel.*

Von der *Raupe des Messingvogels.* (D. *Kühn.*)

— — IX. p. 112. no. 13. Ph. *Chrysitis.*

Die *Raupe* hat nur *zwey Paar Bauchfüße*, und gleicht sehr der *Raupe* von Ph. *Gamma* (von *Rottemb.*).

— — X. p. 93. Ph. *Chrysitis.*

Die *Raupe* selten auf Nesseln; häufiger unter den Blättern der *grossen Kletten* (von *Scheven*).

*Gladbachs* Schmett. p. 9. t. 3. f. 5. 6. 7. f. 5. *Männchen;* f. 6. *Weibchen.*

Ph. *Chrysitis*, der *Messingglanz;* der *Messingvogel.*

*Leske*

*) *Rösel* hat diese Phaläne gar nicht. Daher ist das Zitatum im *Linné: Rösel* I. Ph. 2. t. 31. oder 32. falsch. Denn erstere ist *Atriplicis*, die 2te *oleracea* L.

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 14. die *Goldeule.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 182. no. 45.
*Phalaena* media; alis exterioribus duplici arcu transverſo, *viridi - aurato*, ſerici inſtar ſplendente, inſignibus.

— — p 183.
*Eruca Geometra* maiuscula, coloribus coeruleo - viridi et albicante varia.

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 157. no. 65. *Phalene de la Menthe.*

*Scop.* Ent. carn. p. 210. no. 517. Ph. *Chryſitis.*
*Long.* $6\frac{1}{3}$. *Lat.* $4\frac{1}{2}$. lin.
Alae murinae; anticis faſciis binis *orichalceis.*

*Fabric.* S. E. p. 606. no. 69. NOCTUA *Chryſitis.*
Criſtata; alis deflexis, *orichalceis*, margine faſciaque griſeis.
*Larva* ſolitaria, gibboſa, viridis albo - ſtriata.
*Pupa* fuſca.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 43. no. 386. Phal. *Chryſitis.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1394. Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 101. f. 2. 3.

*Sepp* Nederl. Inſ. V. p. 7. t. 1. f. 7—12.
De *Goud - Vlinder;* het *Koper - Kappelletje.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 149. no. 81.
*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis ferrugineo - fuſcis, faſcia duplici transverſa viridi-aurea.
Le *verd - doré.*
*Long.* 8. lign.

*Degeer*

*Degeer* Inſ. II. Part. I. p. 428. no. 2. *)

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun clair griſeâtre, traverſées par *deux bandes dorées verdâtres*.

*Phalene à bandes dorées.*

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 311. no. 2.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und hellbraunen graulichen niederhangenden Flügeln, und *zwo goldgrünlichen Queerbinden.*

Die *Phaläne mit Goldbinden.*

127. *Gamma*, die *Gammaeule.*

*Müller* l. c. p. 688. no. 127. der *goldne Buchſtabe.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 715. das *griechiſche Gamma.*

Bey uns *ſehr häufig.*

*Friſch* Inſ. V. p. 37. no. 15. 2 Pl. t. 15.

Von dem *grünen Ausſpanner* mit den 6 weiſſen Rückenfäden und dem weiſſen Saum an der Seite, und mit den ſchwarzen Backenſtreifen.

*Berlin. Magaz.* III. p. 212. no. 14. Ph. *Gamma*, das *Ipſilon.*

Glänzend ſchwarzgrau, gelblich marmorirt mit einem *griechiſchen Gamma* oder *lateiniſchen Ipſilon.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 20. t. 5. Die dicke grasgrüne und weiſsgeſtreifte *Spannenraupe.*

— — p. 24. der *Piſtolenvogel;* der *Gammavogel.*

*Na-*

*) Der V. hat ſich darinn geirret, daſs er dabey *Geoffr.* II. p. 159. no. 97 Le *volant doré* zitirt hat; denn das iſt nicht *Chryſitis*, ſondern *Atriplicis* L.

*Naturforscher* VI. p. 79. die *Raupe* ſehr gleich der Raupe der Ph. *Chryſitis.*

*Wien. Schmetterl.* p. 93. No. 5. *Zuckererbſeneulen-raupe* (Piſi ſativi).

La Chenille de Legumes. *Réaum.*

*Zuckererbſeneule.* Ph. N. *Gamma.*

*Neueſte Mannichfalt.* IV. p. 334.

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 371. Ph. *Gamma*, das *weiſ-ſe griechiſche Gamma.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 166. no. 127. Ph. *Gamma.* Nom. *Linn.*

*Syſtem. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 156. no. 63.

Le *Lamda;* le *Gamma doré.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 163. no. 16.

*Phalaena* e mediis minuſcula, alis exteriori-bus cinereo et nigricante colore variis, media parte linea alba, y litteram aliquatenus referen-te, notatis.

*Scop.* Ent. carn. p. 212. no. 523. Ph. *Gamma.*

*Long.* lin. 9. *Lat.* 5.

Alae anticae *Gamma graeco* albo inſcriptae.

*Larva* virens villoſula: lineis 2 dorſalibus pallidioribus. Pedibus pectoralibus 6; abdomi-nalibus 4; caudalibus 2. *Subgeometra.*

— Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 125. Phal. *Gamma.*

Vel *Sphinx*, vel media ſane inter *Sphinges* et *Phalaenas;* ſugit enim Nectar ex floribus *ex-panſis alis*, nec illis inſidet.

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 607. no. 72. NOCTUA *Gamma.* Nom. *Linn.*

*Larva geometra*, dodecapoda, viridis; ſtriis dorſalibus albis, laterali flava, capite fuſco.

*Pupa* folliculata, brunnea.

*Schaeff.*

*Schaeff.* Icon. t. 84. f. 5.
*Sepp* Nederl. Inſ. V. p. 1. t. 1. f. 1 6. De *Gamma-Vlinder.*
*Mülleri* Faun. Fridr. p. 44. no. 388. Phal. *Gamma.* Nom *Linn.*
— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1395. Nom. *Linn.*
*Geoffr.* Inſ. II. p. 156. no. 92.
*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis; exterioribus *Lambda graeco* inſcriptis.
Le *Lambda.* λ.
*Long.* 9 lign.
*Act. Vpſ.* 1763. p. 25. no. 68.
*Papilio* alis depreſſis, littera y aurea inſcriptis.
*Biblioth.* Reg. Pariſ. p. 31. f. *omnes.*

128. *Circumflexa,* der *Krummſtrich.* *)

*Müller* l. c. p. 689. no. 128. der *Krummſtrich.*
*Wiener Schmetterl.* p. 93. No. 4.
*Schafgarbenkrauteulenraupe* (Achillaeae Millefolii); *Schafgarbenkrauteule,* Phal. *Circumflexa.*

129. *Interrogationis,* das *Fragezeichen.*

*Müller,* l. c. p. 689. no. 129. das *Fragezeichen.*
*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 716. Ph. *Interrogationis,* das *Fragezeichen.*
Bey uns *ſehr ſelten.*
*Berlin. Magaz.* III. p. 212. no. 15. Ph. *Interrogationis,* das *Fragezeichen.*
Iſt dem *Gamma* ähnlich, nur daſs der ſilberfarbige Fleck ein Fragezeichen vorſtellt.

*Wien.*

*) *Nicht abgebildet.*

*Wien. Schmetterl.* p. 93. No. 3.
*Brennnesseleulenraupe* (Vrticae urentis); *Brennnesseleule*, Ph. N. *Interrogationis*.
*Cathol.* I. p. 283. Ph. *Interrogationis*.
*Fabric.* S. E. p. 607. no. 73. NOCTUA *Interrogationis*. Nom. *Linn*.

130. *Jota*, die *Jotaeule*.

*Müller* l. c. p. 689. no. 130. das lange J.
*Füeßl.* schweizer. Inf. p. 38. no. 717. Phal. *Jota*, das *griechische Jota*.
*Naturforscher* X. p. 94. t. 2. f. 5. 6. Ph. *Jota*. (von *Scheven*.)
*Cathol.* J. p. 324. Ph. *Jota*.
*Fabric.* S. E. p. 608. no. 76. NOCTUA *Jota*. Nom. *Linn*.
*Larva* dodecapoda, nuda, viridis, albomaculata.
*Cramer* Pap. exot. II. p. 106. t. 165. Fig. C. Ph. *Jota* — en *Virginie*. *)

131. *Festucae*, die *Schwingeleule*.

*Müller* l. c. p. 689. no. 131. t. 22. f. 7. der *Sumpfschwingel*.
*Berlin. Magaz.* III. p. 214. no. 16. Phal. *Festucae*, der *Goldglanz*.
Goldglänzend, gelblichbraun mit drey silberglänzenden Flecken auf jedem Oberflügel.
*Wien. Schmetterl.* p. 92. No. 1. *Schwingeleulenraupe* (Festucae fluitantis); *Schwingeleule*, Phal. *Festucae*.

*Klee-*

*) Das Jota ist gröser, und wie ein weisser Haken; die Flügel buntscheckiger; sonst viel ähnliches mit dem *Linnéischen* J.

*Kleemanns* Beytr. I. p. 251. t. 30. Fig. A.

Der zur 3ten Kl. gehörige prächtige zimmetbraune, mit Gold und Silber gezierte Papilion.

*Fabric.* S. E. p. 607. no. 71. NOCTUA *Festucae.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 44. no. 387. Phal. *Festucae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1397. Ph. *Festucae.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 429. no. 3. *Phalene dorée à taches argentées.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues mêlées de brun et de jaune doré avec trois taches argentées.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 312. no. 2. Ph. *Festucae*, die *Goldphaläne mit Silberflecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, Rückenkamm, und niederhangenden, goldgelben, braunmelirten Flügeln, mit drey Silberflecken.

132. *Meticulosa*, die *Scheueule.*

*Müller* l. c. p. 689. no. 132. der *Achatflügel.*

*Füessl.* schweiz. Inf. p. 38. no. 718. Ph. *Meticulosa*, die *Scheueule.*

Bey uns *etwas selten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 23. Ph. *Meticulosa.*

*Raupe* verwandelt sich ohne einiges Gewebe (Chorh. *Meyer*).

*Berlin. Magaz.* III. p. 214. no. 17. Ph. *Meticulosa*, das *einfache Dreyeck.*

Die *Oberflügel* theils grünlich, theils röthlich, theils okergelb, mit einem dreyeckigen

kupfer-

kupferfarbenen Fleck; die *Unterflügel* weiſs und röthlich glänzend.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 9. no. 1. Ph. *Meticuloſa*, der *Achatflügel.*

*Röſels* Inſektenbel. IV. p. 65. t. 9.

Die von verſchiedenen Pflanzen ſich nährende, glatte und grüne *Raupe*, mit braunem Kopf, weiſser unterbrochener Rückenlinie, gelben Punkten, und gleichfarbiger Seitenlinie.

*Naturforſch.* IV. p. 127. wo Hr. *Kleem.* anmerkt, daſs die dem ſ. *Röſel* überſchickte Abbildung der *Raupe* fehlerhaft geweſen ſey.

*Wiener Schmetterl.* p. 83. P. *Schrägſtrichraupen*, Larvae *Obliquoſtriatae*; *dreyeckmacklichte Eulen*, Ph. N. *Trigonophorae.*

No. 1. *Mangoldeulenraupe* (Betae vulgaris); *Mangoldeule*, Ph. *meticuloſa.*

*Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 371. no. 14. Ph. *Meticuloſa.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 383. Ph. *Meticuloſa.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 166. no. 132. Phal. *Meticuloſa.* Nom. *Linn.*

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 143. no. 7. Le *Timide*, ou *Craintif*, Ph. *meticuloſa.*

*Goed.* Belg. I. p. 109. t. 56. *Gall.* Tom. II. t. 56. La *Craintive.*

*Liſt. Goed.* p. 118. no. 44. t. 44.

Ob ſingularem timiditatem hanc Erucam *Meticuloſam* nominavi.

*Scop.* Ent. carn. p. 207. no. 512. Ph. *meticuloſa.*

*Long.* lin. 11. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.

Alae ſubdentatae; *anticae* triangulo intra triangulum; utriusque baſi craſſiori margini impoſita.

*Fabric.* S. E. p. 608. no. 78. NOCTUA *meticulosa.*

Cristata, alis deflexis, eroso-dentatis, pallidis; *anticis* basi incarnata, *triangulo fusco.*

*Larva* nuda, viridis; linea dorsali interrupta lateralibusque albis.

*Pupa* folliculata, fusca, postice rubra.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 43. no. 383. Ph. *meticulosa.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1398. Ph. *meticulosa.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 151. no. 84.

*Phalaena* seticornis, spirilinguis, alis deflexis, margine erosis, cinereo-fuscis, superioribus triangulo marginali fuscescente incarnatum includente; thorace gibbo.

La *meticuleuse.*

*Long.* 10. lign.

*Degeer* Inf. Tom. I. Mém. 3. p. 102. t. 5. f. 12-14.

*Chenille* rase assez grande, d'un beau verd avec trois raies longitudinales blanches, qui mange les feuilles de différentes plantes cultivées dans les jardins.

— — p. 698. t. 5. f. 14.

*Phalene* à antennes en filets, d'un gris blanchêatre, à double tache triangulaire d'un verd obscur.

— Tom. II. Part. I. p. 427. no. 1. Ph. *meticulosa;* Phalene *meticuleuse.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé; à ailes rabatues découpées grises à nuances d'un brun verdâtre, et traversées par une grande tache triangulaire verdâtre, qui renferme un triangle couleur de chair.

— *Uebers.* I. 3 Abh. 1 Qu. p. 80. t. 5. f. 12-14.

Die

Die ziemlich grosse, glatte und grüne *Raupe*, mit drey weissen längsgehenden Rückenlinien, auf verschiedenen Pflanzen.

*Degeer Uebers.* 4 Qu. p. 121. t. 5. f. 14.

Ein grauweisslicher *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und einem doppelten dreyeckigen dunkelgrünen Flecke.

— II Th. I B. p. 310. no. 1. Ph. *meticulosa*, die *Furchtsame*.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, Rückenkamm, und grauen niederhangenden, braungrünlich schattirten, ausgezackten Flügeln, mit einem grossen weissen grünlichen dreyeckigen Queerfleck, der ein fleischfarbiges Dreyeck in sich schliesst.

133. *Absinthii*, die *Wermutheule*.

*Müller* l. c. p. 690. no. 133. der *gevierte Punkt*.

*Füesslins* schweizer. Ins. p. 38. no. 719. Ph. *Absinthii*, die *Wermutheule*.

*Berlin. Magaz.* III B. p. 416. no. 100. Ph. *Punctigera*, der *punktirte Mönch*.

Aschgrau, mit vielen kleinen braunen Flecken, Strichen und Punkten, und einem weissgraulichen Fleck, woran in jedem zwey kleine braune Vierecke stehen.

*Naturforscher* IX. p. 142. no. 100. Ph. *Punctigera*, ist die Ph. *Absynthii* L. (von *Rottemb.*)

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 77. no. 220. Phal. *Absynthii*, der *gevierte Punkt*.

*Frisch* Ins. VII. p. 19. 2 Pl. t. 12. Von der *Wermuthraupe* und ihrem Papilion.

*Röfels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 303. t. 61. die *buntgefleckte Wermuthraupe*.

*Wien. Schmetterl.* p. 73. I.* *Tygerraupen*, Larvae *Variegatae; kappenhalſigte Eulen*, Ph. N. *Cucullatae.*

1) Raupen, weiſs mit Rothgrün.

No. 1. *Wermutheulenraupe* (Artemiſiae Abſynthii); *Wermutheule*, Ph. *Abſynthii.*

*Goed.* La *Graviſante.*

*Fiſchers* N. G. von Livl. p. 153. no. 363. *Gevierter Punkt*, Ph. *Abſynthii.*

*Cathol.* G. p. 261. *Graviſante.*

*Fabric.* S. E. p. 610. no. 86. NOCTUA *Abſinthii.*

Criſtata, alis deflexis, canis, faſciis punctisque in tetragonum poſitis, nigris.

*Larva* viridis, maculis flavis rufisque lineata.

*Pupa* folliculata, brunnea, antice viridis.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 44. no. 394. Ph. *Abſynthii.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1399. Ph. *Abſynthii.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 158. no. 95.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis albido-cinereis, lineis longis nigris.

L'*iota.*

*Long.* 9. lign.

134. *Alni*, die *Rudereule.* *)

*Müller* l.c. p. 690. no. 134. das *Doppelfeld.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 720. Ph. *Alni*, das *Kolbenhorn.*

Bey uns ſelten auf den *Linden.*

Die

*) Dieſe haben die *Wiener Entomologen* gar nicht. *Degeer* hat zuerſt ihre Raupe bekannt gemacht.

Die *Raupe* ſchwarz mit gelben Rückenſchilden, und langen ſchwarzen *Haaren*, die am Ende ein *Kölbchen* haben.

*Füeßl.* Magaz. der Entomol. II. p. 43.

Die *Raupe* wenigen bekannt (Chorh. *Meyer*). t. 1. f. 5. *Raupe* (Füeſsl.) f. 6. der Kopf etwas vergröſsert; f. 7. der fünfte Abſatz etwas vergröſsert; f. 8. die *Phaläne*.

*Naturforſcher* XII. p. 58. t. 1. f. 14. 15. 16. *Raupe*, *Puppe*, *Vogel*; Ph. *Alni*, das *Kolbenhorn*; der *Ruderfalter* *) (*Capieux*).

— XIV. p. 91. Nachtrag von *Capieux* t. 4. f. 11. Ph. *Alni* noch einmal, *vorzüglich ſchön.*

*Degeer* Inſ. Tom. I. Mém. 8. p. 280. t. 11. f. 25-28. **)

*Chenille* noire, à treize grandes taches ovales jaunes ſur le dos, qui eſt garnie de *poils ſinguliers en forme d'avirons*, et qui mange les feuilles de l'*Aune*.

— — p. 699. t. 11. f. 28.

*Phalene* à antennes en filets, d'un cendre noirâtre, à deux grandes taches blanchâtres ſur chaque aile ſupérieure.

— Tom. II. Part. I. p. 412. no. 6.

*Phalene à avirons.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un cendré noirâtre, avec deux taches d'un blanc ſale, et quelques traits longitudinaux noirs, dont les ailes inférieures ſont blanches.



*) An *Füeßl.* abgebildeter *Raupe* ſtehen die ruderartigen Haare natürlicher.

**) Fig. 26. ein ſehr vergröſsertes *ruderförmiges Haar* mit Längsſtreifen.

*Degeer Uebers.* I. 8 Abhandl. 2 Qu. p. 54. t. 11. f. 25 - 28.

Die schwarze *Erlenraupe* mit dreyzehn grossen, gelben, ovalen Rückenflecken, und ganz sonderbaren *ruderförmigen Haaren.*

— — 4 Qu. p. 122. t. 11. f. 28.

Ein aschgrauschwärzlicher *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und zween grossen weisslichen Flecken auf jedem Oberflügel.

— II Th. I B. p. 299. no. 6. der *Ruderfalter.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, aschgrauschwärzlichen niederhangenden Flügeln, mit zween weissgraulichen Flecken, und einigen schwärzlichen längst herunterlaufenden Strichen und weissen Unterflügeln.

135. *Psi*, das *griechische Psi.*

*Müller* l. c. p. 690. no. 135. das *griechische* Ψ.

*Füessl.* schweiz. Ins. p. 38. no. 721. Phal. *Psi*, das *griechische Psi.*

*Nicht selten auf Eichen, Apfelbäumen* und *Weiden.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 23. Ph. *Psi.*

— Raupen sterben von Würmern bald vor, bald nach der Verwandlung.

— fressen den abgelegten Balg.

— *Rösels* Raupe t. 8 auf den *Weißdornen.*

— verwandeln sich in Hülsen von Seide und Holzspänchen.

— Rösel hält sie beyde für *verschiedene Arten.* (Chorh. *Meyer.*)

*Frisch* Inf. II. p. 13. 1 Pl. t. 2. Von der *Rückzapfenraupe.*

Ber-

*Berlin. Magaz.* III. p. 214. no. 18. Phal. *Psi*, die *Pfeilmotte.*

Weisslich aschgrau, mit schwarzen Zeichnungen, darunter ein griechisches *Psi* sich ausnimmt.

*Naturf.* IX. p. 112. no. 18. Ph. *Psi.* Hr. von *Rottemb.* ist noch ungewiss, ob die von *Röseln* I. N. V. 2. t. 7. 8. abgebildete Phalänen zwo wirklich verschiedene Arten, oder nur dem *Geschlecht* nach verschieden sind — t. 7. häufiger; t. 8. seltener.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 30. no. 69. p. 54. no. 147. Ph. *Psi*, die *Pfeilmotte.*

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 49. t. 7. die grosse *Zapfenraupe* mit dem breiten gelben Rückenstreif.

— p. 54. die grossen schwarzen Augen der Phaläne funkeln bey Nachtzeit an dunkeln Orten wie *glüende Kohlen.* (Kleem.)

— p. 54. t. 8. die kleinere buntfarbige Zapfenraupe. *)

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 554. no. 4. Phal. *Psi*, die *Pfeilmotte.*

*Wien. Schmetterl.* p. 67. B. *düstre Eulen.*

1) Die Raupen mit einem Auswuchs auf dem Rücken.

No. 2. *Schleheneulenraupe* (Pruni spinosae); *Schleheneule*, Ph. *Psi.*

*Fischers* N. G. v. Livl. p. 153. no. 364. das *griechische Psi*, Ph. *Psi.*

I 4 *List.*

*) Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die *Röselsche* Phaläne t. 8, als die kleinere und schöner gezeichnete, das *Männchen* zu t. 7. Die Puppe t. 8. hat am Schwanze drey zarte Spitzchen, die t. 7 nicht.

*List. Goed.* p. 209. no. 92. f. 92.
*Eruca* formosa et admirabilis.

*Bekm.* Epit. S. L. p. 167. no. 135. Phal. *Psi.* Nom. *Linn.*

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 158. no. 69. Phal. *Psi.*

*Raj.* Hist. Inf. p. 350. no. 23.
*Eruca* rarius pilosa, *cornu* in medio dorso erecto.
— *Aurelia* spadicea, theca inclusa.
— *Papilio* fusco-albo-nigroque coloribus varia. Magna *stria* nigra ab oculis per alarum medium deorsum vergit; inferius tanquam duae cruces nigrae. *Interiores* alae coloris candicantis.

*Fabric.* S. E. p. 614. no. 104. NOCTUA *Psi.*
Cristata, alis deflexis cinereis; *anticis* lineola baseos characteribus nigris.
*Larva* pilosa; dorso flavo, lateribus nigris, rubro-maculatis; thorace cornu erecto nigro.
*Pupa* folliculata, brunnea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 44. no. 393. Phal. *Psi.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1400. Phal. *Psi.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 155. no. 91.
*Phalaena* seticornis, spirilinguis, alis deflexis canis, maculis *Psiformibus* nigris.
Le *Psi*, Ψ.
*Long.* 9 lign.

*Bibl.* Reg. Parif. p. 33. f. *omnes.*

136. *Chi*, das *griechische Chi.*

*Müller* l. c. p. 690. no. 136. das *griechische Chi.*

*Füeßl.*

*Füeßl.* ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 722. Ph. *Chi*, das *giechiſche Chi.*

Bey uns *etwas ſelten.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 280. no. 19. Ph. *Chi*, das *griechiſche Chi.*

Weiſslich, mit ſchwarzgrauen Zeichnungen, darunter ein griechiſches *Chi.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 73. no. 208. Phal. *Chi.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 87. t. 13. die blaſsgrüne glatte *Raupe* mit weiſſen Streifen.

*Wien. Schmetterl.* p. 72. H. *grauſcheckige Eulen.* No. 3. *Agleyeulenraupe* (Aquilegiae vulgaris); *Agleyeule*, Ph. N. *Chi.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 339. Ph. *Chi.*

*Fabric.* S. E. p. 615. no. 105. NOCTUA *Chi.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, viridis; lineis lateralibus duabus albis.

*Pupa* folliculata, fuſca.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1401. Phal. *Chi* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 162. no. 103.

*Phalaena* ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis cinereis, ſuperioribus faſcia decuſſata fuſca, puncto nigro, lineisque transverſis albidis.

*L'ix.* — *Long.* 6. lign.

137. *Aceris*, die *Ahorneule.*

*Müller* l. c. p. 691. no. 137. der *Eyring.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 723. Ph. *Aceris*, die *Gelbzotte.*

Bey Genf auf den *Roßkaſtanien* häufig.

*Friſch* Inſ. I. p. 24. 2. Pl. t. 5. von der *gelbzottigen Kaſtanienraupe.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 84. no. 242. Phal. *Aceris*, die *Gelbzotte; der Eyring; der Ahornvogel.*

*Röſels* Inſektenbel. IV. p. 40. t. 4. f. 5. Eine beſondere *Raupe.*

Die rothe und gelbe *Bürſtenraupe* mit dem braunen Kopf und rautenförmigen ſchwarzen Rückenzierrathen.

*Kleemanns* Beytr. I. p. 149. t. 17. f. 1-5.

Die hochgelbe langhaarige, mit 9 Paar, theils gelb- theils rothen pyramidenförmigen Bürſten verſehene *Raupe.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 374. Ph. *Aceris*, die *Ahornraupe; der Widder.*

*Wiener Schmetterl.* p. 67. B. *düſtere Eulen.*

3) *Raupen* ſehr lange Haare ohne Köpfe.

No. 7. *Roſskaſtanieneulenraupe* (Aeſculi Hippocaſtani).

La Chenille du Marronier d'Inde. *Réaum.*

*Roſskaſtanieneule*, Ph. *Aceris.*

*Aldrovand.* de Inſ. Lib. II. t. 3. f. 15. 16. p. 269. ed. Bonon. 1602. fol. die *Raupe; der Stern.*

*Schaeff.* Inſ. t. 66. f. 8. 9.

*Scop.* Ent. carn. p. 213. no. 524. Ph. *Aceris.* *)

*Long.* lin. 7. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Alae *anticae* caneſcentes, lineis transverſis, dentatis, annuloque ocellari nigris.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 44. no. 392. Ph. *Aceris.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1402. Phal. *Aceris*, Nom. *Linn.*

Geoffr.

*) Hierbey hat *Scop. Röſels* I. Ph. 2. t. 29. unrichtig angeführt; denn das iſt Ph. *Perſicaria* L. no. 142.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 156. no. 93. *)

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis; *ſuperioribus* cinereo-fuſcoque nebuloſis, lineis undulatis et *Omicro* nigris; inferioribus cinereis.

L' *Omicron nebuleux.*

*Long.* 11 lign.

138. *Aprilina*, die *Aprileule.* **)

*Müller* l. c. p. 691. no. 138. der *Pfeilpunkt.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 724. Ph. *Aprilina*, der *Seladon.* ***)

— Magaz. der Entomol. II. p. 24. Phal. *Aprilina.*

Die graue mit weiſſen und ſammtſchwarzen Strichen gezierte *Raupe*, auf einem *Eichenblatte* (Chorh. *Meyer*).

(Die 3 Arten näher beſtimmt p. 25. *Füeßl.*)

*Berlin. Magaz.* III. p. 422. not. c. Eine gröſsere Art: Aprilina *maior.* (Dies die *Linnéiſche* Aprilina.)

*Röſels* Inſektenbel. III. p. 238. t. 39. f. 4.

Der blaſsblaulichgrüne, weiſs- und ſchwarzſcheckige *Nachtpapilion* der 2ten Kl. (ohne *Raupe*).

*Wien. Schmetterl.* p. 70. E. *Scheckichte Eulen.* No. 5. *Eichbaumeulenraupe* (Quercus Roboris); *Eichbaumeule*, Ph. *Aprilina.*

*Gladbachs* Schmetterl. p. 22. die *groſse Diana.*

*Raj.*

*) Hierbey iſt *Röſels* I Ph. 2. t. 13. unrichtig angeführt: das iſt Ph. *Chi* L. no. 136.

**) Dieſe wird oft mit *Ludifica* L. no. 143. verwechſelt. Es giebt 3 Arten derſelben: Aprilina die *gröſste.*

***) Beyde Zitata falſch. Das erſte iſt Ludifica, das zweyte die *kleinſte Art.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 158. no. 4.

*Phalaena* media pulcherrima, alis oblongis; *exterioribus* dilute coeruleo-viridibus, maculis et lineolis nigris perbelle depictis.

*Fabric.* S. E. p. 614. no. 100. NOCTUA *Aprilina.* Nom. *Linn.*

*Larva* cinereo-brunneoque variegata; linea dorſali alba, interrupta ſegmentoque ſingulo puncto albo.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 44. no. 391. Phal. *Aprilina.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1404. Phal. *Aprilina.* Nom. *Linn.*

139. *Virens*, die *weißgrüne Eule.* *)

*Müller* l. c. p. 691. no. 139. der *weiſſe Mond.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 300. no. 51. Phal. *Tridens*, der *Dreyzack.*

Ganz grün, mit einem weiſſen ſchmalen Vorderrande, und einem weiſſen, mit drey etwas unmerklichen Spitzen verſehenen Fleck in der Mitte der Flügel.

*Naturforſcher* IX. p. 120. no. 51. Ph. *Tridens*, der weiſſe Fleck mit 3 Spitzen ſtellt eigentlich einen *halben Mond* vor, in dem das *Mittelſpitzchen* beynahe unmerklich iſt. (von *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 746. no. 47. Ph. *Tridens*, der *Dreyzack.*

*Wiener Schmetterl.* p. 85. Q. *Tagliebende Eulen.* No. 8. *Unbekannte Raupe; weißgrüne Eule*, Ph. *Virens.*

140. *Turca*, der *Türke.*

*Müller* l. c. p. 691. no. 140. der *Türke.*

*Ber-*

*) *Nicht abgebildet.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 304. no. 55. Phal. *Volupia*, der *Rauchfuß*.

Blaßroth, mit einem weissen Fleck und zwo grauen Queerstreifen auf den Oberflügeln.

*Naturforscher* IX. p. 123. no. 55. Ph. *Volupia.*

Die *Raupe* rothbraun, anderthalb Zoll lang, ziemlich dick. (von *Rottemb.*)

*Wien. Schmetterl.* p. 84. No. 2. *Binsengraseulenraupe* (Iunci pilosi); *Binsengraseule*, Phal. *Turca.*

*Der Dronth. Gesellsch.* Schr. IV. p. 282. no. 39. t. 16. f. 15.

Phalaena N. (*Lunula*), spirilinguis cristata, alis deflexis, atro-purpureis, nebulosis, *lineola arcuata flava.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 46. no. 406. Phal. *Turca.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1406. Phal. *Turca.* Nom. *Linn.*

141. *Nictitans*, die *Weißniere.* *)

*Müller* l. c. p. 691. no. 141. die *Weißniere.*

*Abhandl.* der schwed. Akad. der Wiss. XXXI. p. 312. t. 10. f. 1. 2. 3.

Beschreibung der *Frühlingsrockenraupe.* (*Osbeck.*) **)

*Raupe* steckt bey Tage in der Erde, und bey Nacht beisst sie die Rockenhalmen dicht über der Erde ab.

*Linn.*

*) Diese vermisse ich wieder bey den *Wiener Entomologen.*

**) Es heisst daselbst p. 314 in der Note: *Linné* habe selbst versichert, es sey die wahre Ph. *Nictitans.* S. unter den Neuen No. 132. Ph. *Secalis.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 321. no. 1215. Phal. N. *oculea.*

Habitat in *Lucis.*

*Fabric.* S. E. p. 616. no. 112. N. *Oculea.*

Criſtata; alis *deflexis* ferrugineo - fuſcoque variis; *ſtigmate reniformi*, pallido.

*An?*

142. *Perſicariae*, die *Flöhkrauteule.*

*Müller* l. c. p. 692. no. 142. der *Sägerand.*

*Füeßl.* ſchweizer. Inſekt. p. 38. no. 725. Phal. *Perſicariae.*

Etwas *ſelten.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 308. no. 61. Ph. *Sambuci*, die *Fliedermotte.*

Schwarz, mit einigen hellern undeutlichern Zeichnungen, und einem weiſſen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

*Naturforſcher* IX. p. 128. no. 61. Ph. *Sambuci* (von *Rottemb.*).

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 174. t. 30. die glatte mattgrüne geſchuppte *Raupe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 71. F. *fleckichte Eulen.*

3) Raupen mit einer ſtumpfen Erhöhung.

No. 8. *Flöhkrauteulenraupe* (Polygoni Perſicariae); *Flöhkrauteule*, Ph. *Perſicariae.*

*Fabric.* S. E. p. 615. no. 106. NOCTUA *Perſicariae.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, viridis; linea dorſali alba; ſecundo ſegmento macula quadrata atra, cauda conica.

*Pupa* brunnea.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 157. no. 94.

*Pha-*

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis, ſuperioribus fuſcis, lineis undulatis, et *Omicro* albis; inferioribus cinereis.

L' *Omicron géographique.*

*Long.* 7. lign.

143. *α. Ludifica*, das *Naturſpiel.*

*Müller*, l. c. p. 692. no. 143. das *Naturſpiel.*

*Füeſsl.* ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 726. Ph. *Ludifica.* Bey uns *ſelten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 24. Ph. *Ludifica.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 280. no. 20. Phal. *Aprilina*, der *Seladon.*

Meergrün mit weiſſen Streifen, und irregulären ſchwarzen Zeichnungen, wie chineſiſche Buchſtaben.

— p. 555. mit *Kupfer.* f. 1. *Raupe;* f. 2. *Puppe;* f. 3. *Vogel.*

Beſchreibung einer ſehr bunten *Raupe* auf den Eichen, und der *Phaläne;* Ph. *Aprilina minor* (*Hufnagel*).

*Naturforſcher* IX. p. 113. no. 20. Ph. *Aprilina* iſt Linn. *Ludifica* (von *Rottemb.*).

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 649. no. 19. Ph. *Aprilina maior* *), der *kleine Seladon*, et no. 20. Ph. *Aprilina*, der *Seladon.*

*Sulzers* Geſch. der Inſ. p. 161. t. 22. f. 8. Ph. *Ludifica*, das *Naturſpiel.*

Die *Vorderflügel* iſabellfarb, gezähnt, mit vielen ſchwarzen Zügen; die *hintern* ſchwarzgrau

*) Hieraus ſind zwo beſondere Arten gemacht, da es doch nur eine, nämlich *Ludifica* L. iſt. Statt minor ſtehet durch einen Druckfehler maior, wie die deutſche Benennung, der *kleine* Seladon, beweiſet.

grau und weiſs. Die Schenkel der Vorderfüſse ſehr dicke, alle grau; das übrige der Füſse weiſs und ſchwarz.

*Wien. Schmetterl.* Nachtr. p. 311. zur Famil. E. no. 6. (4. 5.) *unbekannte Raupe* *); *grünweiſslichte ſchwarzgezeichnete Eule*, Ph. *Ludifica.*

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 614. no. 101. NOCTUA *Ludifica.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 44. no. 390. Ph. *Ludifica.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1405. Ph. *Ludifica.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. I. Mém. 3. p. 113. t. 5. f. 19-24.

*Chenille* verte, à trois lignes longitudinales jaunâtres, dont le corps eſt garni de quelques peu de poils longs et noirs.

— — p. 699. t. 5. f. 22. 23.

*Phalene* à antennes en filets, d'un brun presque noir à nuances blanchâtres, et à tache ovale d'un verd-brun, entourée de blanc et de noir.

— *Ueberſ.* I. 1 Qu. p. 88. t. 5. f. 19-24. **)

Eine grüne mit einigen langen ſchwarzen Haaren bewachſene *Raupe*, mit drey langen gelblichen Streifen.

— — 4 Qu. p. 122. t. 5. f. 22. 23.

Ein brauner, beynahe ſchwarzer *Nachtvogel* mit weiſslichen Schattirungen, fadenförmigen Fühlhörnern, und einem eyförmigen braungrünen Fleck, mit weiſs- und ſchwarzem Rande.

*Degeer*

*) Die Raupe iſt vom *Hufnagel* l. c. abgebildet; alſo nicht mehr unbekannt.

**) Ich nehme das hier zurück, was ich damals in der Anmerk. ſagte, es ſey *Aprilina* L. S. *Füeſsl.* Entomol. Magaz. II. p. 25.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 434. no: 6. *Phalene d' Avril.*

*Phalene* à antennes filiformes; à trompe et à corcelet huppé; à ailes rabatues d'un brun presque noir à nuances blanchâtres et brun-verdâtres avec une tache ovale d'un verd-brun à cercle blanc et noir.

— *Ueberſ.* II Th. 1 B. p. 317. no. 6. die *Aprilphaläne.* *)

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden braunen, beynahe ſchwarzen, weiſslich und braungrünlich ſchattirten Flügeln, mit einem eyförmigen grünbraunen Fleck, in einem weiſs- und ſchwarzen Zirkel.

β. *Minor*, die *kleinſte Art der Aprileule.* **)

*Füeſsl.* Magaz. der Entomol. II. p. 26. *Schäffers und Sepps* Eule, — ſcheint mir noch eine *dritte beſondere Art* zu ſeyn. (Füeſsl.)

*Gladbachs* neue Schmetterl. p. 22. t. 11. f. 1. 2. die *kleine Diana.*

*Schaeff.* Icon. t. 92. f. 3.

*Sepp* Nederl. Inſ. IV. p. 41. t. 9. f. 1-8. Vom *Ey bis zur Phaläne.*

De Vlinder de *Orion.*

144. *Af-*

*) Nachher hab ich eingeſehen, daſs die Hufnagelſche Aprilina die eigentliche *Ludifica* L. ſey, und *Sepp* die dritte kleinſte Art abgebildet habe.

**) Wenn die *Runica* der Wiener p. 70. F. No. 1. nicht aus einer glatten Raupe käme, ſo würde ich ſie für dieſe halten. An *Fabric.* Lichenis? S. unter den neuen Noct. no. 300.

144. *Affinis*, der *Italiänische Anverwandte.* *)

*Müller* l. c. p. 692. no. 144. der *Anverwandte.*
*Wien. Schmetterl.* p. 88. T. *Mordraupen; gewässerte Eulen.*
4) *Rothbraun.*
No. 11. *Aespenraupeneule* (Populi Tremulae); *Aespeneule.* Ph. *Affinis.*
*Fabric.* S. E. p. 609. no. 83. NOCTUA *Affinis.* Nom. *Linn.*

145. *Triptera*, der *portugiesische Dreyfleck.* **)

*Müller* l. c. p. 692. no. 145. der *Flügelfleck.*
*Fabric.* S. E. p. 609. no. 84. NOCTUA *Triptera.* Nom. *Linn.*

146. *Diffinis*, der *portugiesische Landsmann.* ***)

*Müller* l. c. p. 692. no. 146. der *Landsmann.*
*Wiener Schmetterl.* p. 88. T.
No. 10. *Feldulmeneulenraupe* (Vlmi campestris); *Feldulmeneule*, Ph *Diffinis.*
*Geoffr.* Inf. II. p. 164. no. 108.
*Phalaena* seticornis spirilinguis, albis roseo-purpureoque variegatis, superioribus macula duplici marginali alba.
Le *Nacarat.*
*Long.* 6 lign.

147. *Occulta*, der *kurze Unterflügel.*

*Müller* l. c. p. 693. no. 147. der *Deckflügel.*
*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 318. no. 1203. Phal. *Occulta.*
Inter Phalaenas *rusticas* maxima.

*Clerk*

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*
***) *Nicht abgebildet.*

*Clerk* Icon. t. 1. f. 6.

148. *Perſpicillaris*, die *Brilleneule.*

*Müller* l. c. p. 693. no. 148. die *Brille.*

*Füeßl.* ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 727. Ph. *Perſpicillaris*, die *Brille.*

Nicht ſelten auf den *Pappelbäumen.*

*Wien. Schmetterl.* p. 76. K. *Rieſelraupen*, Larvae *alboſparſae; holzfarbige Eulen*, Ph. N. *Lignicolores.*

No. 11. *Konradskrauteulenraupe* (Hyperici hirſuti); *Konradskrauteule*, Ph. *Perſpicillaris.*

*Clerk* Icon. t. 2. f. 3. Ph. *Polyodon.*

149. *Conſpicillaris*, der *Brillenbogen.*

*Müller* l. c. p. 693. no. 149. t. 22. f. 8. der *Brillenbogen.*

*Wiener Schmetterl.* p. 75. K. No. 5. *Wirbelkrauteulenraupe* (Aſtragali Onobrych.); *Wirbelkrauteule*, Ph. *Conſpicillaris.*

150. *Vmbratica*, die *Kappeneule.*

*Müller* l. c. p. 693. no. 150. der *Kappenträger.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 728. Ph. *Vmbratica*, der *Kappenträger.*

Nicht ſelten in den Gärten unter *Sallat* und anderem Gemüſe.

*Berlin. Magaz.* III. p. 280. no. 21. Ph. *Vmbratica*, der *weiſſe Mönch.*

Weiſsgrau, mit ſchmalen langen und ſpitzigen Flügeln, und einer Mönchskappe.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 56. no. 153. et p. 74. no. 211. Ph. *Vmbratica*, der *Kappenträger;* der *graue Mönch.*

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 153. t. 25. die glatte, schwarzbraune und mit pomeranzengelben Flecken gesprenkelte *Raupe.*

*Wiener Schmetterl.* p. 74. I. *kappenhalsigte Eulen.* 3) Braun mit Röthlichgelb die *Raupen.* No. 8. *Hasenkohleulenraupe* (Sonchi oleracei *laevis*); *Hasenkohleule*, Ph. *Vmbratica.*

*Fabric.* S. E. p. 618. no. 118. NOCTUA *Vmbratica.*

*Larva* nuda, nigricans, trifariam rubro-punctata.

*Pupa* brunnea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 45. no. 395. Ph. *Vmbratica.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1408. Phal. *Vmbratica.* Nom. *Linn.*

151. *Exsoleta*, die *Aspekteneule.*

*Müller* l. c. p. 693. no. 151. das *Moderholz.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 38. no. 729. Ph. *Exsoleta*, das *Moderholz.*

Auf der Melde; *Erbsenfeldern* etwas selten.

— Magaz. der Entomol. II. p. p. 27. Phal. *Exsoleta.*

Die Nahrung der *Raupe* gemeines *Gras* (Chorh. *Meyer*).

*Frisch* Ins. V. p. 30. no. 11. 1 Pl. t. 11. Von der grünen *Meldenraupe* mit schwarz eingefassten weissen Spiegelpunkten auf jedem Gelenke auf dem Rücken — die *Aspektenraupe.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 282. no. 22. Phal. *Exsoleta*, die *Aspektenmotte.*

Mausefarbig, schwarzgrau gezeichnet, und schattirt.

*Maders*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 31. no. 78. p. 56. no. 152. Phal. *Exſoleta*, *Aſpektenmotte; Moderholz.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 145. t. 24. die groſse, glatte, grüne und auf unterſchiedliche Arten gezeichnete *Meldenraupe.*

*Martini* allgem. Geſch. der Nat. III. p. 398. t. 104. Ph. *Exſoleta*, die *Aſpektenmotte; Moderholz.*

*Wien. Schmetterl.* p. 75. K. No. 1. *Scharteeulenraupe* (Serratulae tinct. et arv.); *Scharteeule*, Ph. *exſoleta.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 360. Ph. *Exſoleta.*

*Fabric.* S. E. p. 617. no. 116. NOCTUA *exſoleta.* Criſtata, alis lanceolatis, convolutis, fuſcocinereoque nebuloſis, punctis quatuor marginalibus albis.

*Larva* nuda, viridis, punctata: linea laterali albida.

*Pupa* nuda, brunnea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 45. no. 396. Phal. *exſoleta.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1409. Phal. *exſoleta.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 401. no. 2. t. 7. f. 1-4. *Phalene bois ſec.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe; à ailes allongées croiſées d'un gris couleur du bois, mais d'un brun de caffé le long du dos; à corcelet huppé avec trois pointes en devant.

— *Ueberſ.* II. Th. I B. p. 290. no. 2. t. 7. f. 1-4. das *dürre Holz.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, länglicht-ovalen, gekreuzten, holzgrauen, längſt dem Rücken aber koffeebraunen

Flügeln, und einem Rückenkamm vorne mit drey Spitzen. *)

*Merian.* Eur. t. 108.

152. *Putris*, das *Faulholz.* **)

*Müller* l. c. p. 694. no. 152. das *Faulholz.*
*Wien. Schmetterl.* p. 75. K. No. 4. *Unbek. Raupe; weißlichte braungerändelte Eule*, Ph. *Putris.*
*Fabric.* S. E. p. 618. no. 119. NOCTUA *Putris.* Nom. *Linn.*

Statura N. *Verbasci*, at multo brevior. *Thorax* antice pallide testaceus.

153. *Verbasci*, die *Wollkrauteule.*

*Müller* l. c. p. 694. no. 153. die *Wollkrautseule.*
*Füeßl.* schweiz. Inſ. p. 38. no. 730. Ph. *Verbasci*, die *Wollkrautseule.*

Auf dem *Wollkraut* häufig.

— Magaz. der Entomol. II. p. 28. Phal. *Verbasci.*

1) Die jungen *Raupen* bedienen sich im Gehen der 2 vordern Paar Bauchfüsse nicht, den *Spannmessern* ähnlich.
2) In der Jugend und Alter rollen sie sich stark zusammen, und so, auf dem Rücken liegend, bewegen sie sich in die Höhe und Ferne, *sprungweise.*
3) Ein Paar Jahr nach einander sind viele durch eine ungeheure *Brut kleiner Würmer* verdorben, die nach ihrem Tode einen unerträg-

*) P. 292. erzählet der V. eine sonderbare Begebenheit; dass diese *Aspektenraupe* die Raupe vom Pap. *Ramni* (Zitronvogel) in der Schachtel aufgefressen habe.

**) *Nicht abgebildet.*

träglichen Geruch von ſich gegeben haben (Chorh. *Meyer*).

*Friſch* Inſ. VI. p. 22. no. 9. 2 Pl. t. 9. von der *Wullkrautraupe.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 282. no. 23. Ph. *Verbaſci*, der *braune Mönch.*

Hellbraun, mit einem dunkelbraunen Rande und einer *Mönchskappe.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 14. no. 14. Ph. *Verbaſci*, der *braune Mönch;* die *Wollkrauteule.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 142. t. 23. die grünlichweiſſe ſchwarzgefleckte *Wollkrautraupe.*

*Wiener Schmetterl.* p. 73. I.

2). *Raupen* mit Schwarz und Gelb.

No. 4. *Wollkrauteulenraupe* (Verbaſci Thapſi); *Wollkrauteule*, Ph. *Verbaſci.*

La Chenille du bouillon blanc. *Réaum.*

*Bonnets* und anderer etc. Abhandl. aus der Inſektologie p. 97. no. 17.

Die ſchöne *Raupe* auf dem *Wollkraut* — hat den beſondern Theil, nämlich das *Fleiſchhorn*, unter dem erſten Ringe zwiſchen der Unterlippe und dem erſten Paar Füſsen.

*Bekm.* Epit. S. L. p. 166. no. 153. Ph. *Verbaſci.* Nom. *Linn.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 414. Ph. *Verbaſci*, der *Wollkrautvogel.*

*Schaeff.* Icon. t. 24. f. 6. 7.

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 168. no. 25.

*Phalaena* media; alis exterioribus cinereis, lineis et maculis nigris, varie depictis.

— p. 352. no. 31.

*Eruca* Verbaſcum depaſcens cinerea, pulchre variegata.

*Scop.* Ent. carn. p. 213. no. 521. Phalaena *Verbasci.*
*Long.* lin. 9. Lat. 3¾.
*Lingua* corporis longitudine; *thorax* crista duplici; *alae* subdentatae, albo-cervinae, margine fusco.

*Fabric.* S. E. p. 618. no. 117. NOCTUA *Verbasci.*
Cristata, alis deflexis, dentato-erosis, margine laterali fusco, immaculato.
*Larva* nuda, cinerea, flavo-nigroque punctata.
*Pupa* folliculata, lutea, stigmatibus nigris.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 45. no. 397. Phal. *Verbasci.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1409. Phal. *Verbasci.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 158. no. 96.
*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis deflexis fusco-cinereis, *superioribus* fuscis longitudinaliter striatis.

*Biblioth.* Reg. Paris. p. 32. f. *omnes.*

154. *l album*, das *weisse l.*

*Müller* l. c. p. 694. no. 154. das *weisse L.*

*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 38. no. 731. Ph. *l album*, das *weisse L.*
Bey uns *selten.*

*Berlin Magaz.* III. p. 294. no. 42. Ph. *Comma*, der *weisse Haken.*
Hellgelblichgrau, mit etwas Dunkelgrau schattirt; die *Oberflügel* der Länge nach sehr fein gefurcht, in deren Mitte ein weisser Strich mit einem Haken.

*Naturforscher* IX. p. 117. no. 42. Ph. *Comma* ist des *Linn. l album* (von *Rottemb.*).

Gle-

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 745. no. 44. Ph. *Comma*, der *weisse Haken*.

*Wien. Schmetterl.* p. 85.

2) Ohne Queerstriche.

No. 9. *Hundsribbeneulenraupe* (Plantaginis lanceolatae); *Hundsribbeneule*, Ph. *l album*.

*Fabric.* S. E. p. 606. no. 66. NOCTUA *l album*.

Cristata, grisea, alis incumbentibus; anticis *l albo* notatis.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1390. Ph. *l album*.

Elinguis? cristata, alis pallide luteis, superioribus nebulosis: disco *linea nivea uncinata*.

*Schaeff.* Icon. t. 92. f. 4.

155. *Exclamationis*, das *Verwunderungszeichen*.

*Müller*, l. c. p. 695. no. 155. das *Verwunderungszeichen*.

*Füeßl.* schweizer. Insekt. p. 38. no. 732. Ph. *Exclamationis*, das *Verwunderungszeichen*.

*Berlin. Magaz.* III. p. 298. no. 48. Ph. *Clavus*, das *Schlüsselloch*.

Braun, grau, mit einem dunkelbraunen *nierenförmigen* und einem *nagelförmigen* Fleck, so zusammen ein *Schlüsselloch* vorstellt.

*Naturf.* VIII. p. 109. und IX. p. 119. no. 48. Ph. *Exclamationis* (von *Rottemb.*).

*Wien. Schmetterl.* p. 80. N. *Erderaupen*, Larvae *Terricolae*; *gemeine Eulen*, Ph. N. *Rusticae*.

1) mit *schwarzem Halskragen*.

No. 2. *Kreuzwurzeulenraupe* (Senecionis vulgaris); *Kreuzwurzeule*, Phalaena *Exclamationis*.

*Pontopp.* N. G. v. Dännem. p. 220. no. 32. Ph. *exclamationis* t. 17.

Oben auf dem Flügel einen ſchwarzen Strich mit einem Punkt darunter, wovon es den Namen hat.

*Fabric.* S. E. p. 605. no. 65. NOCTUA *Exclamationis.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1403. Phal. *Exclamationis.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 161. no. 101.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis; alis deflexis, ſuperioribus ferrugineo-cinereis; macula duplici longa rotundaque nigra; inferioribus albidis. La *double tache.*

*Long.* 8. lign.

156. *Comma*, das *weiſſe Häklein.* *)

*Müller* l. c. p. 695. no. 156. das *Häklein.*

*Füeßl.* ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 733. Ph. *Comma*, das *Häklein.*

*Wiener Schmetterl.* p. 76. K. *Rieſelraupen, holzfarbige Eulen.*

No. 9. *Unbekannte Raupe. Grauſtriemigte ſchwarzgezeichnete Eule.* Ph. *Comma.*

*Neuer Schaupl.* der Nat. II. p. 196. Ph. *Comma.*

*Naturforſcher* IX. p. 117. no. 42. Ph. *Comma* Hufnag. L *album* et Ph. *pallens* L. viel ähnliches (von *Rottemb.*).

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 45. no. 399. Ph. *Comma.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1411. Ph. *Comma.* Nom. *Linn.*

157. *Plecta*, der *weiſſe Dickrand.*

*Müller* l. c. p. 695. no. 157. der *Dickrand.*

*Füeß-*

*) *Nicht abgebildet.*

*Füeßlins* schweizer. Insekt. p. 38. no. 734. Phal. *Plecta.*

Bey uns etwas selten auf *Linden.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 48. no. 131. Phal. *Plecta*, der *Dickrand.*

*Kleemanns* Beytr. I. p. 189. t. 23.

Die einsame, glatte, schlechtgrüne und auf dem Tobackskraut sich aufhaltende *Raupe* — vom *Ey* an.

*Naturforscher* IX. p. 120. no. 49. Phal. *Ignobilis* Hufnag. (von *Rottemb.*)

*Berlin. Magaz.* III. p. 300. no. 49. Ph. *Ignobilis*, der *Springer.*

Dunkelbraun, mit vielen hellbraunen Zeichnungen, und einem *nierenförmigen Fleck.*

*Wien. Schmetterl.* p. 77. M.

2) mit schwarzen Fleckchen im Mittelraume.

No. 6. *Blindlatticheulenraupe* (Lactucae sativae); *Blindlatticheule*, Ph. *Plecta.*

*Fabric.* S. E. p. 605. no. 63. NOCTUA *Plecta.*

Alis incumbentibus, fuscis; *margine* crassiori albo.

*Larva* viridis, capite brunneo.

*Pupa* folliculata, atra.

158. *Derasa*, der *Wischflügel.*

*Müller* l. c. p. 695. no. 158. der *Wischflügel.*

*Füeß*. schweiz. Ins. p. 38. no. 735. Ph. *Derasa*, der *Achatflügel.*

Bey Zürch und Bern; aber *selten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 85. §. IV. no. 2. Ph. *Derasa*, der *Achatvogel.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 400. no. 74. Ph. *Pyritoïdes*, der *Feuerstein.*

Die

Die Grundfarbe olivenfarbig, grau, wie ein durchsichtiger Feuerstein, mit rostfarbigen weissen und dunkeln Flecken und Zeichnungen.

*Berlin. Magaz.* p. 424. K. Ausserordentlich selten.

— — p. 560. Beschr. einer seltenen und besonders schönen *Phaläne.* Ph. *Pyritoïdes.* (*Hufnagel.*) Beygef. Kupfert. f. 4. *Vogel.*

*Naturforsch.* II. p. 16. V. t. 1. f. 7. (*Kühn.*)

— IX. p. 133. no. 74. Ph. *Pyritoïdes* ist *Derasa* L. (v. *Rottemb.*)

*Wien. Schmetterl.* p. 87. T. *Mordraupen; gewässerte Eulen.*

1) die Oberflügel gelblicht.

No. 2. *Himbeereulenraupe* (Rubi Idaei); *Himbeereule.*, Ph. N. *Derasa.*

*Fabric.* Syst. E. p. 609. no. 80. NOCTUA *Derasa.* Nom. *Linn.*

159. *Gothica*, die *gothische Schrifteule.*

*Müller* l. c. p. 696. no. 159. die *gothische Schrift.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 38. no. 736. Ph. *Gothica.* Bey uns etwas *selten.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1412. Phal. *Gothica.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Icon. t. 1. f. 1.

160. *Pinastri*, die *Fichteneule.*

*Müller* l. c. p. 696. no. 160. der *Buckel.*

*Wien. Schmetterl.* p. 82. O. *Jaspisfarbige Eulen.*

1) Die Oberflügel schwärzlich mit gelber Zackenlinie.

No. 1. *Föhreneulenraupe* (Pini Sylvestris); *Föhreneule*, Ph. *Pinastri.*

*Fischers* N. G. von Livl. p. 153. no. 365. Ph. *Pinastri*, der *Buckel.*

*Ber-*

*Berlin. Magaz.* III. p. 300. no. 50. Phal. *Dypterigia*, die *Flügelmotte.*

Kohlschwarz, mit einer grauen Figur auf jedem Oberflügel, so dem Flügel von einem Vogel ähnlich ist.

*Naturforscher* IX. p. 120. no. 50. Ph. *Dypterigia* ist Ph. *Pinastri* L.

Das beste *Unterscheidungszeichen* die vom *Hufnagel* auf den Oberflügeln am Unterrande in angulo ani angegebene *graue flügelförmige Figur.* (von *Rottemb.*)

*Linn.* Syst. Nat. ed. 10. p. 516. no. 108. Ph. *Scabriuscula.*

*Clerk* Icon. t. 1. f. 8.

161. *Strigilis*, der *Dreyring.*

*Müller* l. c. p. 696 no. 161. der *Dreyring.*

*Clerk* Icon. t. 9. f. 6.

162. *C nigrum*, das *schwarze C.*

*Müller* l. c. p. 696. no. 162. das *schwarze C.*

*Wiener Schmetterl.* p. 77. M.

2) mit schwarzen Fleckchen im Mittelraume.

No. 7. *Spinateulenraupe* (Spinaciae oleraceae); *Spinateule*, Ph. *C nigrum.*

*Neuer Schaupl.* der Nat. II. p. 2. Ph. *C nigrum.*

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 157. Le *C.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 122. no. 1413. Phal. *C nigrum.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Icon. t. 1. f. 3.

163. *Brassicae*, die *Kohleule.*

*Müller* l. c. p. 696 no. 163. die *Kohleule.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 38. no. 737. Ph. *Brassicae*, die *Kohleule.*

*Füeßl.*

*Füeſsl.* Magaz. der Entom. II. p. 29. Ph. *Braſſicae.*

Die *Raupen* kommen mit verſchiedenen Farben, weiſs und grau, aus den Eyern — ſehen nach jeder Häutung anders aus — häuten ſich fünfmal — gehen faſt wie *Spannraupen* — keine friſst bey Tage — die *Puppen* arbeiten ſich aus der Erde heraus. (Chorh. *Meyer.*)

*Berlin. Magaz.* III. p. 282. no. 24. Ph. *Braſſicae*, die *Kohlmotte.*

Glänzend, blaſs, gelblich, grau marmorirt, mit weiſslichgrauen Flecken, und ſchwarzen Haken auf den Oberflügeln.

*Friſch* Inſ. X. p. 19. no. 16. 3 Pl. t. 16. von der erdfarbnen *Erdraupe* mit drey gelben Strichen auf dem Halskragen oder Nackenſchild.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 169. t. 29. die ſchädliche, glatte, braune *Krautraupe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 81. N. *Gemeine Eulen.*

4) mit zweydeutiger Zeichnung.

No. 21. *Kohleulenraupe* (Braſſicae oleraceae); *Kohleule*, Ph. *Braſſicae.*

*Fiſchers* N. G. von Livl. p. 153. no. 365. Phal. *Braſſicae*, die *Kohleule.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 321. Phal. *Braſſicae*, der *Krautvogel*, der *Herzwurm.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 46. no. 403. Phal. *Braſſicae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1414. Phal. *Braſſicae.* Nom. *Linn.*

*Othon. Fabric.* Faun. Groenl. p. 194. no. 146. Phal. *Braſſicae.* Nom. *Linn.*

Mea *puncta 4 alba marginalia* habebat.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 438. no. 9. Ph. *Braſſicae; Phalene brune-griſeâtre du Chou.*

*Phalene* à antennes filiformes; à trompe et à corcelet huppé; à ailes rabatues d'un brun-grisâtre obscur à rayes ondées noirâtres avec une tache grise, une tache mêlée de blanc et une raye blanchêatre.

*Degeer Uebers.* II Th. IB. p. 320. no. 9. die *braungrauliche Kohlphaläne*, der *Ohrvogel.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel und Rückenkamm, und niederhangenden dunkelbraungraulichen Flügeln, mit gewässerten schwärzlichen Streifen, einem grauen und einem weissmelirten Fleck, nebst einer weisslichen Streife. *)

*Goed.* Belg. Tom. III. t. F.

*List. Goed.* p. 79. f. 29.

*Merian.* Eur. t. 81.

*Albin.* Inf. t. 78. 79. no. 45. e f g h.

*Réaum.* Inf. I. t. 40. f. 16. 17. t. 41. f. 1. 2. 3.

164. *Rumicis*, die *Sauerampfereule.*

*Müller* l. c. p. 697. no. 164. die *Sauerampfereule.*

*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 39. no. 738. Ph. *Rumicis.*

— Mag. der Entomol. II. p. 31. Ph. *Rumicis.*

*Raupen* fressen *Boretsch* (Borrago) und *Weidenblätter* (Chorh. *Meyer*).

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 57. no. 155. Phal. *Rumicis*, die *Sauerampfermotte.*

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 161. t. 27. die schwarzbraune, buntgesprengte, rothhaarige *Raupe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 67. B.

2) Bey den Raupen die Haare auf Knöpfchen.

No.

*) Mittel dagegen p. 321. 322. *Anmerk. Preuß. Samml.* I. p. 560. II. p. 1180. 1187. *Berlin. Magaz.* III. p. 3. 19.

No. 3. *Ampfereulenraupe* (Rumicis Crispi etc.); *Ampfereule*, Ph. *Rumicis*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 45. no. 401. Phal. *Rumicis*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1415. Phal. *Rumicis*. Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. I. Mém. 5. p. 185. t. 9. f. 14-22.

*Chenille* velue, noire, à dix tubercules, garnie ſur le dos de taches rougeâtres et blanches, et vers les côtés d'une raye blanche ou couleur d'orange. Elle ſe trouve ſur l'*Aune*, le *Bouleau* et le *Saule*.

— — p. 699. t. 9. f. 22.

*Phalene* à antennes en filets; cendrée, à taches et nuances noires et blanchâtres, et à jambes picotées de noir.

— Tom. II. Part. I. p. 411. no. 4.

*Phalene cendrée noirâtre à deux taches blanches.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un cendré noirâtre avec des rayes ondées noires, et deux taches blanches au bord intérieur.

— *Ueberſ.* I. 1 Quart. 5te Abh. p. 137. t. 9. f. 14-22.

Die rauche, ſchwarze, auf dem Rücken röthlich und weiſsgefleckte und an den Seiten weiſs oder orangegelb geſtreifte, auf den *Erlen*, *Birken* und *Weiden* lebende *Raupe*, mit zehn Buckeln.

— — 4 Qu. p. 122. t. 9. f. 22.

Ein aſchgrauer *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, ſchwarz und weiſsgefleckt, und ſchattirt, und ſchwarz geſprenkelten Füſsen.

*Degeer*

*Degeer* Inſ. II Th. I B. p. 298. no. 4.

Die ſchwärzlich aſchgraue *Phaläne* mit zween weiſſen Flecken.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und ſchwärzlich aſchgrauen niederhangenden Flügeln, mit zwo ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und zween weiſſen Flecken am Innenrande.

*Réaumur* Inſ. I. t. 15. f. 6. t. 37. f. 11. Tom. II. t. 34. f. 8. La *Chenille.*

165. *Oxyacanthae*, die *Weißdorneule.*

*Müller* l. c. p. 697. no. 165. die *Hochſchwanzeule.*

*Füeßl.* ſchweizer. Inſ. p. 39. no. 739. Phal. *Oxyacanthae.*

Auf dem *Schlee-* und *Weißdorn*, etwas ſelten.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 14. no. 15. Phal. *Oxyacanthae*, die *Hochſchwanzeule;* der *Buchfink.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 284. no. 25. Ph. *Oxyacanthae*, der *Buchfink.*

Theils hell, theils dunkelgrau, theils blaſsgrau, mit einem groſsen weiſslichen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 185. t. 33. die glatte, hellgraue und braun gerautete *Baumraupe.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 820. no. 13. Ph. *Oxyacanthae*, der *Buchfink.*

*Wien. Schmetterl.* p. 70 F.

2) Raupen mit Spitzen am Hinterleibe.

No. 3. *Weiſsdorneulenraupe* (Crataegi Oxyacanthae); *Weiſsdorneule*, Ph. *Oxyacanthae.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 391. Ph. *Oxyacanthae.*

*Fabric.* S. E. p. 611. no. 90. NOCTUA *Oxyacanthae.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, albo-nigroque varia, cauda gibba.

*Pupa* folliculata, flava.

166. *Vaccinii*, die *Heidelbeereule.* *)

*Müller* l. c. p. 697. no. 166. die *Heidelbeereule.*

*Wien. Schmetterl.* p. 85. R. *Halsſchildraupen*, Larvae *Scutellatae; röthlichbraune Eulen*, Phal. N. *Badiae.*

No. 2. *Preuſelbeereulenraupe* (Vaccinii Vitis Idaeae); *Preuſelbeereule*, Ph. *Vaccinii.*

167. *Myrtilli*, die *Sumpfheideeule.*

*Müller* l. c. p. 698. no. 167. die *Sumpfheideeule.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 492. no. 37. Ph. *Ericae*, die *Waldmotte.*

Die *Oberflügel* braunroth mit weiſſen geſchlängelten Queerlinien; die *Unterflügel* an der Einlenkung oraniengelb, am Rande ſchwarz.

*Naturforſcher* IX. p. 114. no. 37. Ph. *Ericae* iſt Ph. *Myrtilli* L. (v. *Rottemb.*)

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 65. no. 185. Phal. *Myrtilli*, die *Sumpfheideneule.*

*Röſels* Inſektenbel. IV. p. 85. t. 11. f. A B C.

Das ausnehmend zierliche, grün und weiſsgeſcheckte *Räuplein* der Waldheyde.

*Wien. Schmetterl.* p. 79. M.

3) mit ſchwarzen Punkten am Auſsenwinkel, und gelben ſchwarz geränderten Unterflügeln.

No. 23. *Heidelbeereulenraupe* (Vaccinii Myrtilli); *Heidelbeereule*, Ph. *Myrtilli.*

*Gle-*

*) *Nicht abgebildet.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 411. no. 1. Ph. *Ericae*, die *Waldmotte.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 385. Ph. *Myrtilli.*

*Fabric.* S. E. p. 619. no. 121. NOCTUA *Myrtilli.*

Criſtata; alis deflexis, ferrugineis, albo-maculatis; poſticis luteis; faſcia lata nigra, ſubmarginali.

*Larva* nuda, viridis, dorſo quinque tuberculato, capite coeruleo.

*Pupa* brunnea, ſtigmatibus albis.

*Othon. Fabric.* Faun. Grönl. p. 194. no. 147. Phal. *Myrtilli.* Nom. *Linn.*

Paucas vidi in *Vaccinio uliginoſo.*

168. *Plebeja*, die *Pöbeleule.* *)

*Müller* l. c. p. 698. no. 168. die *graue Eule.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. no. 1210. Ph. *Plebeja* (*genaue Beſchreibung*).

169. *Hepatica*, die *leberfarbige Eule.*

*Müller* l. c. p. 698. no. 169. die *Leberfarbe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 83. O.

4) Rothbraun.

No. 16. *Unbekannte Raupe. Leberbraune, düſter- und gelbgemiſchte Eule*, Ph. *Hepatica.*

*Cathol.* H. p. 120. Ph. *Hepatica.*

*Clerk* Icon. t. 8. f. 3.

170. *Polyodon*, die *vielzähnigte Eule.* **)

*Müller* l. c. p. 698. no. 170. der *Vielzahn.*

*Wien. Schmetterl.* p. 72. H. No. 1. *Birkeneulenraupe* (Betulae albae); *Birkeneule*, Ph. *Polyodon.*

*Fabric.* Syſt. E. p. 616. no. 109. NOCTUA *Polyodon.*



*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Cristata, alis deflexis, dentatis, nebulosis; striga postica dentata alba.

Alae *subtus* cinereae, arcu punctoque fuscis.

171. *Oleracea*, die *Krauteule.*

*Müller* l. c. p. 698. no. 171. der *Wurzelnager.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 39. no. 740. Phal. *Oleracea*, die *Krauteule.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 284. no. 26. Ph. *Oleracea*, die *Krautmotte.* Rothbraun, mit einem *pomeranzengelben Fleck* in den Oberflügeln, und einem weissen Streif.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 31. no. 76. Ph. *Oleracea.* *)

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 183. t. 32. die *kleinere Wasserpfefferraupe.* **) p. 75. no. 214. die *kleinere Wasserpfefferraupe*, Ph. *Oleracea.*

*Frisch* Ins. VII. p. 29. no. 21. 3 Pl. t. 21. von der schwarzen *Meldenraupe* mit dem gelben Seitenstreif.

*Wien. Schmetterl.* p. 83. O.

4) Rothbraun.

No. 19. *Kopflatticheulenraupe* (Lactucae sativae capitatae); *Kopflatticheule*, Ph. *Oleracea.*

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 15. Phal. *Oleracea*, *Krauteule.*

*Naturforsch.* VII. p. 124. Ph. *Oleracea.*

*Bekm.*

*) Hier wird die *Raupe* die hellgraue und braungerautete *Baumraupe* genannt. Eine Verwechselung mit der folgenden Oxyacanthae im *Rösel.*

**) Nach der *Linnéischen* Beschr. besonders in der Faun. Suec. ed. 2. no. 1197. trifft alles aufs genaueste zu, besonders die beyden pommeranzengelben Flecke auf den Oberflügeln, und die beyden weissen Ziekzacklinien am Hinterrande.

*Bekm.* Epit. Syst. L. p. 166. no. 171. Phal. *Oleracea.* Nom. *Linn.*

*Onomat* hist. nat. P. 6. p. 391. Ph. *Oleracea.*

*Raj.* Hist. Inf. p. 166. no. 21.

*Phalaena* alis exterioribus atro-rubentibus, cum lineola alba prope imum marginem transversa, duos cuspides ad ipsum marginem emittente.

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 157. no. 67. *Phalene de laitue.*

*Fabric.* Syst. E. p. 613. no. 97. NOCTUA *oleracea.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, livida, nigro-punctata; linea dorsali fusca, laterali alba.

*Pupa* nuda, nigricans.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1416. Ph. *Oleracea.* Nom. *Linn.*

β. *Barbata*, der *Haarafter* *).

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2290.

*Phalaena* seticornis spirilinguis alis deflexis ferrugineo-cinereis; *maculis alba flavaque;* ano barbato ferrugineo.

Smolandis *Askepiesk.*

In *Urtica*, *Spinacia*, *Atriplice*, frequens aestate in domibus, lucentibus candelis se ipsam cremans.



*) Ohnerachtet diese *Eule* mit der Oleracea viel ähnliches hat, so ist es doch nicht die nämliche, obgleich Hr. Degeer l. c. dabey den *Frisch und Rösel* angeführt hat. *Linné* hat sie durch seine genaue Beschreibungen in der Faun. Suec. ed. 2. standhaft unterschieden. Dahin gehöret besonders das: maculis *alba flavaque ano barbato ferrugineo.* Ich habe sie daher gleich als eine Abänderung der Oleraceae unterordnen wollen.

*Descr.* Alae *posticae* lineola alba: maculae duae obsoletae; *anterior alba*, *posterior flava*. *Anus* amplissimus, 3 valvis, *monstrosissimus*, barba rufa tectus. Alae *superiores* ferrugineo-nigrae, maculis et lineolis obsoletis albidis. Alae *subtus* pallidae puncto nigricante in medio. *)

*Raj.* Hist. Ins. p. 165. no. 20.

*Phalaena* media, corpore brevi crasso, alis exterioribus e pulvereo rubentibus, maculis nigris variis.

*Degeer* Ins. Tom. II. Part. I. p. 420. no. 12. t. 7. f. 17. *Chenille* rase verte ou brune avec des points noirs et blancs, et une bande jaune de chaque côté.

*Phalene* rousse *à ligne ondée blanche*.

*Phalene* à antennes filiformes à trompe; à ailes rabatues d'un brun roussâtre avec deux taches, l'une blanche et l'autre jaune, et une ligne ondée blanche.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 305. t. 7. f. 17.

Die glatte grüne, oder braune *Raupe*, mit schwar-

*) Dies alles trifft von der *Röselschen* und wahren *oleracea* L. nicht zu. Von dieser heisst es Faun. Suec. ed. 2. p. 317. no. 1197. *Descr.* Fasciculus duplex thoracis a tergo: altero ad basin thoracis gibbo, altero ad apicem. *Phalaena tota fusca* est, sed in medio *alae superioris* versus marginem crassiorem *duae maculae pallidae*, quarum prior rotunda, posterior reniformis. Linea alba intra marginem posticum duplici dente exiens. Alae *inferiores* cinereae. *Anus* barbatus.

Das vom *Linné* bey Phal. *Oleracea* gesetzte Zitatum: *Frisch* VII. p. 29. t. 21. stehet auch bey dieser zwoten Abänderung in der Faun. Suec. ist aber richtiger jene, als diese. Wir haben diese letztere *Barbatam* wegen des ausserordentlich bebärteten Afters genennet.

schwarzen und weissen Punkten, und einer gelben Binde auf jeder Seite.

No. 12. die *braunröthliche Phaläne mit der geflammten weissen Linie.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, und braunröthlichen, niederhangenden Flügeln, mit zween Flecken, einem weissen und gelben, und einer weissen gewässerten Linie.

172. *Pisi*, die *Erbseneule.*

*Müller* l. c. p. 699. no. 172. der *Hülsenfresser.*

*Füeßl.* schweizer. Insekt. p. 39. no. 741. Ph. *Pisi*, die *Hülsenmotte.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 32. Ph. *Pisi.*

*Raupen* fressen auch andere Gewächse —

— haben viele *Zwirnwürmer.* (Chorh. *Meyer.*)

*Berl. Mag.* III. p. 284. no. 27. Ph. *Pisi*, die *Erbsmotte.*

Rothbraun, bisweilen rostfarbig grau, mit einigen blassschwefelgelben Flecken und schmalen Queerstreifen.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 1011. no. 3. Ph. *Pisi*, die *Erbsmotte.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 76. no. 217. Phal. *Pisi;* die *Erbsmotte*, der *Hülsenfresser.*

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 275. t. 52. Die schöne rothbraune, mit vier gelben bandförmigen Streifen, einem fleischfarbigen Kopf und dergleichen Füssen gezierte *Ritterspornraupe.*

*Wiener Schmetterl.* p. 83. O.

4) Rothbraun.

No. 14. *Erbseneulenraupe* (Pisi sativi); *Erbseneule*, Ph. *Pisi.*

*Fischers* N. G. von Livl. p. 154. no. 367. Ph. *Pisi*, der *Hülsenfresser.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 397. Ph. *Piſi*, der *Erbſenvogel.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 160. no. 10.

*Phalaena* mediae magnitudinis, alis oblongis, e fuſco rubentibus, nigro et albo variegatis.

*Fabric.* S. E. p. 610. no. 88. NOCTUA *Piſi.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, ferruginea; lineis quatuor flavis; capite incarnato.

*Pupa* fuſca, inciſuris ſanguineis.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 46. no. 404. Ph. *Piſi.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1417. Phal. *Piſi.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 440. no. 10. *Phalene rouſſe à raye blanche en Ziczac.*

*Phalene* à antennes filiformes à trompe et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun rouſſâtre à taches et rayes brunes, noirâtres et griſes, avec une raye ondée blanche proche du bord poſtérieur.

— *Chenille* raſe brune ou verdâtre avec quatre rayes longitudinales jaunes de Citron.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 322. no. 10. die *braunröthliche Phaläne mit der weiſſen Zikzakſtreife.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden braunröthlichen Flügeln, mit braunen, ſchwärzlichen und grauen Flecken und Streifen, nebſt einer weiſſen gewäſſerten Streiſe dicht am Hinterrande.

Die *Raupe* glatt, braun oder grünlich, mit vier längſt herunterlaufenden zitrongelben Streifen.

173. *Atriplicis*, die *Meldeneule.*

*Müller* l. c. p. 699. no. 173. der *Meldensauger.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 286. no. 29. Ph. *Atriplicis*, die *Meldenmotte.*

Braun, mit gelbgrünen Flecken, in den *Oberflügeln* ein hellokergelber Fleck.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 58. no. 157. Phal. *Atriplicis*, die *Meldenmotte.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 177. t. 31. die glatte, hellbraune, dunkelgeſtreifte und weiſsgeſprenkelte *Raupe*, auf dem *Flöhkraut* oder *Waſſerpfeffer.* *)

*Wiener Schmetterl.* p. 82. O.

3) Grüngemiſcht.

No. 10. *Meldeneulenraupe* (Atriplicis patulae); *Meldeneule*, Ph. *Atriplicis.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 318. Ph. *Atriplicis*, der *Meldenvogel.*

*Cathol.* A. p. 586. Phal. *Atriplicis.*

*Fabric.* S. E. p. 611. no. 91. NOCTUA *Atriplicis.* Nom. *Linn.*

*Larva* nuda, rufeſcens, albo-punctata lineaque dorſali fuſca.

*Pupa* brunnea.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 159. no. 97. **)

Le *Volant doré.*

*Long.* 9. lign.

174. *Praecox*, die *rothgeſäumte Eule.*

*Müller* l. c. p. 699. no. 174. der *Rothſaum.*



*) Den *Linneiſchen* Karakter der Oberflügel: Lituram flavam *bifidam*, hat *Röſel* ſehr gut ausgedrückt.

**) Die Beſchreibung im *Geoffr.* aus der Faun. Suec. ed. 1. no. 875. gehöret zu *Chryſitis* L. ingleichen das Citatum *Raj.* p. 182. no. 45.

*Berlin. Magaz.* III. p. 286. no. 30. Phal. *Praecox*, die *Parallelmotte.*

*Seladongrün*, mit ſchwarzen abgebrochenen Strichen und weiſslichen Flecken; der *Hinterrand roſtfarbig.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 20. Phal. *Praecox*, der *Rothſaum;* die *Parallelmotte.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 273. t. 51. die grünliche, grau- und oraniengelb gefärbte *Raupe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 82. O.

3) Grüngemiſcht.

No. 12. *Unbekannte Raupe; Blaſsgrüne braungeränderte Eule*, Ph. *Praeceps.* *)

*Fabric.* S. E. p. 612. no. 94. NOCTUA *Praecox.*

Criſtata, alis deflexis, cinereis, bimaculatis; *poſtice faſcia rufa, abbreviata.*

*Larva* nuda, griſea; linea dorſali alba.

*Pupa* brunnea.

175. *Triplacia*, die *dreyhöckrichte Eule.* **)

*Müller* l. c. p. 699. no. 175. der *Dreyhöcker.*

*Füeſsl.* ſchweizer. Inſ. p. 39. no. 742. Ph. *Triplacia.* der *Dreyhöcker.*

Auf *Neſſeln* nicht ſelten.

*Berlin. Magaz.* III. p. 288. no. 31. Ph. *Triplaſia*, die *Neſſelmotte.*

Bräun-

*) Wir tragen kein Bedenken, dieſe für L. *Praecox* zu halten, dazu die W. Entomologen ſelbſt geneigt ſind, da *Hufnagel* ſelbſt von der ſeinigen ſagt: *Seladongrün.* Vielleicht nur eine Verſchiedenheit des Geſchlechts.

**) Die *Raupe* hat drey *Höcker* auf dem Rücken. Die *Tripartita* Hufnag. *Berl. Magaz.* III. p. 414. no. 95. eine bloſse Varietät der Triplacia L. S. *Naturf.* IX. p. 139. no. 95.

Bräunlichgrau, an der Einlenkung der Flügel bräunlichgelb; an dem Innenrande dergleichen Fleck mit einem krummen Strich darüber.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 76. no. 214. Phal. *Triplacia*, der *Dreyhöcker*.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 190. t. 34. Die grüne, buckelichte *Mooſsdiſtelraupe*.

*Wien. Schmetterl.* p. 91. Y. *Afterſpannraupen*, Larvae *Pſeudogeometrae; blendende Eulen*, Ph. N. *Submetallicae*.

No. 1. *Neſſeleulenraupe* (Vrticae dioicae); *Neſſeleule*, Ph. N. *Triplaſia*.

*Fabric.* S. E. p. 617. no. 114. NOCTUA *Triplacia*. Nom. *Linn.*

*Pupa* folliculata, brunnea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 46. no. 402. Ph. *Triplacia*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1420. Phal. *Triplacia*. Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 152. no. 85.

*Phalaena* ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis fuſcis; *ſuperioribus* lineis rufis, baſique macula fulva. — L'*aile brune à baſe fauve*.

*Long.* 7 lign.

*Degeer* Inſ. I. Mém. 3. p. 123. t. 6. f. 13-21.

*Chenille* raſe, verte, rayée de blanc, à trois taches obſcures ſur le dos, qui mange les feuilles de l'Ortie et qui marche en quelque ſorte à la maniere des *Arpenteuſes*, bien qu'elle a ſeize jambes complettes.

— — p. 699. t. 6. f. 20. 21.

*Phalene* à antennes en filets, d'un brun d'agathe, à deux rayes noires, qui renferment une petite tache triangulaire noire.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 442. no. 12. *Phalene à lunettes.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun d'agathe, avec deux rayes courbées, et une tache triangulaire noire.

— *Ueberſ.* I. 1 Qu. p. 93. t. 6. f. 13-21.

Die glatte, grüne, weiſsgeſtreifte *Neſſelraupe*, mit drey dunklen Rückenflecken, und ſechzehn vollſtändigen Füſsen, welche aber doch gewiſſermaſsen wie die Spannmeſſer zu gehen pflegt.

— — 4 Qu. p. 122. t. 6. f. 20. 21. Ein achatbrauner *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und zwo ſchwarzen Streifen, zwiſchen welchen ein kleiner ſchwarzer dreyeckiger Fleck liegt.

— II Th. I B. p. 323. no. 12.*) *Phalene à lunettes*, die *Brillenphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm und niederhangenden achatbraunen Flügeln, mit zwo ſchwarzen gekrümmten Streifen, und einem dreyeckigen Fleck von gleicher Farbe.

*Réaum.* Inſ. I. t. 37. f. 1. 2. 3.

176. *Satellitia*, die *Trabanteneule.*

*Müller* l. c. p. 700. no. 176. der *Trabant.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 743. Ph. *Satellitia.*

Bey uns *etwas ſelten.*

*Ber-*

*) Hierbey iſt zu erinnern, daſs in der Ueberſ. die vom *Degeer* angeführten Zitata des Linné, Geoffr. und Réaum. aus Verſehen ausgelaſſen ſind.

*Berlin. Magaz.* III. p. 418. no. 102. Ph. *Transversa*, die *Queermotte.*

Rothbraun, mit vielen dunklern Queerſtreifen, und einem weiſsgelben Fleck in der Mitte der Flügel, unter welchem noch zween ganz kleine ſtehen.

*Naturforſcher* IX. p. 143. no. 102. Ph. *Transverſa* iſt L. *Satellitia* (von *Rottemb.*).

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 20. no. 38. Ph. *Satellitia*, der *Trabant.*

*Röſels* Inſektenbel. III. p. 287. t. 50.

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige *ſchwarze Raupe* mit dem braunen Kopfe und einer abgeſetzten hellen Seitenlinie — auf den Stachelbeeren.

*Wiener Schmetterl.* p. 86. R. No. 5. *Frühebirnraupeneule* (Pyri communis); *Frühebirneule*, Phal. *Satellitia.*

*Fabric.* S. E. p. 609. no. 81. NOCTUA *Satellitia.* Nom. *Linn.*

*Larva* nigra, linea laterali alba.

*Pupa* brunnea, poſtice obtuſe tridentata.

177. *Tragoponis*, die *Bocksbarteule.*

*Müller* l. c. p. 700. no. 177. der *Bocksbart.*

*Füeſſl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 744. Ph. *Tragoponis.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 294. no. 40. Phal. *Luciola*, der *Einſiedler.*

Glänzendgraubraun mit 3 kleinen ſchwärzlichen Flecken auf jedem Oberflügel.

*Naturforſcher* IX. p. 115. no. 40. Ph. *Luciola* iſt L. *Tragoponis* (von *Rottemb.*).

*Friſch* Inſ. XI. p. 33. 2 Pl. t. 9. von der grünen *Ritterſpornraupe* mit ſchwarzen Strichen.*)

*Wie-*

*) Unrichtig, daſs die Seitenlinien ſchwarz ſind; ſie ſind alle weiſs.

*Wiener Schmetterl.* p. 85. Q.

1) Ohne Queerstriche.

No. 14. *Bocksbarteulenraupe* (Tragoponis pratensis); *Bocksbarteule*, Ph. *Tragoponis*.

*Fabric.* S. E. p. 615. no. 107. NOCTUA *Tragoponis*. Nom. *Linn.*

— posticis *lividis*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 45. no. 398. Ph. *Tragoponis*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1421. Ph. *Tragoponis*. Nom. *Linn.*

*Degeer* Inf. Tom. II. P. I. p. 418. t. 7. f. 15.

*Phalene grise tête-jaune.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un gris cendré très-luisant, avec trois points noirs au milieu; à tête jaune.

*Chenille* rase d'un verd clair à cinq lignes fines blanches tout le long du corps.

— *Uebers.* II. Th. I B. p. 303. no. 10. t. 7. f. 15. die *graue Phalene mit gelbem Kopfe.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und sehr glänzend-aschgrauen niederhangenden Flügeln, mit drey schwarzen Mittelpunkten und gelbem Kopfe.

Die *Raupe* glatt, hellgrün, mit fünf feinen weissen Linien längst dem Körper.

178. *Nigricans*, der *Schwärzling.* *)

*Müller* l. c. p. 700. no. 178. der *Schwärzling.*

*Wien. Schmetterl.* p. 81. N.

3) Mit verfinsterten Makeln.

No. 19. *Wegewarteulenraupe* (Cichorii Intybi); *Wegewarteule*, Ph. *Nigricans.*

*Fa-*

*) *Nicht abgebildet.*

*Fabric.* S. E. p. 616. no. 111. NOCTUA *Nigricans.* Nom. *Linn.*

*Puncta* aliquot minutiſſima ad marginem craſſiorem.

179. *Tritici*, die *Weizeneule.*

*Müller* l. c. p. 700. no. 179. die *Kornähre.*

*Friſch* Inſ. X. p. 21. no. 19. 3 Pl. t. 19. von der *Halmraupe.*

*Wien. Schmetterl.* p. 81. N.

2) Mit hellen oder deutlichen Ring- und Nierenmakeln.

No. 10. *Weizeneulenraupe* (Tritici hiberni *Spicis*); *Weizeneule*, Ph. *Tritici.*

180. *Polymita*, die *Rettigeule.*

*Müller* l. c. p. 700. no. 180. der *Rettigbeiſſer.*

*Wiener Schmetterl.* p. 72. H.

No. 4. *Rettigeulenraupe* (Raphani Sativi); *Rettigeule*, Ph. *Polymita.*

*Merian.* Eur. t. 35?

181. *Pyramidea*, die *Pyramideneule.*

*Müller* l. c. p. 701. no. 181. der *Flammenflügel.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 745. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 33. Phal. *Pyramidea.*

1) Zwo Raupen dieſer Art mit andern *Strichen und Punkten* als die *Röſelſchen.*

2) Weder *Reaumür* noch *Röſel* haben die *ſonderbare Stellung* dieſer Raupe bemerkt, die der von der Ph. *Camelina* L. n. 80. ähnlich iſt, und worinn ſie oft *länger* als dieſe bleibt.

3) Bey-

3) Beyde haben sich in einem zusammengezogenen *Blatte* — *eine* in einem eyförmigen Gewebe, die *andere* ohne anderes Gespinnste, verwandelt — hat sie mit *Haselnußblättern* gefüttert. (Chorh. *Meyer.*)

*Berlin. Magaz.* III. p. 288. no. 32. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*

Dunkelbraun, mit theils schwarzbraunen, theils gelblichen Zeichnungen, die Unterflügel rothbraun.

— p. 422. not. E. Bey dieser Phaläne hat *Rösel* eine *ganz falsche Raupe* angegeben. *)

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 12. no. 11. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramidenmotte*, der *Flammflügel.*

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 73. t. 11. die glatte, blassgrüne *Pyramidenraupe*, die eine pyramidenähnliche Erhöhung auf den zwey hintersten Absätzen führt.

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 648. no. 18. et p. 745. 820. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*

*Wien. Schmetterl.* p. 71. G.

1) Mit kupferbraunen Flügeln.
2) Raupen mit erhabenem gespitzten Hinterleibe.

No. 1. *Nußbaumeulenraupe* (Juglandis regiae); *Nußbaumeule*, Ph. *Pyramidea.*

*Fi-*

*) Die vom *Rösel* angegebene *Raupe* hat hinten die pyramidenförmige Erhöhung, und stimmt mit der *Linnéischen* Beschreibung und *Réaumurs* Abbildung derselben vollkommen überein. Ich möchte denn wohl wissen, wenn die *Röselsche* angegebene Raupe ganz falsch sey, welches die wahre *Raupe* der Ph. *Pyramidea* wäre. Hr. *Hufnagel* hat sich also geirret. Denn ich habe den Vogel aus eben dergleichen Raupen, wie Rösel abgebildet hat, oft gezogen. Man findet sie häufig in den Gärten.

*Fischers* N. G. von Livl. p. 154. no. 368. Ph. *Pyramidea*, der *Flammenflügel.*

*Raj.* Hist. Inf. p. 159. no. 9.

*Phalaena* media, alis longis, angustis; *exterioribus* lineis et areolis nigris, albis, atro-rubentibus, transversis pulchre depictis; *interioribus* obscure rubris.

— Ib.

*Eruca* viridis, glabra, lineis albis secundum longitudinem ductis varia, angulosa in extremo dorso eminentia seu spina dotata.

*Fabric.* S.E. p. 612. no. 95. NOCTUA *Pyramidea.*

Cristata, alis fuscis; strigis tribus undatis, flavescentibus repandis; *posticis* ferrugineis.

*Larva* nuda, viridis, linea dorsali lateralibusque albis, postice *conico-gibba.*

*Pupa* brunnea.

*Geoffr.* Inf. II. p. 160. no. 99.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis deflexis; *superioribus* fuscis, lineis transversis undulatis nigris, *inferioribus* ferrugineis.

La *Brunette à ailes inférieures rougeâtres.*

*Long.* 11. lign.

*Chenille* verte, et à sa partie postérieure relevée en pointe, comme *le bout d'un bateau.*

182. *Flavicornis*, das *Gelbhorn.*

*Müller* l. c. p. 701. no. 182. das *Gelbhorn.*

*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 38. no. 746. Ph. *Flavicornis*, das *Gelbhorn.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 163. die glänzende blassgrüne und schlanke *Raupe* mit gelben Strichen. *)

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 271. t. 50. die glänzende blassgrüne und schlanke *Eichenraupe* mit gelben Streifen.

*Wiener Schmetterl.* p. 72. H. No. 6. *Hageicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Hageicheneule*, Ph. *Flavicornis* — et p. 151. wo eine Berichtigung wegen *Schäffers* Zitati.

*Fabric.* S. E. p. 617. no. 113. NOCTUA *Flavicornis.* Nom. *Linn.*

*Larva nigra*, albo - punctata, capite brunneo.

— Mantiss. p. 283. — 33-34.

*Noctua* laevis, alis deflexis cinereis, strigis duabus undatis albis; macula centrali nivea: *lunula nigra.* **)

Habitat in Germaniae *Quercu.*

*Larva* glabra *viridis*, utrinque lineis duabus longitudinalibus flavis.

183. *Leu-*

*) Wir trugen anfänglich Bedenken, *Rösels* t. 50. und *Fabric.* Mant. hierbey anzuführen; allein, ausserdem, dass die *Röselsche* Phaläne das wesentliche Kennzeichen des Linné: Flavicornis hat, und mit der übrigen Beschreibung ziemlich übereinstimmt, so sagen die *Wien. Entomologen*: „Bergmann hat zwar seine Flavicornis vom Pappelbaume; wir erhalten solche Eulen immer nur häufig von der Eiche. Es stimmen freylich nur wenige davon mit der Beschr. des Ritters L. überein; allein *diese Art spielt in ihren einzelen Eulen so verschieden, dass sich selten zwo recht ähnlich sehen.*"

*Fabric.* sagt: habitat in *Pomonae arboribus*, und giebt die *Raupe* für ganz *schwarz* aus, welches der einzige Zweifel ist, der uns übrig bleibt.

**) Diese Beschreibung trifft genau bey der *Röselschen* zu.

183. *Leucomelas*, die *weiß- und schwarze Eule.* *)
*Müller* l. c. p. 701. no. 183. die *Weißwolke.*
*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 39. no. 747. Ph. *Leucomelas*, die *Elster.*
*Berl. Mag.* III. p. 288. no. 12. Ph. *Leucomelas*, die *Elster.* Die *Oberflügel* schwarz, mit Grau schattirt; die *Unterflügel* schneeweiss mit einem breiten schwarzen Rande.
*Wien. Schmetterl.* p. 90. W. *Bogenstrichraupen;* Larvae *Curvilineatae; zweydeutige Eulen*, Ph. N. *Aequivocae.*
2) Schwarz, oder schwarzfleckicht.
No. 6. *Unbekannte Raupe. Schwarze weißmackelichte Eule*, Ph. *Leucomelas.*
*Naturforscher* XIV. p. 90. t. 4. f. 10. Beschr. der Ph. *Leucomelas* L. (*Capieux.*)
*Fabric.* Syst. E. p. 613. no. 98. NOCTUA *Leucomelas.* Nom. *Linn.*

184. *Bimaculosa*, der *Doppelfleck.* **)
*Müller* l. c. p. 701. no. 184. der *Schwarzfleck.*

185. *Dipsacea*, die *Karteneule.*
*Müller* l. c. p. 702. no. 185. der *Kartenvogel.*
*Berlin. Magaz.* III. p. 406. no. 84. Ph. *Viriplaca*, der *Grünzling.*
Grünlich, blassgelb, mit zwo dunklern Binden, und einem braungeränderten Fleck. Die *Unterflügel* blassgelb mit schwarzem Rande.



*) Diese *Leucom.* L. ist weder die *Schäffersche* Icon. t. 51. f. 11. 12. noch des *Geoffr.* II. p. 149. n. 80. *Alchymiste.* S. *Wien. Schmett.* p. 150.

**) *Nicht abgebildet.* Diese verdiente es vor andern. Wenn sie Herr *Schaller* in Halle besitzt, so schlage ich den Naturforscher und *Capieux's* Meisterhand vor.

*Naturforscher* IX. p. 136. no. 84. Ph. *Viriplaca* ist L. *Dipsacea* (v. *Rottemb.*).
*Wiener Schmetterl.* p. 89. W.
1) Die Oberflügel oliv- oder buntfarbig.
No. 3. *Mengelwurzeulenraupe* (Rumicis acuti); *Mengelwurzeule*, Ph. *Dipsacea.*
*Fabric.* S. E. p. 598. no. 52. NOCTUA *Dipsacea.* Nom. *Linn.*

186. *Typica*, der *Splitterstrich.*

*Müller* l. c. p. 702. no. 186. der *Splitterstrich.*
*Füeßl.* schweizer. Ins. p. 39. no. 748. Phal. *Typica*, das *Netz.*
Auf den *Weiden:* selten.
*Berlin. Magaz.* III. p. 290. no. 34. Ph. *Typica*, das *Netz.*
Graubraun, mit einem nierenförmigen dunkeln Fleck, und netzförmigen blassgelben Strichen.
*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 22. Ph. *Typica*, der *Splitterstrich.*
*Röfels* Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 286. t. 56. die erdbraune *Raupe* mit hellen Seitenstreifen.
*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 744. no. 39. Ph. *Typica*, das *Netz.*
*Wien. Schmetterl.* p. 82. O.
2) Graulich mit weissen Linien die Oberflügel.
No. 4. *Flechtweideneulenraupe* (Salicis Pentandrae); *Flechtweideneule*, Ph. *Typica.*
*Fabric.* Syst. E. p. 613. no. 96. NOCTUA *Typica.* Nom. *Linn.*
*Larva* nuda grisea, lateribus albis, linea nigra.
*Pupa* folliculata, brunnea.
*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1422. Ph. *Typica.* Nom. *Linn.*

187. *Lucipara*, der *Purpurglanz.* *)

*Müller* l. c. p. 702. no. 187. der *Purpurglanz.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 404. no. 80. Ph. *Dubia*, der *Leberfleck.*

Hellgelbbraun, mit einer ſchwarzbraunen breiten Binde, und einem hellgelben nierenförmigen Fleck.

*Naturforſch.* IX. p. 135. no. 80. Ph. *Dubia* iſt L. Ph. *Lucipara.* (v. *Rottemb.*)

*Wiener Schmetterl.* p. 84. P.

No. 3. *Brombeerſtraucheulenraupe* (Rubi fruticoſi); *Brombeerſtraucheule*, Ph. *Lucipara.*

188. *Delphinii*, der *Purpurflügel.*

*Müller* l. c. p. 702. no. 189. der *Ritterſporn.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 290. no. 35. Phal. *Delphinii*, die *Roſenmotte.*

Purpurroth; theils heller, theils dunkler; die *Unterflügel* gelblich braun.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 81. t. 12. die veilblaue, gelbgeſtreifte und ſchwarzgeſprengte *Raupe* auf dem Ritterſporn.

*Wien. Schmetterl.* p. 87. T.

3) Purpurfarben.

No. 8. *Ritterſporneulenraupe* (Delphinii Conſolidae); *Ritterſporneule*, Ph. *Delphinii.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 384. Ph. *Delphinii*, der *Ritterſpornvogel.*

*Fabric.* S. E. p. 610. no. 87. NOCTUA *Delphinii.* Nom. *Linn.*

*Larva* laevis, nuda, flaveſcens, nigro-punctata lineisque duabus flavicantibus.

*Pupa* brunnea.



*) *Nicht abgebildet.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 164. no. 109.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis; alis deflexis roſeis ſuperioribus faſcia duplici limboque albidis.

L' *Incarnat.*

*Long.* 7. lign.

189. *Citrago*, die *Zitroneule.*

*Müller* l. c. p. 702. p. 189. der *Zitronvogel.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 294. no. 41. Ph. *Umbra*, die *Zimmetmotte.*

Pomeranzengelb, mit breiten braungelblichen Binden an dem Hinterrande; die *Unterflügel* blaſsgelb mit einem ſchwärzlichen Rande.

*Naturf.* IX. p. 115. no. 41. Ph. *Umbra.* (Umſtändlich beſchrieben. Zuletzt: ich bin noch ungewiſs, ob es nicht die Ph. *Citrago* L. iſt. von *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 745. no. 43. Ph. *Citrago.*

Die gelbe *Nachteule* mit drey roſtfarbigen ſchrägen Queerbinden.

*Wien. Schmetterl.* p. 86. S. *Bleichkopfraupen*, Larvae *Ochrocephalae; goldgelbe Eulen*, Ph. N. *Aureolae.*

No. 3. *Steinlindeneulenraupe* (Tiliae Europaeae); *Steinlindeneule*, Ph. *Citrago.*

*Neuer Schaupl.* der Nat. II. p. 157. Ph. *Citrago, Zitronvogel.*

*Fabric.* Syſt. Ent. p. 606. no. 67. NOCTUA *Citrago.*

Criſtata, alis incumbentibus, luteis, ferrugineo-ſubfaſciatis.

*Degeer* Inſ. II. Part. I. p. 429. no. 4. t. 7. f. 25.

*Phalene* à antennes filiformes à trompe, et à corcelet huppé; à ailes rabatues jaunes à quatre rayes transverſes, et deux cercles ovales roux.

*Pha-*

*Phalene jaune à rayes rousses.*

*Chenille* rase brune ou griseâtre marquée de plusieurs taches noirâtres, et à seize pattes.

*Degeer Uebers.* II Th. II B. p. 313. no. 4. t. 7. f. 25.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, Rückenkamm, und gelben niederhangenden Flügeln, mit vier braunrothen Queerstreifen, und zween dergleichen eyförmigen Zirkeln.

*Die gelbe braunrothgestreifte Phaläne.*

Die *Raupe* glatt, braun oder graulich mit verschiedenen schwärzlichen Flecken, und sechzehn Füssen.

190. *Fulvago*, der *Rostpunkt.*

*Müller* l. c. p. 703. no. 190. der *Rostpunkt.*

*Wien. Schmetterl.* p. 86. S. No. 1. *Weißbirkeneulenraupe* (Betulae albae); *Weißbirkeneule*, Phalaena *Fulvago.*

*Clerk* Icon. t. 6. f. 15.

191. *Depuncta*, der *Punktstrich.* *)

*Müller* l. c. p. 703. no. 191. der *Punktstrich.*

*Othon. Fabric.* Faun. Grönl. p. 195. no. 148. Phal. *Depuncta.* Nom. *Linn.*

192. *Litura*, der *Dreystrich.* **)

*Müller* l. c. p. 703. no. 192. der *Dreystrich.*

*Wien. Schmett.* p. 77. M.

1) mit schwärzlichen Punkten am Aussenrande.

No. 2. *Korbweideneulenraupe* (Salicis amygdalinae); *Korbweideneule*, Ph. *Litura.*



*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

193. *Retusa*, der *Stumpfflügel.* *)

*Müller* l. c. p. 703. no. 193. der *Oblatenflügel.*
*Wien. Schmetterl.* p. 88. T.
5) Olivenbraun und wicklerförmig.
No. 18. *Bandweideneulenraupe* (Salicis viminalis); *Bandweideneule*, Ph. *Retusa.*

## *Unabgebildete Linnéische Eulen.*

(Ph. *Noctuae.*)

1. *Sylvina.* No. 87.
2. *Ancilla.* No. 93.
3. *Parthenias.* No. 94.
4. *Algira.* No. 98.
5. *Ocularis.* No. 100.
6. *Sanguinolenta.* No. 101.
7. *Narbonea.* No. 103.
8. *Mi.* No. 106.
9. *Nivea.* No. 108.
10. *Heliconia.* No. 111.
11. *Pacta.* No. 120.
12. *Circumflexa.* No. 128.
13. *Virens.* No. 139.
14. *Affinis.* No. 144.
15. *Triptera.* No. 145.
16. *Diffinis.* No. 146.
17. *Putris.* No. 152.
18. *Comma.* No. 156.
19. *Vaccinii.* No. 166.
20. *Plebeja.* No. 168.
21. *Polyodon.* No. 170.
22. *Nigricans.* No. 178.
23. *Bimaculosa.* No. 184.
24. *Lucipara.* No. 187.



*) Nicht abgebildet.

25. *Depuncta.* No. 191.
26. *Litura.* No. 192.
27. *Retusa.* No. 193.

NEUE EULEN.

( Phal. *Noctuae.*)

1. *Allica*, der *ostindianische Blaufleck.*

*Linn.* S. N. ed. 12. Tom. III. App. Anim. p. 225.
*Phalaena* N. spirilinguis laevis, flava; alis superioribus maculis duabus coeruleis connexis, margine coeruleo.
*Müllers* Suppl. u. Reg. B. p. 309. no. 116. a. Phal. *Allica*, der *Blaufleck.*

2. *Decora*, die *kapensische Schöne.*

*Linn.* S. N. ed. 12. App. p. 1064. no. 14.
*Phalaena* subspirilinguis; alis *superioribus* albo-nigroque variegatis; *inferioribus* rubris margine nigro.
*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 11. t. 7. Fig. E F. (Mas), Ph. Hibou *Julie.* ( v. p. 155. *Addit.* Ph. *Decora* Linn.)
— — Vol. III. p. 44. t. 219. Fig. F G. Phal. *Decora* — du *Cap. de B. E.*
*Houttuin* Hist. Nat. Tom. I. p. XII. p. 676. t. 92. f. 6. ( *Femina.*)
*Petiv.* Gazoph. t. 58. f. 7.
*Müllers* Suppl. u. Reg. B. p. 311. no. 193. c. Ph. *Decora*, die *Docke.*

3. *Deplana*, der *Flachflügel.*

*Linn.* Mantiss. p. 539.

*Phalaena* ſpirilinguis, laevis, alis depreſſis; *ſuperioribus* lividis, margine baſeos nigris.

Statura et ſimilitudo ſumma Ph. *Complanatae*, ſed *paulo maior.*

*Fabric.* S. E. p. 595. no. 20. NOCTUA *Deplana.*

Laevis, alis incumbentibus, cinereis, thorace flavo.

In *Europae hortis.*

*Müllers* Suppl. u. Reg. B. p. 309. no. 116. b. Ph. *Deplana,* der *Hangflügel.*

4. *Argentea,* der *ſilberfleckige Mönch.*

*Berl. Mag.* I. p. 648. c. fig. 1-4.

Beſchreibung einer ſeltenen bisher unbekannten *Raupe*, und der daraus entſtehenden *Phaläne* (*Hufnagel*).

— III. p. 286. no. 28. Ph. *argentea.*

Die *Oberflügel* gelblichgrün, *mit 7 ſilberglänzenden Flecken* und weiſſem Rande; die *Unterflügel* ganz weiſs.

*Naturforſcher* IX. p. 113. no. 29. Ph. *argentea.*

Einer der *ſchönſten und ſeltenſten* europäiſchen Nachtvögel (v. *Rottemb.*).*)

*Knochs* Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 45. no. 8. t. 3. f. 2. Ph. *argentea*, der *ſilberfleckichte Mönch.* (*illumin.*)

*Füeßl.* Archiv der Entomol. I Heft, 4 Bogen, t. 5. f. 1-7. Naturgeſchichte des *Silbermönchs.* Phal. N. *argentea.*

(P. *Herbſt:*

*) Die *Hufnagelſche* Abbildung, ſagt Hr. v. *Rottemb.* ſey etwas ſchlecht gerathen; er verſpricht daher eine getreuere und beſſere Abbildung dieſes ſeltnen Vogels.

(P. *Herbst:* vortrefflich *abgebildet und illuminirt.*)

Ph. N. cristata, seticornis, spirilinguis, alis deflexis, superioribus viridibus, maculis septem argenteis; posticis albidis, margine dilutiore cinereo.

(Die Larve mit Fliegenmaden behaftet.)

5. *Artemisiae*, der *bunte Mönch.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 294. no. 38.

Dunkelaschgrau, so an einigen Orten ins Helle fällt, mit einem nierenförmigen Fleck und andern Zeichnungen.

*Naturforsch.* IX. p. 114. no. 38. Ph. *Artemisiae* — Der Ph. *Absinthii* L. sehr gleich. *Unterscheidungszeichen* lassen sich nicht beschreiben, sondern am besten durch den Augenschein erkennen (v. *Rottemb.*).

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 81. no. 232. die schöne grüne *Kamillenraupe* mit rothen dornenähnlichen Spitzen, der N. V. 2 Kl. *Artemisia.*

*Rösels* Insektenbelustig. III. p. 289. t. 51. f. 1-4. — die schöne grüne *Kamillenraupe* etc. (*ohne Vogel.*)

*Wien. Schmetterl.* p. 73. I. *Tigerraupen; kappenhalsigte Eulen.*

1) Weiss mit Roth und grün: *die Raupen.*

No. 2. *Stabwurzeulenraupe* (Artemisiae Abrotani et campestris); *Stabwurzeule*, Ph. N. *Abrotani.*

— — *Nachtrag* p. 312. q. (1) *Beyfußeule.* Anmerk. (*Hufnagel.*)

6. *W latinum*, das *lateinische W.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 294. no. 39.

Grau-

Graubraun, mit einem unmerklichen nierenförmigen Fleck; in der blaſsgelben Randlinie ein lateiniſches W.

*Naturf.* IX. p. 114. no. 39. Ph. *W.* (v. *Rottemb.*) — Die Gröſse wie Ph. *Oleracea* L.

7. *Icteritia*, die *Sommerſproſſe.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 296. no. 43. Blaſsſchwefelgelb, mit röthlichen zerſtreuten Flecken und Punkten; die Unterflügel weiſs.

— — p. 423. G. eine *durchaus blaſsgelbe*, nur in der Mitte der Oberflügel ein bräunlichrother kleiner Fleck.

*Naturf.* IX. p. 117. no. 43. Phal. *Icteritia.* Der in der Anm. G. eine bloſse Varietät der Icteritia (v. *Rottemb.*). die Gröſse wie Ph. *O o* L.

8. *Munda*, die *Dachmotte.* *)

*Berlin. Magaz.* III. p. 296. no. 45. Ganz blaſsgelb, mit einem braunen Hinterrande und 2 ſchwarzen Punkten in der Mitte der Flügel.

*Naturf.* IX. p. 118. no. 45. Ph. *Munda.* — Zu den kleinſten dieſer Art, viel ähnliches mit den *Blattwicklern.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 650. no. 22. Ph. *Munda*, die *Dachmotte.*

9. *Tha-*

*) Faſt ſollt ich dieſe mit L. *Mundana* no. 17. für einerley halten, zumal da Hr. von *Rottemb.* ſagt: ſie habe viel ähnliches mit den *Blattwicklern.* Daher hab ich auch bey der Mundana L. den Gleditſch bereits angeführt. Noch kann ichs nicht mit Gewiſsheit entſcheiden.

9. *Thalassina*, der *Rothglanz*.

*Berlin*. *Magaz*. III. p. 298. no. 46.
Glänzend, bräunlichgelb, dunkelschattirt, mit einem blassgelben nierenförmigen Fleck.
*Naturforsch*. IX. p. 119. no. 46. Ph. *Thalassina*. In der Grösse der Ph. *Pisi* (v. *Rottemb*.).

10. *Incerta*, der *Chamäleon*.

*Berl*. *Magaz*. III. p. 298. no. 47.
Bald gelbroth, bald aschgrau, bald rothbraun, mit einem dunklen nierenförmigen weiss eingefassten Fleck.
— — p. 424. H. weichen sehr in ihren Zeichnungen ab.
*Naturf*. IX. p. 119. no. 47. Ph. *Incerta*. (von *Rottemburg*.)
*Röfels* Insektenbel. I. V. N. 2 Kl. p. 278. t. 53. die gelblichgrüne mit 3 gelben Streifen gezierte glatte *Raupe* auf den Kirschbäumen.
*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 21.*) p. 33. no. 81. Ph. *Incerta*; Ph. *Cerasi*, die *Kirschmotte*.
*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 555. no. 6. et II. p. 746. no. 45. Ph. *Incerta*, der *Chamäleon*.
Im *Junio* häufig auf Erlen und Weiden.
*Füessl*. Magaz. der Entom. II. p. 15. Ph. N. *Cerasi*.
1) *Raupe* frisst die Blätter vom *Schlehendorn*.
2) hat *Zwirnwürmer*.
3) der Vogel kömmt im warmen Zimmer schon den 23ten *Jänner* aus (Chorh. *Meyer*).
*Fabric*. S. E. p. 600. no. 42. NOCTUA *Cerasi*.

Lae-

*) Hier ist die Ueberschrift zu t. 55. aus Versehen zu t. 53. gesetzt, und das Zitatum am Rande LV muss LIII heissen, wie p. 33. n. 81.

Laevis, alis deflexis, griseo - ferrugineis; maculis strigaque postica flavescentibus, margine nigro punctato.

In *Ceraso* Angliae, Germaniae.

Alae posticae cinereae, nitidae, subtus puncto magno centrali, fusco.

*Larva* flavescens, striis tribus sulphureis; capite coeruleo.

*Pupa* nuda, brunnea, postice bidentata.

11. *Morpheus*, der *Schmuz.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 302. no. 52.

Schmuzgelb mit 2 grauen Binden; und einem dergleichen Fleck auf den Oberflügeln.

*Naturforscher* IX. p. 121. no. 52. Ph. *Morpheus*: in der Gröſse der Ph. *Brunnea.* (von *Rottemb.*)

12. *Bicruris*, die *Winkelmotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 302. no. 53.

Braun, mit Grau schattirt, und eine weiſſe Zeichnung in Form eines Winkels.

*Naturf.* IX. p. 121. no. 53. Ph. *Bicruris* (von *Rottemb.*).

*Frisch* Inſ. X. p. 14. no. 11. 3 Pl. t. 11. von der *Bilsenraupe.*

13. *Lucida*, die *Tagemotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 302. no. 52.

Schwarzbraun mit weiſſen Flecken, die Unterflügel weiſs mit breitem ſchwarzem Rande.

— — p. 424. I. die *Raupe* soll zu den *Spannmeſſern* gehören.

*Naturf.* IX. p. 122. no. 52. Ph. *Lucida.* Der Vogel

gehört

gehört doch mit Recht zu den Noctuis. (v. *Rottemb.*)

— Etwas kleiner als Ph. *Fuliginoſa.*

14. *Ornitopus*, die *Strichmotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 304. no. 56.

Weiſs und grau marmorirt mit feinen grauen Zeichnungen, und gelben nierenförmigen Fleck.

*Naturf.* IX. p. 124 no. 56. Ph. *Ornitopus.* In der Gröſse der Ph. *Pſi.* (von *Rottemb.*)

15. *Orbona*, die *Trauerbinde.* *)

*Berl. Magaz.* p. 304. no. 57.

Die *Oberflügel* rothbraun mit einem nierenförmigen braunen Fleck. Die *Unterflügel* orangengelb mit ſchwarzem Rande und ſchwarzen Flecken.

*Naturf.* IX. p. 125. no. 57. Ph. *Orbona.* Nie gröſser als Ph. *Braſſicae.*

Vielleicht das *Männchen* von Phal. *Pronuba* — (von *Rottemb.*).

*Unbekannte Raupe.*

*Degeer* Inſ. II. Part. I. p. 401.

— Une autre eſpece, qui leur (Ph. *Pronuba*) reſſemble beaucoup, mais qui eſt conſtamment plus petite — en quantité en *Hollande.*

*Merian.* Eur. t. 63.

16. *Triangulum*, das *doppelte Dreyeck.*

*Berl. Magaz.* III. p. 306. no. 58.

Rothgelb oder braun, mit einem groſsen dun-

*) Viel ähnliches mit *Pronuba* L. n. 122. aber nur halb ſo groſs.

dunkelbraunen Fleck, so zwey mit ihren Spizen zusammenstossende Triangel vorstellt.

*Naturf.* IX. p. 125. no. 58. Ph. *Triangulum.* In der Grösse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*) *)

17. *Sordens*, der *Esel.*

*Berl. Magaz.* III. p. 306. no. 59.

Bräunlichgrau mit einem schwärzlichen nierenförmigen, und einem länglicht runden Fleck.

*Naturf.* IX. p. 126. no. 59. Ph. *Sordens.* In der Grösse der vorigen Ph. *Triangulum.* (v. *Rottemburg.*)

18. *Lateritia*, die *Ziegelmotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 306. no. 60.

Ziegelfarbig, mit einem weissen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

*Naturf.* IX. p. 127. no. 60. Ph. *Lateritia.*

Rothbraun. In der Mitte der Oberflügel ein dunkelbrauner nierenförmiger Fleck mit einer weisslichen Einfassung.

Beynahe in der Grösse der Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

19. *Monoglypha*, der *Treiber.*

*Berl. Magaz.* III. p. 307. no. 62.

Theils blaulich, theils hell, theils dunkelgrau mit einem lateinischen W an dem hintern Rande.

*Na-*

*) Noch eine besondere Art, diesem sehr ähnlich. Die *Oberflügel* ganz schwarzbraun; in diesem Grunde nahe am Oberrande zwey *kohlschwarze Triangel*, die mit den Spitzen zusammenstossen. Der dazwischen befindliche Raum weisslich, und stellt den dritten weissen Triangel vor. Die *Unterflügel* weissgrau. Eine *wirklich verschiedene Art.* (v. *Rottemb.*)

*Naturf.* IX. p. 128. no. 62. Ph. *Monoglypha.* Vier helle gezackte Queerlinien auf den Oberflügeln, deren vierte zunächst am Aussenrande am meisten gezackt ist, und in der Mitte ein lateinisches W formirt. — Etwas kleiner als Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

20. *Subcorticalis*, die *Rindenmotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 307. no. 63.

Schmuziggelb, mit einer Reihe schwarzer Punkte und braunem Vorderrande.

*Naturf.* IX. p. 128. no. 63. Ph. *Subcorticalis.* In der Mitte der Oberflügel ein nierenförmiger Fleck, der in der Mitte schwarzgrau, am Rande hellbraun, und mit einer braunen Linie eingefasst ist. (v. *Rottemb.*)

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 747. no. 49. Ph. *Subcorticalis*, die *Rindenmotte.*

21. *Velitaris*, die *Segelmotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 394. no. 64.

Schmuziggelb, mit 2 braunen Queerstreifen, daran die hinterste unterbrochen ist.

*Naturf.* IX. p. 129. no. 64. Ph. *Velitaris.* Etwas kleiner als Ph. *Camelina* — steht mit Unrecht unter den Noctuis; das *Männchen* hat haarichte Fühlhörner (Antennas pectiniformes); also ein *Bombyx.* (v. *Rottemb.*)

*Knochs* Beyträge zur Insektengeschichte I St. p. 66. no. 14. t. 4. f. 8. Ph. *Bombyx* velitaris, die *Segelmotte.*

Elinguis, cristata; alis pallide moschatinis; superioribus strigis duabus albis undatis lineola intra apicem fusca.

22. *Irregularis*, der *Buntscheck.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 394 no. 65.

Schmuziggelb mit weissen Flecken, und ausgezackten braunen Queerstreifen.

*Naturforsch.* IX. p. 130. no. 65. Phal. *Irregularis.* Zu den kleinern Arten: kaum so grofs, als Ph. Fuliginosa — doch mit sehr abwechselnden Farben, und sehr feinen Zeichnungen. (v. *Rottemb.*)

23. *Lunula*, das *Möndchen.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 394. no. 66.

Graubraun, mit einigen dunkelbraunen Flecken, und einem kleinen ganz weissen mondförmigen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

*Naturforscher* IX. p. 130. no. 66. Ph. *Lunula.*

Noch kleiner als der vorige. (v. *Rottemb.*)

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 652. no. 29. Phal. *Lunula*, das *Möndchen.*

*Schriften der Dronth. Gesellsch.* IV. p. 282. no. 39.*) t. 16. f. 15.

Ph. N. *Lunula*, spirilinguis cristata, alis deflexis atro-purpureis, nebulosis, lineola arcuata *flava.*

24. *Singularis*, der *Sonderling.* **)

*Berlin. Magaz.* III. p. 396. no. 67.

Röth-

*) Ich halte diesen und die beyden *Röselschen* I. N. V. 2 Kl. t 44. et 45. (*Müll.* Zool. Dan. Pr. no. 1430.) nebst *Hufnagels* Lunula für lauter nahe verwandte Arten, oder auch wohl nur für blosse Abänderungen. S. no. 55. 56.

**) Diese scheint der Hr. v. *Rottemb.* in seinem schönen *Erläuterungsregister* übersehen zu haben.

Röthlichbraun, theils heller, theils dunkler, mit einem blaſsfleiſchfarbenen ſehr gebogenen Haken.

25. *Simulans*, der *Heuchler.*

*Berl. Magaz.* III. p. 396. no. 68.

Graulichbraun, mit abgeſetzten, theils runden, theils eckichten Queerſtreifen.

*Naturf.* IX. p. 131. no. 68. Ph. *Simulans.*

Sehr undeutliche Zeichnungen. — In der Gröſse der Ph. *Atriplicis* — hat beſonders die Eigenſchaft, daſs er des Abends in die Stuben fliegt, und man des andern Tages öfters 10 bis 12 Stück in den Falten der Fenſtergardinen findet. — Seine Raupe iſt unbekannt. (von *Rottemburg.*)

26. *Brunnea*, der *Weiſsfleck.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 396. no. 69.

Mattbraun mit Dunkelbraun ſchattirt, und einem weiſſen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

*Naturforſch.* IX. p. 131. no. 69. Ph. *Brunnea.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 155. §. 8.

*Raupe Röſel* III. t. 68. f. 6. die unanſehnliche braune *Erdraupe.*

*Puppe und Vogel Kleem.* l. c. t. 17. f. A B.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 21. no. 39. p. 41. no. 110. Ph. *Brunnea.*

27. *Trifolii*, das *Dreyblatt.*

*Berl. Magaz.* III. p. 398. no. 70.

Schmuziggelb und grau mit einigen blaſsgelben ſchmalen Queerſtreifen.

*Naturf.* IX. p. 131. no. 70. Ph. *Trifolii.* *Röſels* Vogel nicht völlig getroffen. (v. *Rottemb.*)

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 265. t. 48. die *Spargelraupe* mit dem rothen Seitenſtreif.
*Kleem.* Beytr. I. p. 191. Anm. — die Raupe des *Röſels* t. 48. hat auch *Tobakskraut* gefreſſen.
*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 329. Phal. *Trifolii.*

28. *Nana*, der *Zwerg.*

*Berl. Magaz.* III. p. 398. no. 71.
Weiſsgrau, ins Dunkelgraue vertrieben, mit einem weiſsgrauen zackichten Flecke in der Mitte der Oberflügel.
*Naturf.* IX. p. 132. no. 71. Ph. *Nana.*
In der Gröſse der Ph. *Triplaſia.* (v. *Rottemb.*)

29. *Sororcula*, die *Strohmotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 398. no. 72.
Durchaus okergelb mit ſchmalen Flügeln.
*Naturf.* IX. p. 132. no. 72 Ph. *Sororcula.*
In der Gröſse der Ph. *Padella*, nach ſeinem Bau den Tineis ſehr ähnlich. (v. *Rottemb.*)

30. *Muſcerda*, der *Fliegenquark.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 600. no. 73.
Mauſefarbig, mit 5 ſchwarzen Punkten auf jedem Oberflügel.
*Naturf.* IX. p. 133. no. 73. Ph. *Muſcerda.*
Gehört auch zu den *Schmalflüglichen.* (von *Rottemb.*)
*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 28. Ph. *Muſcerda*, der *Fliegenquark.*

31. *Crenata*, die *Spaltmotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 402. no. 76.

Röth-

Röthlichbraun, mit einem nierenförmigen und einigen andern Flecken im braunen Grunde.

*Naturf.* IX. p. 133. no. 76. Ph. *Crenata.*

In der Gröſse der Ph. *Trifolii.* (von *Rottemb.*)

32. *Furcifera*, die *Gabelmotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 402. no. 77.

Blaulichgrau, mit einigen braunen Zeichnungen, darunter die Figur einer *zweyzackichten Gabel.*

*Naturforſcher* IX. p. 134. no. 77. Ph. *Furcifera.*

In der Gröſse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

33. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 402. no. 78. et. p. 425. L.

Bräunlichgelb mit 2 braunen Queerſtreifen; die Unterflügel etwas brauner.

Die *Raupe* hat die Figur eines *Schildes.*

*Naturf.* IX. p. 134. no. 78. Ph. *Limacodes.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 321. t. 38.

Das zur N. V. 2 Kl. gehörige einſame dicke, gelblichgrüne, gelbbordirte *Schildräuplein* ohne Bauchfüſse.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 68. no. 195. p. 85. no. 245. p. 92. no. 267. et p. 95. no. 276. Ph. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 600. no. 3. Ph. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

34. *Circellaris*, die *Zirkelmotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 404. no. 79.

Braungelb, mit einem kleinen ſchwarzgrauen Fleck in der Mitte der Flügel, und einer *zirkelförmigen Figur.*

*Naturforsch.* IX. p. 134. no. 79. Ph. *Circellaris.*
In der Grösse der Ph. *Pisi.* (von *Rottemb.*)

35. *Domiduca*, die *Sturmhaube.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 404. no. 81.
Mit abwechselnden, hell- und dunkelbraunen schwarzgezogenen Queerbinden; die *Unterflügel* oraniengelb mit einem breiten schwarzen Rande.

*Naturforscher* IX. p. 135. no. 81. Ph. *Domiduca.*
Ungemein viel ähnliches mit Ph. *Pronuba:* auch so grofs, aber doch 2 verschiedene Arten. (v. *Rottemb.*)

*Knochs* Beytr. zur Insektengesch. I St. p. 63. no. 13. t. 4. f. 5.
N. spirilinguis cristata, alis incumbentibus violaceis, fasciis saturatioribus; posticis dilucide aurantiis ad basin et fascia submarginali nigris.

*Wien. Schmett.* p. 78. no. 19. *veilblaulichte braunfleckichte Eule*, N. *Janthina.*

36. *Domestica*, der *Tieger.*

*Berl. Mag.* III. p. 406. no. 83.
Grünlichgrau und blafsgelb, mit verschiedenen grünlichgrauen schwarzgerändeten Flecken.

*Naturf.* IX. p. 136. no. 83. Ph. *Domestica.*
1) die Hufnag. Beschr. nicht recht passend.
2) die angegebene Grösse unrichtig; nicht grösser als Ph. *Viridana* (v. *Rottemb.*).

37. *Pyrarga*, die *Meise.*

*Berl. Magaz.* III. p. 408. no. 85.
Weifs und braun marmorirt, mit schwarzen Flecken; die Gegend des äussern Randes ganz weifs.

*Na-*

*Naturf.* IX. p. 136. no. 85. Ph. *Pyrarga.*
Etwas grösser als Phal. *Domestica.* (von *Rottemb.*)

38. *Trigrammica*, die *Bandmotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 408. no. 86.
Blassgelb mit drey schmalen braunen Queerstreifen.

*Naturforscher* IX. p. 137. no. 86. Ph. *Trigrammica.*
In der Grösse der Ph. *Oleracea.* (v. *Rottemb.*)

39. *Tricomma*, die *Lebermotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 408. no. 87.
Graubraun, bald heller, bald dunkler, mit gezackten Queerstreifen, und 3 kleinen schwarzen und 3 weissen Strichen. *)

40. *Sagittigera*, der *Pfeilträger.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 410. no. 88.
Bräunlichgrau mit verschiedenen schwarzbraunen Zeichnungen, darunter einige die Figur einer *Pfeilspitze* vorstellen.

41. *Bicolorata*, die *Mausmotte.*

*Berl. Mag.* III. p. 410. no. 89.
Weisslichgrau, mit einer dunklen braunen Binde, in welcher einige braune ausgebogene abgesetzte Linien befindlich.

*Naturf.* IX. p. 137 no. 89. Ph. *Bicolor.*
In der Grösse der Ph. *Fuliginosa.* (von *Rottemburg.*)



*) Diese nebst no. 40. und no. 42. vermisse ich bey dem Hrn. v. *Rottemburg.*

42. *Bombycina*, die *Wachtel.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 410. no. 90.

Grau mit braunen Zeichnungen, einer weifslichen Zirkelfläche; und weiſſem nierenförmigen Fleck.

43. *Grifea*, die *Graumotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 411. no. 91.

Ganz gelblich grau mit vielen zerftreuten grauen und braunen Flecken.

*Naturf.* IX. p. 138. no. 91. Ph. *Grifea.*

In der Gröſse der Ph. *Fuliginofa.* (von *Rottemburg.*)

44. *Tineodes*, die *Grafemücke.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 412. no. 92.

Weiſslich, mit braunen ziemlich groſsen Flecken.

*Naturf.* IX. p. 138 no. 92. Ph. *Tineodes.*

Etwas gröſser als Ph. *Viridana.* (v. *Rottemb.*)

45. *Arabica*, der *Reuter.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 412. no. 93.

Olivenbraun, mit untermifchten hell fchwefelgelben Streifen und Flecken.

*Naturf.* IX. p. 139. no. 93. Ph. *Arabica.*

In der Gröſse der Ph. *Viridana.*

Die *Raupe* ein Spanneſſer mit 2 Paar Bauchfüſsen — verwandelt fich in der Erde. (v. *Rottemb.*)

46. *Confufa*, der *Tänzer.* *)

*Berl. Magaz.* III. p. 414. no. 94.

Schwarz-

*) Steht beym Hrn. v. *Rottemburg.*

Schwarzgrau, mit weisslichen Flecken von verschiedener Grösse, und einem kleinen grauen halben Mond in weissem Felde.

47. *Matura*, die *Glanzmotte.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 414. no. 96.

Braungrau, mit weissen und blassgelben Zeichnungen, die meistens braun gerändert sind. Die *Unterflügel* blassgelb mit einem breiten braunen Rande.

*Naturf.* IX. p. 140. no. 96. Ph. *Matura.*

Am Innenrande der Oberflügel ein kleines *lateinisches* v — wegen seines Glanzes und feinen Zeichnungen ein schönes Ansehen — in der Grösse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 651. no. 27. Ph. *Matura*, die *Glanzmotte.*

48. *Cursoria*, der *Rothbart.*

*Berl. Magaz.* III. p. 416. no. 97.

Gelblichgrau, mit 2 braunen ausgeschweiften und ausgezackten, und 2 grauen geschlängelten Queerstreifen.

*Naturf.* IX. p. 140. no. 97. Ph. *Cursoria.*

In der Grösse der Ph. *Trifolii.* (v. *Rottemb.*)

49. *Cinerea*, die *Aschmotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 416. no. 98.

Ganz aschgrau, mit einigen unmerklichen weisslichen und einem gelbbraunen Flecken.

*Naturf.* IX. p. 141. no. 98. Ph. *Cinerea.*

Etwas kleiner als Ph. *Trifolii.* (v. *Rottemb.*)

50. *Ipsilon*, der *Zweyzack.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 416. no. 99.

Hellbraun, mit einem nierenförmigen Fleck, und einem dunkelbraunen lateinischen *Ipsilon*, oder zweyzackichter Gabel auf jedem Oberflügel.

*Naturf.* IX. p. 141. no. 99. Ph. *Ipsilon.*

— Gehört unter die *Bombyces* — die Fühlhörner des *Männchens* nicht ganz haarig, sondern an der Spitze glatt. In der Grösse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

51. *Socia*, der *gestreifte Mönch.*

*Berlin. Magaz.* III. p. 418. no. 101.

Gelblich, weissgrau, mit einigen braunen Streifen und Punkten.

*Naturf.* IX. p. 142. no. 101. Ph. *Socia.*

In der Grösse der Ph. *Verbasci.*

*Raupe* lebt auf den *Linden:* grün mit einigen weissen Linien und Punkten. Gehört nicht unter die *Mönche.* (v. *Rottemb.*)

52. *Nebulosa*, die *Nebelmotte.*

*Berl. Magaz.* III. p. 418. no. 103.

Weissgrau, mit braungerändeten Flecken, darunter ein nierenförmiger; oder braungrau mit weissgrauen Flecken.

*Naturf.* IX. p. 143. no. 103. Ph. *Nebulosa.*

In der Grösse der Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

53. *Variegata*, die *Scheckeule.*

*Schriften der Dronth. Gesellsch.* IV. p. 183. no. 40. t. 15. f. 16.

Phalaena (*Variegata*), spirilinguis cristata, alis deflexis, canis lineolis undulatis transversalibus confluentibus.

Auf *Fichtenstöcken.*

54. *Ani-*

54. *Anifurca*, die *Schwanzgabel.*

*Röſels* Inſektenbel. I. V. N. 2 Kl. p. 241. t. 42. die glatte ſchwarz und gelbgefleckte *Salatraupe.*

Cinerea, criſtata, alis deflexis cinereis nigrovenoſis; *poſticis* fuſceſcentibus, albo-marginatis; *ano furcato.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 160. p. 76. no. 215. die glatte ſchwarz und gelbgefleckte *Salatraupe.*

55. *Lunulata*, die *Mondeule.* *)

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 249. t. 44. die ſchwarze *Raupe* mit gelbrothen Haaren und Knöpfen auf der *Schwarzbeerſtaude.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkalend. p. 59. no. 161. die ſchwarze *Raupe* etc. et no. 216.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 104. no. 1430.

Phalaena *Lunulata*, ſpirilinguis, criſtata; alis murinis; *ſuperioribus* ſtrigis transverſis dentatis *circulo lunulaque nigris.*

*Schaeff.* Icon. t. 28. f. 7. 8.

56. *Lunulata minor*, die *kleine Mondeule.* **)

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 252. t. 45. die ſchwarze mit weiſſen *kleeblätterförmigen Flecken* gezierte haarige *Raupe.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 162.

*Wien.*

*) S. No. 23.

**) Die Raupe iſt ganz von der vorigen verſchieden. Der Vogel kleiner. Alle Flügel mauſefahl; die obern mit wellenförmigen ſchwärzlichen Linien, einem kleinen grauen ſchwarz eingefaſsten Zirkel, und zwey ſehr kleinen ſchwarzen *Möndchen.*

*Wien. Schmetterl.* p. 67. Anm. B. zu den Scheinſpinnerraupen; *düſtere Eulen.*
*Albin* Inſ. t. 88. fig. f.

57. *Aurantio maculata*, die *orangegelbgefleckte Eule.*
*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 281. t. 54. die punktirte blaulichgrüne *Raupe*, mit dem blaſsgelben Seitenſtreif.
Criſtata, alis deflexis cinereis; *anticis* nigropunctatis, *aurantiaco-maculatis.*
*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 33. no. 82.

58. *Undulata*, die *Wellenlinie.**)
*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 283. t. 55. die ſchlanke, glatte, grasgrüne *Raupe* mit dem gelben Seitenſtreif.
Criſtata, alis deflexis, *anticis* cinereis *nigro-aurantiacoque* ſtriatis; *poſticis* luteſcentibus, margine nigro undulato.
*Maders* (Kleem.) Raupenkalend. p. 33. no. 83.

59. *Purpuraſcens*, der *Purpurfleck.* **)
*Röſels* Inſektenbel. IV. p. 145. t. 21.
Die hellbraune, glatte Grasraupe mit dunkelbraunen geſchuppten Queerflecken, und hellen unterbrochenen Streifen.
Criſtata, alis purpuraſcentibus nigro-lineatis; anticarum media macula oblonga rubra; poſticis luteſcentibus; *abdomine* aurantiaco-barbato.
*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 45. no. 123.

60. *Cin-*

*) Der vorigen ſehr ähnlich, etwas gröſser und mehr geſcheckt.

**) Eine der ſchönſten Eulen mit ſehr ſanften Farben.

60. *Cinnamomea*, die *zimmetfarbige Ilmeneule.*

*Kleemanns* Beytr. I. p. 157. t. 18. f. 1-6.

Die schöne gelblichgrüne, mit einem schmalen hellgelben Rücken- und Seitenstreif auch verschiedenen weisslichen Strich- und Pünktlein gezierte *Raupe.*

Alis incumbentibus; *anticis* fusco-*posticis* hilare cinnamomeis.

*Wiener Schmetterl.* p. 71. Anm. G. zu den *Wellenstrichraupen. Glänzende Eulen.*

1) Mit kupferbraunen Flügeln.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 67. no. 190.

61. *Atropos minor*, der *kleine Todtenkopf.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 185. t. 22.

Die blaulichgrüne, mit einer gelben Halsborte gezierte *Raupe.* Der *Nachtvogel* mit einem *Todtenkopf.*

— Auf dem *Gartensalat* (Lactuca hort.). Alis complanis; *anticis* olivaceis, nigro-variegatis, circulo griseo; *posticis* lutescentibus; in thorace *caput mortuum.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 97. no. 278. der *kleine Todtenkopf.*

62. *Deaurata*, die *Goldeule.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 237. t. 29. f. 1-10.

Die *Raupe* in *Rösels* III B. p. 401. t. 68. f. 8.

Die glänzende glatte braune Raupe mit hellem Kopfe, und fünf ebenfalls hellen bandförmigen Streifen.

Cristata, alis incumbentibus; *anticis* furvis, *figuris lineisque* irregularibus aureo-flavis; *posticis* flavo-nigricantibus.

63. *Glau-*

63. *Glaucescens*, der *Blaufleck*.

*Kleem.* Beytr. I. p. 338. t. 40.

Die halbspannende, grasgrüne gelbgestreifste *Raupe* mit ungleichen Bauchfüssen.

Alis incumbentibus angustis, flavo-fusco-nigroque maculatis: *anticis* macula transversa glaucescente.

(Conf. *Degeer* Tom. I. Mém. 12. p. 377. t. 21. f. 10. 11. 12. eben dergleichen *Raupe*.)

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 137.

64. *Histrio*, der *Harlekin*.

*Kleem.* Beytr. I. p. 353. t. 42.

Die glatte, gelblich, zimmetbraune, und mit dunklen Rückenstreifen und einer gelben Seitenborte gezierte, aber anfänglich grüne Raupe.

Alis anticis diversimode coloratis; *anticis* binis maculis maioribus ferrugineis; *posticis* pallide flavis.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 69. no. 196. p. 85. no. 247. p. 93. no. 269.

65. *Bi-ren*, der *doppelte Nierenfleck*.

*Kleem.* Beytr. I. p. 361. t. 43.

Die glatte, gelblichgrüne, und mit braunrothen Rückenzeichnungen gezierte *Raupe*.

Alis *anticis* murinis, lineis undulatis, binisque maculis pallide griseis reniformibus; *posticis* lutescentibus.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 86. no. 248. p. 93. no. 270.

66. *An-*

66. *Anceps*, die *zweydeutige Eule.* *)

*Kleem.* Beytr. I. p. 115. t. 13. f. A B.

Die ungemein ſchön gezeichnete grün- und weiſsgeſtreifte *Eichenraupe* mit gelben und rothen Seitenſtrichen.

Alis umbroſis cineraſcentibus, lineis transverſis undulatis griſeis; in thorace figura M.

Die *ſchöne Raupe* in *Röſels* III B. p. 272. t. 48. f. 3.

67. *Triceſima*, der *Dreyſsiger.*

*Naturf.* III. p. 2. t. 1. f. 1. (D. *Kühn.*)

Alis *anticis* fuſco-rubris, numero 30 notatis; *poſticis* fuſco-luteſcentibus.

68. *Viridana*, die *braungrüne Ohreule.*

*Naturf.* XIII. p. 28. t. 3. f. 5. a. f. 5. b.

*Phalaena* N. antrorſum alis *ſuperioribus* e fuſco ſubvireſcens, annulis, maculis et lineis flexis albis, margine albo, punctis nigris maculato; alis *inferioribus* ex albo ſubcoeruleis, retrorſum alis omnibus coeruleſcentibus. (*Walch.*)

69. *Hermelina*, der *gelbe Hermelinvogel.*

*Naturf.* XIV. p. 65. t. 3. f. A. der *gelbe Hermelinvogel.* (D. *Kühn.*)

Alis

*) Dieſer Phaläne gebe ich den Namen *Anceps*, weil ſie von den Bombycibus und Noctuis, von beyden etwas hat: von den erſtern den dicken Hinterleib; von den letztern die Fühlhörner, und den Habitus der Flügel. Nach der ſchönen glatten *Raupe* zu urtheilen, könnte man ihr unter den Eulen kaum die Stelle verſagen.

Alis pallide ſulphureis; *anticis* multis lineis transverſis nigris undulatis, binisque ſtrigis atris dentatis; *poſticis* baſi fuſcis.

70. *Agathina*, das *Achatvöglein.*

*Sulzers* Geſch. p. 160. t. 22. f. 4.

Dunkelgrau mit abwechſelnden braunrothen und grauen Feldern, und grauem Saum oben; unten bräunlichgrau mit wellenförmigen kaum deutlichen Queerlinien.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 145. t. 273. Fig. E. *Foem.* p. 171. t. 288. Fig. A. *Mas.*

71. *Tricolora*, die *amerikaniſche dreyfarbige Eule.*

*Sulzers* Geſch. p. 160. t. 22. f. 5.

Die *Vorderflügel* dunkelbraun, unten ſchwarzbraun, mit einem ſtrohgelben Fleck in der Mitte, und einem kleinern von dem Federſtaub entblöſsten näher gegen dem Ende; die Hinterflügel braunſchwarz, faſt gezähnt, mit drey rothen und einem gelben durchgehenden Fleck.

*Cramer* Pap. exot. Vol. III. p. 125. t. 263. Fig. E. Ph. *Tricolora.*

72. *Bicolora*, die *indianiſche zweyfarbige Eule.*

*Sulzers* Geſch. p. 161. t. 22. f. 6.

Blauſchwarzſpielend, in den Vorderflügeln zwey Queerbänder von weiſſen Flecken, gegen den Leib blaue Streifen, mehrere auf den Hinterflügeln blaulich weiſs, davon die gegen den Leib ganz, die andern in der Mitte getheilt ſind. Die Fühlhörner und das Bruſtſtück ſchwarz und weiſs punktirt, der Hinterleib oben grün und blau ſpielend, unten weiſs.

*Cra-*

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 74. t. 143. Fig. A. Ph. *Bicolora.*

73. *Vlmi*, die *Rüſtereule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 66. A. no. 1.

74. *Tridens*, die *Aprikoſeneule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 67. B. 1) mit einem Auswuchſe auf dem Rücken.
*Réaum.* La Chenille *demi-velue* de l' Abricotier.

75. *Euphorbiae*, die *Wolfsmilcheule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 67. B. 2) die Haare auf Knöpfgen. no. 4.

76. *Megacephala*, die *Weideneule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 67. B. no. 5.

77. *Auricoma*, die *Bocksbeereule.*
*Wiener Schmetterl.* p. 67. B. no. 6.

78. *Vnita*, die *Tanneneule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 68. C. no. 2.
*Geoffr.* Inſ. II. p. 192. no. 24.
*Tinea* alis corpori circumvolutis croceis, oculis pedibusque nigris.
Le *Manteau jaune.*
*Long.* 7. lign.

79. *Eborina*, die *weiſſe gelbgerändete Eule.*
*Wiener Schmetterl.* p. 68. D. no. 5. *Unbekannte Raupe.*

80. *Roſcida*, die *gelbe ſchwarzpunktirte Eule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 68. D. no. 7. *Unbekannte Raupe.*

81. *Marginea*, die *schwarzgrüne gelbgesäumte Eule.*
*Wiener Schmetterl.* p. 69. D. no. 13. *Unbekannte Raupe.*

82. *Palliola*, die *Birneule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 69. E. no. 1.

83. *Strigula*, die *Eicheneule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 69. E. no. 2.

84. *Albula*, die *Bachmünzeneule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 69. E. no. 3.

85. *Ligustri*, die *Hartriegeleule.*
*Wiener Schmetterl.* p. 70. E. no. 1.

86. *Glandifera*, die *blaßscheckichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 70. E. no. 2. *Unbekannte Raupe.*

87. *Perla*, die *perlenfarbene Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 70. E. no. 3. *Unbekannte Raupe.*

88. *Degener*, die *Aepfeleule.*
*Wien. Schmett.* p. 70. E. no. 4.

89. *Runica*, die *Kahneicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 70. F. no. 1.

1) Raupe ohne Spitzen auf dem Hinterleibe.

90. *Culta*, die *Holzbirneule.*
*Wien. Schmett.* p. 70. F. no. 4.

2) *Raupen* mit Spitzen auf dem Hinterleibe.

91. *Comta*, die *schwarzgraue weißmakelichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 70. F. no. 5. *Unbekannte Raupe.*

92. *Conspersa*, die *schwarz- und weißspreckichte weißgefleckte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 71. F. no. 6. *Unbekannte Raupe.*

93. Cal-

93. *Calvaria*, die *schwarzbraune gelbgefleckte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 71. F. no. 9. *Unbek. Raupe.*
3) *Raupen* mit einer stumpfen Erhöhung.

94. *Lucipeta*, die *gelbgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 71. G. No. 2. *Unbek. Raupe.*
2) Mit trübgrauen Flügeln.

95. *Birivia*, die *weißgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 71. G. no. 3. *Unbek. Raupe.*

96. *Pyrophila*, die *dunkelgraugezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 71. G. no. 4. *Unbek. Raupe.*

97. *Candelisequa*, die *schwarzgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 72. G. no. 5. *Unbek. Raupe.*

98. *Cubicularis*, die *Lämmerlatticheule.*
*Wien. Schmett.* p. 72. G. no. 6.

99. *Flavicincta*, die *Kirscheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 72. H. no. 2.

100. *Dysodea*, die *Wildlatticheule.*
*Wien. Schmett.* p. 72. H. no. 5.

101. *Chamomillae*, die *Kamilleneule.*
*Wien. Schmett.* p. 73. I. no. 3.

102. *Tanaceti*, die *Rheinfarneule.*
*Wien. Schmett.* p. 73. I. no. 5.
2) Raupe weiss mit schwarz und gelb.

103. *Linariae*, die *Leinkrauteule.*
*Wien. Schmett.* p. 73. I. no. 6. *Leinkrauteulenraupe* (Antirrhini Linariae).
*Réaum.* Inf. Tom. I. p. 536. (ed. 4.) t. 37. f. 4. 5. 6. 7.

La *Chenille de la Linaire.*

*Réaum.* Inſ. p. 591. f. 4. La *Sang -ſue.*

*Degeer* Inſ Tom. II. P. I. p. 430. no. 5. t. 8. f. 5. 6. *Phalene de la Linaire.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet doublement huppé; à ailes rabatues d'un blanc gris-de-perle à nuances et rayes noirâtres, avec des taches noires le long du bord poſtérieur.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 314. no. 5. t. 8. f. 5. 6. *Leinkrautphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, doppeltem Rückenkamm, und niederhangenden weiſsperlgrauen Flügeln, mit ſchwärzlichen Schattirungen und Streifen, und ſchwarzen Flecken längſt dem Hinterrande.

104. *Lactucae*, die *Latticheule.*
*Wien. Schmett.* p. 74. I. no. 7.

105. *Lithoxylaea*, die *Winterbirneule.*
*Wien. Schmett.* p. 75. K. no. 2.

106. *Petrificata*, die *Steineicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 75. K. no. 3.

107. *Rizolitha*, die *Weißeicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 75. K. no. 6.

108. *Conformis*, die *Ellerbaumeule.*
*Wien. Schmett* p. 76. K. no. 7.

109. *Pulla*, die *Schwarzeicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 76. K. no. 8.

110. *Hyperici*, die *Johanniskrauteule.*
*Wien. Schmett.* p. 76. K. no. 10.

111. *Inſtabilis*, die *Mandelneule.*

*Wien.*

*Wien. Schmett.* p. 76. L. no. 1.
1) Die *Raupen* grün.

112. *Stabilis*, die *Lindeneule.*
*Wien. Schmett.* p. 76. L. no. 2.

113. *Humilis*, die *Löwenzahneule.*
*Wien. Schmett.* p. 76. L. no. 3.

114. *Gracilis*, die *Weidericheule.*
*Wien. Schmett.* p. 76. L. no. 4.

115. *Lychnidis*, die *Wiederstoßeule.*
*Wien. Schmett.* p. 76. L. no. 5.

116. *Munda*, die *Gartenbirneule.*
*Wien. Schmett.* p. 76. L. no. 7.
2) *Raupen* bräunlich.

117. *Blanda*, die *fahle weißlichgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 77. L. no. 8. *Unbek. Raupe.*

118. *Cruda*, die *Eichbuscheule.*
*Wien. Schmett.* p. 77. L. no. 9.

119. *Ambigua*, die *röthliche hellgraugezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 77. L. no. 10. *Unbek. Raupe.*

120. *Advena*, die *Mayeneule.*
*Wien. Schmett.* p. 77. L. no. 11.
3) *Raupen* lichtgrau.

121. *Pistacina*, die *Flockenkrauteule.*
*Wien. Schmett.* p. 77. M. no. 1.
1) Mit schwärzlichen Punkten am Aussenrande.

122. *Baja*, die *Tollkrauteule.* (Atropae Belladonnae.)
*Wien. Schmett.* p. 77. M. no. 3.

123. *Rubricosa*, die *Grindwurzeule.*
*Wien. Schmett.* p. 77. M. no. 4.

124. *Erythrocephala*, die *Spitzwegericheule.*
*Wien. Schmett.* p. 77. M. no. 5.

125. *Sigma*, die *Gartenmeldeeule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 8.
2) Mit ſchwarzen Fleckchen im Mittelraume.

126. *Nun atrum*, die *Klebekrauteule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 9.

127. *I cinctum*, die *röthlichgraue bogenſtriemige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 10. *Unbek. Raupe.*

128. *Characterea*, die *Waldkicherneule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 11.

129. *Baſilinea*, die *fahle geradſtriemige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 12.

130. *Ypſilon*, die *Sarbaumeule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 13.

131. *Forcipula*, die *weiſsgraue kreuzſtriemige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 14. *Unbek. Raupe.*

132. *Rectangula*, die *Siebengezeiteule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 15.

133. *Polygona*, die *Breitwegericheule.*
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 16.

134. *Secalis*, die *Rockenhalmeule.* *)
*Wien. Schmett.* p. 78. M. no. 17. (Secalis cerealis *intra culmos habitans.*)
*Linn.* Syſt. Nat. ed. 10. p. 519. (ed. Hal.) no. 126. Ph. *Secalis.*

Spiri-

*) *Müllers* Secalis F. Fr. p. 46. no. 410. ſcheint denn doch von dieſer noch verſchieden zu ſeyn.

Spirilinguis criſtata, alis deflexis, *ſuperioribus* griſeo-fuſcis ſtriatis; macula reniformi *A latino.*

*Abhandl.* der ſchwed. Akad. der Wiſſ. XIV. p. 67. die Raupe in den *weiſſen Aehren* (*Rolander*).

*Phalaena* ſeticornis, ſpirilinguis, faſciculata; alis depreſſis griſeo-fuſcis, ſtriatis, *A latino* inſcriptis.

135. *Subſequa*, die *Vogelkrauteule.*
*Wien. Schmett.* p. 79. M. no. 21.

136. *Linogriſea*, die *veilgraulichte braungerändete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 79. M. no. 22. *Unbek. Raupe.*

137. *Flammatra*, die *graubraune flammenſtriemigte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 80. N. no. 1. *Unbek. Raupe.*
1) Mit ſchwarzem Halskragen.

138. *Cinerea*, die *aſchengraue feingeſtreifte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 80. N. no. 3. *Unbek. Eule.*

139. *Suffuſa*, die *Gänſediſteleule.*
*Wien. Schmett.* p. 80. N. no. 4.

140. *Obeliſca*, die *rehfarbige blaßgerändete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 80. N. no. 5. *Unbek. Raupe.*
2) Mit hellen oder deutlichen Ring- oder Nierenmakeln.

141. *Aquilina*, die *adlerbraune ſchwarzgezähnte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 80. N. no. 6. *Unbek. Raupe.*

142. *Ravida*, die *wolfsfarbige wellenſtrichige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 80. N. no. 7. *Unbek. Raupe.*

143. *Signifera*, die *Türkenkressenenule.*
*Wien. Schmett.* p. 80. N. no. 8.

144. *Valligera*, die *hornfarbige kleinmakelichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 80. N. no. 9. *Unbek. Raupe.*

145. *Testacea*, die *sandfarbige kleinmaklichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 11. *Unbek. Raupe.*

146. *Segetum*, die *Wintersaateule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 12. *Wintersaateulenraupe* (Secalis cerealis gramine et radice). tab. 1. a. f. 3. *Raupe.* tab. 1. b. f. 3. *Vogel.*

147. *Corticea*, die *rindenfarbene kleingestrichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 13. *Unbek. Raupe.*

148. *Coecimacula*, die *Sichelkrauteule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 14.

149 *Radicea*, die *Graswurzeneule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 15.

150. *Lutulenta*, die *braunschwarze blaßgestrichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 16.

3) Mit verfinsterten Makeln.

151. *Sordida*, die *erdfarbene mattgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 17. *Unbek. Raupe.*

152. *Fumosa*, die *rauchfarbene weißgezähnte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 18. *Unbek. Raupe.*

153 *Furva*, die *Kletteneule.*
*Wien. Schmett.* p. 81. N. no. 19.

4) Mit zweydeutiger Zeichnung.

154. *Anceps*, die *honigbraune weißadrigte Eule.*

*Wie-*

*Wiener Schmetterl.* p. 81. N. no. 22. *Unbekannte Raupe.*

155. *Cespitis*, die *Wasengraseule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 2.
1) Die Oberflügel schwärzlich mit gelber Zackenlinie.

156. *Leucophaea*, die *Tausendblatteule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 5.
2) Graulich mit weissen Linien.

157. *Chenopodii*, die *Gänsefußeule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 6.

158. *Contigua*, die *Gutheinricheule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 7.

159. *Dentina*, die *bräunlichgraue zahnmaklichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 8. *Unbek. Raupe.*

160. *Caesia*, die *blaulichtgraue düsternfleckichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 9. *Unbek. Raupe.*

161. *Prasina*, die *Meerrettigeule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 10.
3) Grüngemischt.

162. *Thalassina*, die *Flechteneule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 13.

163. *Brunnea*, die *Stockerbseneule.*
*Wien. Schmett.* p. 82. O. no. 15.
4) Rothbraun.

164. *Porphyrea*, die *purpurbraune dunkelspreckichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 83. O. no. 17.

165. *Suasa*, die *Steinkleeeule.*
*Wien. Schmett.* p. 83. O. no. 18.

166. *Xanthographa*, die *kastanienbraune gelbgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 83. O. no. 20. *Unbek. Raupe.*

167. *Leucographa*, die *veilbraune weißlich gezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 83. O. no. 19. *Unbek. Raupe.*

168. *Satura*, die *purpurschwärzliche Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 83. P. no. 2. *Unbek. Raupe.*

169. *Serena*, die *perlweisse hellbraunstreifige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. P. no. 4. *Unbek. Raupe.*

170. *Cucubali*, die *Gliedereicheule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. P. no. 5.

171. *Capsincola*, die *Lychnissaameneule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. P. no. 6.

172. *Protea*, die *Zerreicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. P. no. 7.

173. *Convergens*, die *Zwergeicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. P. no. 8.

174. *Filicea*, die *Farrenkrauteule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. P. Anm. auf der Pteris aquilina.
*Albin.* Inf. t. 75. fig. e f g h.

175. *Acetosellae*, die *Schafampfereule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. Q. no. 1.
1) Mit zwo düstern am Innenrande zusammengeneigten Queerlinien.

176. Co-

176. *Conigera*, die *rothgelbe weißgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. Q. no. 3. *Unbek. Raupe.*

177. *Albipuncta*, die *Wegericheule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. Q. no. 4.

178. *Trilinea*, die *weißliche dreygestreifte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 84. Q. no. 5. *Unbek. Raupe.*

179. *Aenea*, die *erzfarbige gemeinstreifige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 85. Q. no. 6. *Unbek. Raupe.*

180. *Communimacula*, die *leibfarbene braunmaklichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 85. Q. no. 7. *Unbek. Raupe.*
2) Ohne Queerstriche.

181. *Pudorina*, die *weißliche rothgemengte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 85. Q. no. 11. *Unbek. Raupe.*

182. *Nervosa*, die *lichtgraue geradstriemigte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 85. Q. no. 12. *Unbek. Raupe.*

183. *Livida*, die *griechenblaue Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 85. Q. no. 13. *Unbek. Raupe.*

184. *Silene*, die *Feldkohleule.*
*Wien. Schmett.* p. 85. R. no. 1.

185. *Polita*, die *dunkelbraune glänzende Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 85. R. no. 3. *Unbek. Raupe.*

186. *Nitida*, die *Ehrenpreiseule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. R. no. 4.

187. *Spadicea*, die *Schafzungeneule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. R. no. 6.

188. *Ferruginea*, die *okerbraune röthlichgestrichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. R. no. 7. *Unbek. Raupe.*

189. *Rubiginea*, die *Holzäpfeleule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. R. no. 8.

190. *Croceago*, die *Traubeneicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. S. no. 2.

191. *Rutilago*, die *Pappelweideneule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. S. no. 3.

192. *Flavago*, die *Königskerzeneule.*
*Wien. Schmetterl.* p. 86. S. no. 4.

193. *Luteago*, die *oraniengelbe hellfleckige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. S. no. 5. *Unbek. Raupe.*

194. *Aurago*, die *goldgelbe hellstriemige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. S. no. 6. *Unbek. Raupe.*

195. *Sulphurago*, die *hellgelbe schwarzspreckichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 86. S. no. 7. *Unbek. Raupe.*

196. *Cerago*, die *Palmweideneule.*
*Wien. Schmett.* p. 87. S. no. 8.

197. *Gilvago*, die *trübgelbe wellenstriemigte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 87. S. no. 9. *Unbek. Raupe.*

198. *Flammea*, die *blaßgoldfarbene rothgewässerte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 87. T. no. 3. *Unbek. Raupe.*
1) Die Oberflügel gelblicht.

199. *Ochroleuca*, die *gelbbräunliche weißgemischte Eule.*

*Wien.*

*Wien. Schmett.* p. 87. T. no. 4. *Unbekannte Raupe.*

200. *Or*, die *Alberneule.*
*Wien. Schmett.* p. 87. T. no. 5.
2) Graulicht.

201. *Diluta*, die *graugewässerte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 87. T. no. 6. *Unbek. Raupe.*

202. *Ruficollis*, die *Wintereicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 87. T. no. 7.

203. *Purpurina*, die *purpurrothgewässerte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 88. T. no. 9. *Unbek. Raupe.*
3) Purpurfarben.

204. *Pyralina*, die *dunkelbraune blaulicht gewässerte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 88. T. no. 12. *Unbek. Raupe.*
4) Rothbraun.

205. *Miniosa*, die *Galleicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 88. T. no. 14.

206. *Strigosa*, die *grünlichbraune graugemischte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 88. T. no. 15. *Unbek. Raupe.*
5) Olivenbraun und wicklerförmig.

207. *Ambusta*, die *Wändeflechteneule.*
*Wien. Schmett.* p. 88. T. no. 16.

208. *Subtusa*, die *Zitterpappeleule.*
*Wien. Schmett.* p. 88. T. no. 17.

209. *La-*

209. *Latruncula*, die *braune rothschielende Eule.* *Wien. Schmett.* p. 89. V. *Grabraupen*, Larvae *Furtivae; kleine Eulen*, N. *Pusillae.* *)

1) Die Flügel schmal. No. 1. *Unbek. Raupe.*

210. *Praeduncula*, die *braune weißgerändete Eule.* *Wien. Schmett.* p. 89. V. no. 2. *Unb. Raupe.*

211. *Furuncula*, die *braune weißstreifige Eule.* *Wien. Schmett.* p. 89. V. no. 3. *Unb. Raupe.*

212. *Raptricula*, die *braungraue schwarzstrichichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 89. V. no. 4. *Unb. Raupe.*

213. *Spoliatricula*, die *Nelkenveileule.* *Wien. Schmett.* p. 89. V. no. 5. *Nelkenveileulenraupe* (Cheiranthi incani).

214. *Fuscula*, die *braune weißgemischte Eule.* *Wien. Schmett.* p. 89. V. no. 6. *Unb. Raupe.*

2) Die Flügel spannerförmig.

215. *Atratula*, die *schwarze weißwechselnde Eule.* *Wien. Schmett.* p. 89. V. no. 7. *Unb. Raupe.*

216. *Candidula*, die *weisse schwarzfleckichte Eule.* *Wien. Schmett.* p. 89. V. no. 8. *Unb. Raupe.*

217. *Scutosa*, die *Eberreißeule.* *Wien. Schmett.* p. 89. W. no. 1.

1) die Oberflügel oliv- oder buntfarbig.

218. *Peltigera*, die *blaßzimmetfarbene randfleckichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 89. W. no. 2. *Unb. Raupe.*

219. *Ono-*

*) Aus dieser Familie hat *Linné* keine einzige.

219. *Ononis*, die *Hauhecheleule.*
*Wien. Schmett.* p. 89. W. no. 4.

220. *Alchymista*, die *schwarze braunlich gerändete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 89. W. no. 5. *Unb. Raupe.*
2) Schwarz, oder schwarzfleckicht. Et p. 150.
*Geoffr.* Inſ. II. p. 149. no. 80. *)
*Phalaena* ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis, undulato-nigris, inferioribus baſi albis.
L' *Alchymiste.*
*Long.* 10. lign.

221. *Luctuosa*, die *Wegebreiteule.*
*Wien. Schmett.* p. 90. W. no. 7.

222. *Solaris*, die *weisse schwarzgemischte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 90. W. no. 8. *Unb. Raupe.*

223. *Rupicola*, die *schwarze weisslich gezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 90. W. no. 9. *Unb. Raupe.*

224. *Promissa*, die *Wolleicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 90. X. no. 6.
2) Mit rothen Unterflügeln.

225. *Hymenaea*, die *Schwarzdorneule.*
*Wien. Schmett.* p. 91. X. no. 8.
3) Mit gelben Unterflügeln, faſt ungezähnt.

226. *Asclepiadis*, die *Schwalbenwurzeule.*
*Wien. Schmett.* p. 91. Y. no. 2.

227. *Cuprea*, die *kupferfarbene dunkelfleckichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 91. Y. no. 3.

228. *Lu-*

*) S. die Anmerk. bey *Leucomelas* L. no. 183. bey der der Ritter dieſe *Geoffroysche* Phaläne zitirt hatte.

228. *Lunaris*, die *Truffeicheneule.*
*Wien. Schmett.* p. 94. A a. no. 1.
1) Mit einer ſchwärzlichen unvollkommenen *Mondmakel* auf den Oberflügeln.

229. *Craccae*, die *Vogelwickeneule.*
*Wien. Schmett.* p. 94. A a. no. 3.

230. *Triquetra*, die *veilgraue dreyeckmaklichte Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 94. A a. no. 6. *Unb. Raupe.*
2) Mit braungelben düſterneblichten Unterflügeln.

231. *Heliaca*, die *kupferbraune mattſtreifige Eule.*
*Wien. Schmett.* p. 94. A a. no. 7. *Unb. Raupe.*

232. *Aſteris*, die *Sternblumeule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 312. no. 10. Fam. I.

233. *Lucifuga*, die *Schildampfereule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 312. no. 11. Fam. I.

234. *Ditrapezium*, die *Wachtelweizeneule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 312. no. 24. Fam. M.

235. *Terſa*, die *fahle gelbgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 312. no. 12. Fam. L. *Unbekannte Raupe.*

236. *Perplexa*, die *mattbraune düſter- und weiſsgeſtrichte Eule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 313. Fam. N. no. 23. *Unbek. Raupe.*

237. *Herbida*, die *Kuhweizeneule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 313. Fam. O. no. 22.

238. *Chrysographa*, die *oranienbraune goldgelb gezeichnete Eule.*
*Wien. Schmetterl.* Nachtr. p. 313. Fam. Q. no. 23. *Unbek. Raupe.*

239. *Decora*, die *glänzendsilbergraue mattgezeichnete Eule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 313. Fam. Q. no. 15. *Unbekannte Raupe.*

240. *Glabra*, die *blaßhonigbraune düsterstriemigte Eule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 314. Fam. R. no. 10. *Unbekannte Raupe.*

241. *Respersa*, die *silberfarbige, düstergewässerte und punktirte Eule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 314. Fam. T. no. 19. *Unbekannte Raupe.*

242. *Festiva*, die *dunkelrothe und perlfarbene Eule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 314. Fam. T. no. 20. *Unbekannte Raupe.*

243. *Bractea*, die *purpurbraune und goldmacklichte Eule.*
*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 314. Fam. Z. no. 7. *Unbekannte Raupe.*
*Knochs* Beytr. zur Insektengeschichte I St. p. 7. t. 1. f. 2. Ph. N. *C aureum.*

Spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus rubescentibus fusco-variis, maculis septem aureis; C aureo inscriptis.

244. *Aemula*, die *fleischfarbene blaßgoldgezeichnete Eule.*

*Wien. Schmett.* Nachtr. p. 314. Fam. Z. no. 8. *Unbekannte Raupe.*

245. *Ochreacea*, der *Ochravogel.*

*Gladbachs* Schmett. p. 24. t. 11. f. 5. 6. *Raupe* unbekannt — des Abends auf den *Specklilien.*

Alis ciliatis; *anticis* ochreaceis, binis punctis fuscis; *posticis* griseo-albis — omnibus nigro-lituratis.

246. *Terrena*, die *schwarze Erdeule.*

*Gladbachs* Schmetterl. p. 39. t. 18. f. 3. 4. *der schwarze Erdvogel. Unbek. Raupe.*

Alis *ciliatis; anticis* fusco-nigris, binis maculis pallidioribus; *posticis* albo-griseis, margine rufescente.

247. *Variegata*, die *Scheckeule.*

*Gladbachs* Schmett. p. 39. t. 18. f. 5. 6. der *rare Scheckflügel. Unbek. Raupe.*

Alis *anticis* viridi-micantibus, basi, fasciisque transversis ferrugineis; *posticis* nigris, *Ypsilon* griseo, nigro-venoso, notatis.

*Schaeff.* Icon. t. 173. f. 2. 3.

248. *Cristata*, die *duppirte Eule.*

*Gladbachs* Schmett. p. 41. t. 19. f. 1. 2. 3. das *Duppe. Unbek. Raupe.*

Alis *anticis* glauco-sulphureis; *posticis* griseo-rubescentibus; *thorace* cristato striato.

249. *Ypsilon album*, die *Eule mit dem weissen Ypsilon.*

*Glad-*

*Gladbachs* Schmett. p. 43. t. 19. f. 6. 7. das *gelbe Ypsilon. Unbek. Raupe.*

Alis concoloribus flavescentibus, *Ypsilon albo.*

250. *Striata*, die *Stricheule.*

*Gladbachs* Schmett. p. 53. t. 24. f. 1. 2. *der gelbe Muschenflügel. Unbek. Raupe.*

Alis concoloribus flavo-rubroque longitudinaliter striatis.

251. *Hermelina*, die *Hermelineule.*

*Gladbachs* Schmett. p. 57. t. 25. f. 1-6. der *rare kleine Hermelinvogel* mit der seltsamen *Katzenkopfraupe.*

Alis *anticis* albo-purpureoque variegatis, lineis transversis aurantiacis; margine cum posticis nigro-punctatis.

252. *Tormentaria*, die *Kanoneneule.*

*Gladbachs* Schmett. p. 63. t. 27. f. 7. 8. der *rare Kanonenvogel. Unb. Raupe.*

Alis concoloribus niveis; *anticis tormento* flavo.

253. *Octogenaria*, die *Achtziger Eule.*

*Gladbachs* Schmett. p. 66. t. 29. f. 1-5. der *Achtziger mit seiner Raupe, Gespinnst und Puppe.*

Alis *anticis* rubescentibus, numero 80 notatis.

254. *Aluco*, die *chinesische Aluko.*

*Fabric.* S. E. p. 591. no. 4. N. *Aluco.*

Alis *patulis*, dentatis, brunneis, nigro-undulatis, maculisque tribus marginalibus fuscis.

255. *Caprimulgus*, der *chinesische Kaprimulgus.*
*Fabric.* S. E. p. 591. no. 5. N. *Caprimulgus.*
Alis *patulis*, dentatis, fuscis, nigro-undulatis; anticis ocello coerulescente.

256. *Ulula*, das *indianische Nachteulchen.*
*Fabric.* S. E. p. 592. no. 6. N. *Ulula.*
Alis *patulis*, dentatis, nigro-undulatis; *anticis* fascia abbreviata alba maculaque subocellari.

257. *Spiralis*, die *chinesische Spirale.*
*Fabric.* S. E. p. 592. no. 7. N. *Spiralis.*
Alis *patulis*, griseo-fuscoque undatis; anticis *linea spirali convoluta* nigra.

258. *Illibata*, der *indianische Randfleck.*
*Fabric.* S. E. p. 592. no. 8. N. *Illibata.*
Alis *patulis* fuscis; macula apicis nigra.

259. *Scrobiculata*, die *ostindianische Höckereule.*
*Fabric.* S. E. p. 592. no. 9. N. *Scrobiculata.*
Laevis, alis *incumbentibus*, subdentatis, griseis, *scrobiculo* baseos nigro; *posticis* vitta marginali atra.

260. *Hybrida*, die *indianische Schneelinie.*
*Fabric.* S. E. p. 593. no. 11. N. *Hybrida.*
Laevis, alis *incumbentibus*; *anticis* flavis; *linea nivea*, limbo pallidiore, fusco-maculato.

261. *Microrrhoea*, der *neuholländische Blutafter.*
*Fabric.* S. E. p. 593. no. 12. N. *Microrrhoea.*
Laevis, alis *incumbentibus*, cinereis; *posticis* rufescentibus; macula atra. — *Abdomen* supra subsanguineum.

262. *Ser-*

262. *Serva*, die *neuholländische Magd.*

*Fabric.* S. E. p. 593. no. 13. N. *Serva.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griseis, punctis strigisque quatuor undatis, fuscis; posticis apice nigris.

263. *Astrea*, die *neuholländische Astrea.* *)

*Fabric.* S. E. p. 594. no. 14. N. *Astrea.*

Laevis, alis incumbentibus, concoloribus, fuscis, disco hyalino; thorace niveo, nigro-punctato.

264. *Quercus*, die *Eicheneule.*

*Fabric.* S. E. p. 594. no. 15. N. *Quercus.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griseis, strigis tribus fuscis.

265. *4-punctata*, die *englische vierpunktirte Eule.*

*Fabric.* S. E. p. 594. no. 16. N. *4-punctata.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griseis, fusco-undatis; *punctis quatuor* marginis exterioris nigris.

266. *Ficus*, die *ostindianische Feigeneule.*

*Fabric.* S. E. p. 595. no. 22. N. *Ficus.*

Laevis, alis *deflexis*, cinereis, basi fulvo-albo-nigroque maculatis; *antennis pectinatis* **), *apice setaceis.*

In *Ficu racemosa* Ind. orient.

267. *Caricae*, der *ostindianische Fünfpunkt.*



*) Diess ist der Sphinx *Astreus* des *Drury.* S. 3 Th. 2 B. p. 218. no. 49.

**) Vielleicht ein *Mittelding* zwischen Bombyx und Noctua.

*Fabric.* S. E. p. 596. no. 23. N. *Caricae.*
Laevis, alis *deflexis*, cinereis, ſtriis punctoque medio albis; *punctis quinque atris.*

268. *Coronata*, die *chineſiſche Kroneneule.*
*Fabric.* S. E. p. 596. no. 24. N. *Coronata.*
Laevis, alis *deflexis*, fuſcis, ſtrigis tribus obſcurioribus ſtigmateque poſtico nigro-punctato.

269. *Leonina*, der *indianiſche Schwarzgürtel.*
*Fabric.* S. E. p. 596. no. 25. N. *Leonina.*
Laevis, alis *deflexis*, brunneis, ſtigmatibus griſeis, poſticis flavis; maculis duabus nigris; *abdomine cingulis nigris.*

270. *Dama*, die *neuholländiſche Dama.*
*Fabric.* S. E. p. 596. no. 26. N. *Dama.*
Laevis, alis *deflexis*, fuſcis, albo-ſtriatis; *poſticis* albis, margine nigro.

271. *Marginata*, der *amerikaniſche Weißrand.*
*Fabric.* S. E. p. 597. no. 27. N. *Marginata.*
Laevis, alis *deflexis* variegatis; *poſticis* atris, *margine albo.*

272. *Sagitta*, die *indianiſche Pfeileule.*
*Fabric.* S. E. p. 597. no. 30. N. *Sagitta.*
Laevis, alis *deflexis*, griſeis: macula magna marginali flava; *poſticis* flavis, apice fuſcis.

273. *Vulpina*, die *oſtindianiſche Vulpina.*
*Fabric.* S. E. p. 598. no. 34. N. *Vulpina.*
Laevis, alis *deflexis; anticis* obſcure cinereis, immaculatis; *poſticis* apice nigris, albo-maculatis.

274. De-

274. *Destituta*, der *chinesische Rauchschenkel.*

*Fabric.* S. E. p. 598. no. 35. N. *Destituta.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griseis, fusco-maculatis; striga alba fuscae innata, submarginali.

275. *Tigrina*, der *ostindianische Tiger.*

*Fabric.* S. E. p. 599. no. 36. N. *Tigrina.*

Laevis, alis *deflexis; anticis* variegatis; *posticis* nigris; fascia maculisque tribus marginalibus albis.

276. *Geometrica*, der *ostindianische Schwarzmakel.*

*Fabric.* S. E. p. 599. no. 37. N. *Geometrica.*

Laevis, alis *deflexis;* macula magna atra, fasciis duabus, anteriore nivea.

277. *Stolida*, die *ostindianische Schneebinde.*

*Fabric.* S. E. p. 599. no. 38. N. *Stolida.*

Laevis, alis *deflexis* fuscis; *fasciis duabus niveis*, posteriore unidentata.

278. *Inclyta*, die *brasilianische Blaubinde.*

*Fabric.* S. E. p. 599. no. 40. N. *Inclyta.*

Laevis, alis *deflexis* fuscis; *strigis tribus coerulescentibus*, brunneae adnatis.

279. *Vndata*, die *ostindianische Wellenbinde.*

*Fabric.* S. E. p. 600. no. 43. N. *Vndata.*

Laevis, alis *deflexis* griseis, *strigis undatis* fuscis; posticis cinereis, fascia marginali nigra.

280. *Vittata*, die *ostindianische Randbinde.*

*Fabric.* S. E. p. 600. no. 44. N. *Vittata.*

Laevis, alis *deflexis* dentatis cinereis; ſtrigis fuſcis, poſticis flaveſcentibus; *vitta marginali atra.*

281. *Frugalis*, die *indianiſche Punktſtreiſe.*

*Fabric.* S. E. p. 601. no. 45. N. *Frugalis.*

Laevis, alis *deflexis* cinereis: faſcia obliqua *ſtrigaque punctorum nigrorum.*

282. *Flava*, der *oſtindianiſche Gelbflügel.*

*Fabric.* S. E. p. 601. no. 46. N. *Flava.*

Laevis, alis *deflexis flavis;* ſtrigis undatis ferrugineis.

283. *Stigmatizans*, der *indianiſche Weiſspunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 601. no. 47. N. *Stigmatizans.*

Laevis, alis *deflexis* angulatis, flavis; ſtrigis obſcurioribus, *ſtigmateque niveo.*

284. *Equeſtris*, das *indianiſche Ritterband.*

*Fabric.* S. E. p. 601. no. 48. N. *Equeſtris.*

Laevis, alis *deflexis* fuſcis; *faſcia lata viridi.*

285. *Rejecta*, der *indianiſche Grünfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 601. no. 49. N. *Rejecta.*

Laevis, alis *deflexis* albis; *macula poſtica vireſcente.*

286. *Litura*, der *oſtindianiſche Grauſtrich.*

*Fabric.* S. E. p. 601. no. 50. N. *Litura.*

Laevis, alis *deflexis; anticis* fuſco-nebuloſis; *litura* maculaque cinereis; *poſticis* niveis.

287. *Augur*, die *teutſche Karaktereule.*

*Fabric.* S. E. p. 604. no. 58. N. *Augur.*

Cri-

Cristata, alis *planis* fuscis, *characteribus atris.*

288. *Mercatoria*, die *ostindianische braune Wellenstreife.*

*Fabric.* S. E. p. 604. no. 59. N. *Mercatoria.*

Cristata, alis *incumbentibus* ferrugineis; *strigis fuscis undatis; posticis* apice nigris, albomaculatis.

289. *Partita*, der *indianische Zirkelfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 604. no. 60. N. *Partita.*

Cristata, alis *incumbentibus* subdentatis griseis; macula baseos atra, stigmatibus duobus brunneis, strigaque media alba.

290. *Pagana*, der *indianische Achtfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 606. no. 68. N. *Pagana.*

Cristata, alis *incumbentibus*, griseo-fuscis; punctis marginalibus fuscis *quinque*, albis *tribus;* posticis albis, fascia nigra.

291. *Orichalcea*, der *indianische Messingfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 607. no. 70. N. *Orichalcea.*

Cristata, alis *deflexis* fuscis; macula magna lunata *orichalcea.*

292. *Signata*, das *indianische goldene Fragzeichen.*

*Fabric.* S. E. p. 608. no. 74. N. *Signata.*

Cristata, alis *deflexis* obscuris, basi nigropunctatis; *signo medio ? aureo* inscriptis.

293. *Peponis*, die *ostindianische Kürbiseule.*

*Fabric.* S. E. p. 608. no. 75. N. *Peponis.*

Cristata, alis *deflexis* griseis, macula apicis dorsalique brunneo-aurea.

In *Peponibus* Indiae orient.

294. *Pauperata*, der *chinesische Glasflügel.*

*Fabric.* S. E. p. 608. no. 77. N. *Pauperata.*

Cristata, alis *deflexis* fuscis, cinereo-variegatis; *posticis albo-hyalinis.*

295. *Lacera*, der *chinesische Schwarzmond.*

*Fabric.* S. E. p. 609. no. 79. N. *Lacera.*

Cristata, alis *deflexis*, fusco-ferrugineoque variegatis, dorso emarginatis, fronte fulva.

Ad angulum ani macula fulva, *lunula nigra.*

296. *Marginata*, der *europäische Braunrand.*

*Fabric.* S. E. p. 610. no. 85. N. *Marginata.*

Cristata, alis deflexis flavescentibus; strigis ferrugineis, postice fuscis.

297. *Mendica*, der *teutsche Bettler.*

*Fabric.* S. E. p. 611. no. 89. N. *Mendica.*

Cristata, alis *deflexis*, pallide incarnatis; macula media fusca, stigmatibus flavis.

298. *Sinuata*, der *indianische Winkelfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 611. no. 92. N. *Sinuata.*

Cristata, alis *deflexis*, basi cinereis, macula magna sinuata nigra.

299. *Histrionica*, der *indianische Harlekin.*

*Fabric.* S. E. p. 612. no. 93. N. *Histrionica.*

Cristata, alis *deflexis* variegatis; posticis albis, striga marginali alba.

300. *Ri-*

300. *Rivularis*, die *sächsische Spaltstreife.*

*Fabric.* S. E. p. 613. no. 99. N. *Rivularis.*

Cristata, alis *deflexis* fuscis; *fascia* grisea, apice *bifida*, flavo-marginata.

301. *Lichenis*, die *teutsche Mooseule.*

*Fabric.* S. E. p. 614. no. 102. N. *Lichenis.*

Cristata, alis *deflexis; anticis* virentibus, maculis variis atris, subtus fuscis.

In Germaniae *Lichenibus.*

Summa affinitas N. *Aprilinae;* at *duplo minor* *), et puncta postica trigona desunt. Antennae fuscae.

302. *Algae*, die *teutsche Steinflechteneule.*

*Fabric.* S. E. p. 614. no. 103. N. *Algae.*

Cristata, alis *deflexis;* anticis fuscis; fasciis duabus viridibus.

In *Lichene saxatili* Germaniae.

303. *Eremita*, der *Leipziger Einsiedler.*

*Fabric.* S. E. p. 616. no. 110. N. *Eremita.*

Cristata, alis *deflexis* ferrugineis; strigis duabus undatis albis: anteriore obsoleta, posteriore repanda.

304. *Tristis*, die *schwedische Trauereule.*

*Fabric.* S. E. p. 617. no. 115. N. *Tristis.*

Cristata, alis *deflexis* cinereis, fusco-subundatis, margineque exteriore punctato, subtus pallidis fascia fusca.

305. *Rurea*, der *englische Dickrand.*

*Fabric.* S. E. p. 618. no. 120. N. *Rurea.*

Cri-

*) An *Ludifica* minor no. 143. β?

Criſtata, alis *deflexis*, griſeo-fuſco-variis; poſticis fuſcis, margine craſſiori albo.

306. *Arbuti*, die *engliſche Arbuteule.*

*Fabric.* S. E. p. 619. no. 122. N. *Arbuti.*

Criſtata, alis *deflexis* fuſcis; *poſticis* nigris, faſcia flava.

307. *Boleti*, die *Löcherſchwammeule.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 282. no. 21-22. N. *Boleti.*

Laevis, alis *depreſſis* planis, fuſco-irroratis; antennis *pectinatis.*

*Kilonii* in Boleto verſicolore.

308. *Vireſcens*, die *amerikaniſche grüne S. Cruxeule.*

*Fabric.* Mant. p. 282. no. 27-28. N. *Vireſcens.*

309. *Monilis*, der *engliſche weiſſe Vierpunkt.*

*Fabric.* Mant. p. 283. no. 42-43. N. *Monilis.*

Laevis, alis *deflexis* brunneis; *punctis quatuor* approximatis *albis*; antennis *pectinatis.*

310. *Lanceolata*, die *teutſche ſchmalflüglichte Eule.*

*Fabric.* Mant. p. 283. no. 50-51. N. *Lanceolata.*

Laevis, alis *lanceolatis* cinereis, *anticis* fuſco-irroratis.

311. *Viminalis*, die *Goldweideneule.*

*Fabric.* Mant. p. 284. no. 67-68. N. *Viminalis.*

Criſtata, alis incumbentibus, baſi fuſcis, ſtrigis undatis fulvis, apice cinereis.

*Röſels* Inſektenbel. III. p. 68. t. 11.

Die

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige blaſsgrüne *Raupe* mit weiſſen Linien, Queerſtreifen und Punkten.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 34. die *blaſsgrüne Raupe* etc.

312. *Rubiginoſa*, die *Roſteule.* *)

*Scop.* Ent. carn. p. 213. no. 525.

*Long.* lin. 6½. *Lat.* 3½.

Alae *anticae* ſupra ferrugineae lunula media nigra.

In *Carnioliae* herbidis.

313. *Clavipalpis*, die *Keulſpitze.*

*Scop.* Ent. carn. p. 213. no. 526.

*Long.* lin. 5½. *Lat.* 3.

Alae *anticae* cervinae; margine craſſiore punctis nigris — *Palpi* clavati, compreſſi.

In agro *Labacenſi.*

314. *Deceptoria*, die *wickelförmige Eule.*

*Scop.* Ent. carn. p. 214. no. 527.

*Long.* lin. 5. *Lat.* 3.

Alae *anticae* albae; margine externo faſciaque lata media eroſa fuſcis.

In Sylveſtribus circa *Idriam.*

Habitus Ph. *Tortricis.*

315. *Ochracea*, die *öſterreichiſche Okereule.*

*Scop.* Ann. 5. hiſt. nat. p. 114. no. 124.

Vix

*) Ich vermuthe, daſs unter den ſogenannten *Ohrvögeln* oder *Niereneulen* verſchiedene von einerley Art doppelt aufgeſtellt ſind, da man ſie nicht ſowohl aus dem Syſtem, als durch den Augenſchein unterſcheiden kann.

Vix minor Ph. *Quadra*, utrinque flava.

Alae *anticae* supra punctis nigris multis; *posticae* utrinque unico submarginali.

In pratis circa *Schemnitzium.*

Non confundenda cum *Mare* Ph. *Lubricipedae.*

316. *Pyrausta*, die *wolgaische Feuereule.*

*Pallas* Reisen I. Anh. p. 20. Ausz. no. 68.

*Noctua.* Affinis Ph. *complanatae* et *rubricolli*, qua triplo maior. *Alae* obsoletius nigrae; *primariae* punctis tribus aterrimis, serie longitudinali aequidispositis. *Secundariae* obsoletiores. Corpus atrum, sed abdomen, sola basi excepta, *igneo colore* fulvum subtus punctis atris. *Vernalis* ad *Volgam* observata.

*Müllers* Suppl. und Reg. B. p. 310. no. 116. c. Ph. *Pyrausta*, die *Frühlingseule.*

317. *Profuga*, der *Flüchtling.*

*Forskähl* Descript. Animal. p. 82. no. 17.

Spirilinguis; laevis, alis *deflexis*, fusco-viridibus; fasciis flavis; *inferioribus* rubris, maculis inaequalibus nigris.

Magn. Ph. *Cajae.*

In *Archipelago* prope insulam *Meteline* excepta in *navi.*

318. *Aureo-maculata*, die *goldmaklichte Eule.*

*Sepp* Nederl. Ins. IV. p. 13. t. 3. de *Goudlakens-Vlinder.*

Cristata; alis *incumbentibus; anticis* pallide fuscis, *aureo-flavo*-maculatis, fasciatisque; *posticis* pallide incarnatis.

*Larva*

*Larva* lignivora, fuſco-alba, atro-punctata. *Pupa* hilare rubra.

319. *Flava*, die *ganz gelbe Waldeule.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 46. no. 407.

Spirilinguis, criſtata; alis omnibus immaculatis *flavis.*

— Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1423. Ph. *flava.*

*Schaeff.* Icon. t. 102. f. 1. 2.

320. *Puſtulata*, die *Pockeneule.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 46. no. 408.

Elinguis criſtata; alis fulvis, maculis *novem* luteis. — In *Nemore.*

321. *Pratenſis*, die *Wieſeneule.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 46. no. 409.

Spirilinguis criſtata; alis fuſceſcentibus, faſciis duabus fuſcis; omnibus ſubtus flavis, macula media nigra.

— Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1424. Phal. *Pratenſis.*

*Schaeff.* Icon. t. 163. f. 4. 5?

322. *Deſolata*, die *Weißwelle.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 47. no. 411.

Spirilinguis criſtata; alis faſcia media undulata *alba; prioribus* faſciis macula baſeos flava: *poſticis* griſeis. — In *Corylo* et *Tilia.*

— Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1426. Phal. *Deſolata.*

*Albin.* Inſ. t. 85.

323. *Jutica*, die *Schlangeneule.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 47. no. 412.

Criſta-

Cristata, alis griseis: *superioribus* strigis *serpentibus* quatuor fuscis; omnibus margine postico maculatis.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1427. Ph. *Jutica.*

324. *Nocturna*, der *Nächtling.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1429.

Spirilinguis cristata; alis denticulatis albidis, fascia lata (medio macula reniformi lutescente), maculisque duabus apicis nigris.

325. *Heteroclita*, die *Raupenkopfeule.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 47. no. 413.

Subcristata; *capite erucae, antennis nullis;* alis albis, lineis transversim undatis punctatisque marginalibus nigris. — In *Epilobio.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1429. Ph. *Heteroclita.*

*Mém. de Mathem. et de Phys. Naturforsch.* Tom. V. p. 508. c. figg. *Découverte* d'un *Papillon à tête de Chenille.*

326. *Bilineata*, die *neuyorkische Doppellinie.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 18. t. 9. f. 3. Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.* Statura Ph. *Pronubae.*

Alis *anticis* cinerascentibus, basi glauco-griseis, binis lineolis transversis nigris; *posticis* glaucescentibus apice fusco-flavis, binis fasciis transversis fusco-nigris.

327. *Flavo-serpentina*, die *neuyorkische Gelbschlange.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 19. t. 9. f. 4. Ses ailes environ *deux pouces.*

Ejusdem *magnitudinis.*

Niger-

Nigerrima, innumeris lineis longitudinalibus, fasciisque transversis nigris; *quatuor lineis serpentinis flavis.*

328. *Incarnato-rubra*, die *neuyorkische fleischfarbigrothe Eule.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 35. t. 18. f. 3. Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.*

Alis *anticis* incarnatis, clavis, triangulis, lineisque longitudinalibus nigris; *posticis* rubris nigro-maculatis.

329. *E latinum*, das *neuyorkische lateinische E.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 36. t. 18. f. 5. Ses ailes environ *un pouce et un quart.*

Alis griseo-albis; *anticis* fasciis transversis latis flavis, nigro-punctatis: E latino fusco, ad marginem anteriorem.

330. *Melicerta*, die *bombayische Melizerta.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 46. t. 23. f. 1. — de *Bombay.**)
— Ses *ailes* environ *deux pouces et demi.*

Alis *anticis* longitudinaliter glauco-striatis, fasciis transversis fulvis, apice striga purpurascente; *posticis* nigris, albo-maculatis.

*Cramer* Pap. exot. Vol. I. p. 96. t. 62. Fig. CD. *Melicerta.* (*Foemina.*) — de la Côte de *Coromandel.*

331. *Epi-*

*) *Drury* hat beyde Phalänen t. 23. f. 1. 2. für einerley ausgegeben; Cramer aber daraus zwo verschiedene Arten gemacht, die aber der Zeichnung nach, besonders seine Epione, mit den Druryschen nicht wohl übereinstimmen.

331. *Epione*, die *neuyorkische Epione.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 46. t. 23. f. 2.
Alis *anticis* nigris, fasciis transversis fulvis; *posticis* concoloribus aterrimis.
*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 9. t. 102. Fig. EF. *Epione* — à la *Nouv. York* et en *Virginie.*

332. *Ferruginea*, die *St. Christophorsche Rosteule.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 47. t. 23. f. 3. Ses ailes environ *deux pouces et demi.*
Alis concoloribus ferrugineis; *anticis* puncto versus marginem nigricante, fasciaque transversa obscuriore.

333. *Horologica*, die *antiguaische Sanduhreule.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 48. t. 23. f. 4.
Alis nigricantibus; *anticis* margine rubrocinctis, medio apicis rubri fascia brevis albissima. Margines rubri cum thorace rubro *horologii* figuram constituunt; inde nomen *Horologica*; *posticis* margine exteriore partim rubro.

334. *Albostrigata*, der *jamaische Weißstrich.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 49. t. 23. f. 5.
Alis fusco-nigris; *anticis* striga longitudinali alba, fasciis transversis undulatis nigris, basin strigae albae tangentibus; *posticis* margine exteriore albis.

335. *Respectabilis*, die *neuyorkische ehrwürdige Eule.**)

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 49. t. 23. f. 6. Ses ailes *deux pouces.*

Alis

*) Gar keine Aehnlichkeit mit Ph. *Paranympha* L. n. 122. *Rösel* IV. t. 18. f. 1. 2.

Alis *anticis* canescentibus nigro-maculatis, totis fere nigris, binis lineis transversis undulatis glaucescentibus, binisque maculis fulvis reniformibus; *posticis* aurantiacis, late nigro-fasciatis.

336. *Hieroglyphica*, die *madrassische Hieroglypheneule.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. p. 3. t. 2. f. 1. Ses ailes *trois pouces et cinq huitiemes.*

Alis concoloribus fusco-nigris; *anticis* binis versus apicem maculis flavissimis contiguis, *serpenteque* in gyrum contracto fusco, canali nigro.

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 119. t. 174. Fig. F. Ph. *Mygdonia* — sur la côte de *Coromandel.* *)

337. *Puella*, das *madrassische Mägdlein.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 3. t. 2. f. 2. Ses ailes *un pouce et un quart.*

Parva. Alis *anticis* albis, fasciis transversis rubris, binisque in medio punctis fuscis; *posticis* rubescentibus, fusco-striatis, margine flavo.

338. *Myrtaea*, die *madrassische Myrtäa.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 4. t. 2. f. 3. Ses ailes *un pouce et un quart.*

Alis concoloribus *rubris*, uncinulis nigris tenuissimis. Parva.



*) Bey der *Cramerschen* hat die *Schlange* auf den Oberflügeln, da, wo sie sich mit dem Schwanze gegen den Kopf krümmet, noch ein *himmelblaues großes lateinisches* D.

339. *Papilionaris*, die *chinesische tagfalterähnliche Eule.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. p. 4. t. 2. f. 4. Ses ailes *trois pouces et presque un quart.*

Habitus *Papilionis Danai Festivi.* Alis nigris, sulphureo-fasciatis maculatisque; margine anticarum anteriore thoraceque glaucescentibus, duodecim in hoc punctis albidis maioribus minoribusque.

340. *Speciosa*, die *sierraleonische Eule.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 8. t. 5. f. 2. Ses ailes *deux pouces et trois quarts.*

Alis *anticis basi* aurantiacis, fusco-punctatis, *medio* pallide flavis, *apice* fuscis; *posticis* concoloribus sulphureis.

341. *Servula*, die *madrassische Servula.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 20. t. 11. f. 4. Ses ailes *deux pouces.*

Alis *anticis* flavis, strigis tribus obsoletis longitudinalibus, margineque exteriore fuscis; *posticis* dimidio albicantibus, dimidio fuscis.

342. *Anilis*, die *virginische alte Frau.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 22. t. 12. f. 3. Ses ailes *un pouce et demi.*

Alis *anticis* furvis binis lituris, fasciisque binis transversis flavissimis; *posticis* pallidioribus.

343. *Amabilis*, die *afrikanische Perl.* *)

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 23. t. 13. f. 3. Ses ailes *un pouce et demi.*

Alis

*) Unstreitig eine Eule mit den schönsten und seltensten Zeichnungen, so klein sie auch ist.

Alis *anticis* rubris, maculis rotundis, partim contiguis, margineque interiore flavissimis; *posticis* luteis, binis in medio maculis, margineque exteriore aterrimis.

344. *Fluctuosa*, die *sierraleonische Wasserwelle.*
*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 24. t. 14. f. 1.
Ses ailes *trois pouces et un huitieme.*
Alis concoloribus fuscis; ubique nigro-undulatis, fasciis binis transversis latis pallidioribus, linea fusca.
*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 118. t. 174. Fig. C. Ph. *Fluctuosa.*

345. *Ministra*, die *neuyorkische Dienerinn.*
*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 25. t. 14. f. 3.
Ses ailes *deux pouces.*
Alis *anticis* ferrugineis, lineis transversis nigris tenuissimis; *posticis* flavicantibus margine aurantiacis.

346. *Chera*, die *surinamische Chera.*
*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 36. t. 20. f. 4.
Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*
Alis concoloribus fusco-canescentibus, *anticis* margine interiore flavis.
*Cramer* Pap. exot. Vol. IV. p. 39. t. 308. Fig. E.

347. *Scolopacea*, die *jamaische Schecke.*
*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 38. t. 22. f. 1.
Ses ailes *trois pouces et trois huitiemes.*
Alis dentatis concoloribus lutescentibus, innumeris lituris, fasciisque nigris undulatis, variegatis.

348. *Sofpeta*, die *jamaifche Sofpeta.*

*Drury* Illuftr. of nat. hift. Vol. II. p. 39. t. 22. f. 3.
Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*

Alis concoloribus flaviffimis, falcato-dentatis, maculis ftriatis fufcis.

349. *Opigena*, die *jamaifche Opigena.*

*Drury* Illuftr. of nat. hift. Vol. II. p. 39. t. 22. f. 4.
Ses ailes *trois pouces et demi.*

Alis falcatis concoloribus fufco-furvis, lineis transverfis undulatis nigris, fafciisque obfcurioribus: *palpis* longioribus.

*Cramer* Pap. exot. Vol. II. p. 118. t. 174. Fig. D. Ph. *Scolopacea* *) — de *Suriname.*

350. *Hercyna*, die *jamaifche Herzyna.*

*Drury* Illuftr. of nat. hift. Vol. II. p. 41. t. 24. f. 1. 2.
Ses ailes *quatre pouces et un quart.*

Magna. Alis denticulatis fufco-furvis, lineis longitudinalibus undulatis nigris; *anticis* difco pallidiore, binis *lunulis* obfcure fufcis.

351. *Edufa*, die *neuyorkifche Edufa.*

*Drury* Illuftr. of nat. hift. Vol. II. p. 42. t. 24. f. 4.
Ses ailes *deux pouces et presque un quart.*

Alis dentatis, concoloribus fufcis, grifeo-albo-variegatis.

352. *Fla-*

*) Das Citatum des Drury bey diefer Scolopacea ift richtig: nämlich II. t. 22. f. 4. wie denn auch beyderley Abbildungen übereinkommen, nur find die fchwarzen Queerlinien in der kramerfchen deutlicher; die Benennung aber Scolopacea ift unrichtig, und aus Verfehen von *Drury* II. t. 22. f. 1. genommen, die ganz anders ausfiehet.

352. *Flavo-maculata*, der *Gelbfleck.*
*Geoffr.* Inſ. II. p. 148. no. 77.
*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis, *ſuperioribus* nebuloſo-fuſcis; *inferioribus* nigris, *macula* margineque luteis.
La *Phalene brune à tache jaune aux ailes inférieures.*
*Long.* 5. *lign.*

353. *Terlineata*, die *Dreylinie.*
*Geoffr.* Inſ. II. p. 148. no. 78.
*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* cinereis, faſciis transverſis fuſcis *e triplici linea* compoſitis.
La *Rayure à trois lignes.*
*Long.* 8. lign.

354. *Undoſa*, die *Welle.*
*Geoffr.* Inſ. II. p. 153. no. 86. t. 12. f. 4.
*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* cinereo-fuſcis; *ſuperioribus* faſcia *undoſa* triplici, punctoque obſcuro marmoratis.
Le *Flot.*
*Long.* 1 pouce.

355. *Bifaſciata*, die *braune Doppelbinde.*
*Geoffr.* Inſ. II. p. 153. no. 87.
*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* albo-flaveſcentibus, *faſcia duplici* transverſa *fuſca.*
La *Phalene blancheatre à deux bandes brunes.*
*Long.* 7. lign.

356. *Margine maculata*, der *Randfleck.*
*Geoffr.* Inſ. II. p. 154 no. 88.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* albido-flaveſcentibus, faſcia marginali oblonga fuſca.

La *tache marginale.*

*Long.* 5. lign.

357. *Decolorata*, die *verbleichte Eule.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 154. no. 90.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis*, albido-fulvis immaculatis.

La *Décolorée.*

*Long.* 7. lign.

*Réaum.* Inſ. I. t. 36. f. 8. 10. 11. 12.

358. *Griſea*, die *kleine graue Eule.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 160. no. 98.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſco-nebuloſis, *ſuperioribus* maculis irregularibus albis.

La *Phalene petit-gris.*

*Long.* 6. lign.

359. *Teſſellata*, der *Würfelſaum.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 161. no. 102.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſco-nebuloſis, *limbo teſſellato;* ſuperioribus macula duplici punctoque albis.

La *Frange bigarrée.*

*Long.* 7. lign.

360. *Atra*, der *Schwarzflügel.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 162. no. 104.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis*, atris, ſingulis macula alba.

La

La *Phalene* noire à une tache blanche sur chaque aile.

*Long.* 6. lign.

361. *Albo-maculata*, der *weisse Doppelfleck.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 163. no. 105.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigris, ſingulis duabus maculis, et lineis undulatis albis.

La *Phalene noire à deux taches blanches ſur chaque aile.*

*Long.* 7. lign.

362. *Albo-lineata*, die *Weißlinie.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 163. no. 106.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigris, lineis punctisque albis.

La *Phalene noire à lignes blanches.*

*Long.* 6. lign.

363. *Albo-faſciata*, die *Weißbinde.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 163. no. 107.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſcis; ſuperioribus faſcia duplici obliqua alba.

La *Phalene brune à deux bandes blanches.*

*Long.* $3\frac{1}{2}$. lign.

364. *Aureo-maculata*, der *Goldfleck.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 165. no. 110.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigro-fuſcis, maculis plurimis albido-flaveſcentibus.

La *plaque dorée.*

*Réaum.* Inſ. I. t. 19. f. 2.

365. *Murina*, die *mausegraue Eule.*

*Degeer* Inſ. Tom. I. Part. I. p. 406. no. 3. t. 6. f. 22.
*Phalene gris-de-ſouris à 4 taches noires.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes croiſées d'un gris de ſouris avec 4 taches irrégulieres noires, à ailes inférieures en partie blanches.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 293. no. 3. t. 6. f. 22. die *mauſefahle Phaläne mit 4 ſchwarzen Flecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern; Saugrüſſel, und gekreuzten mauſefahlen Flügeln mit vier ſchwarzen ungleichen Flecken, und zum Theil weiſſen Unterflügeln.

*Schaeff.* Icon. t. 112. f. 1. 2.

366. *Griſeo-variegata*, die *Grauſchecke.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 410. no. 2. t. 6. f. 23.

*Phalene griſe bigarrée à deux taches blanches ſur chacune.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues griſes tachetées de jaune orange, avec deux grandes taches blanches ſur chacune.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 297. no. 2. t. 6. f. 23. die *graue geſcheckte Phaläne mit zween weiſſen Flecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und niederhangenden grauen, orangegelb gefleckten Flügeln, und zween groſsen weiſſen Flecken auf jedem.

367. *Viridi-obſcura*, die *dunkelgrüne Eule.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 412. no. 5. t. 6. f. 24.
*Phalene verte obſcure à rayes blanches et noires.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un brun verdâtre avec des rayes

ondées

ondées blanches et noires, et deux taches blancheatres au milieu.

*Degeer Ueberſ.* II Th. I B. p. 299. no. 5. t. 6. f. 24. die *dunkelgrüne weiß und ſchwarzgeſtreifte Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und braungrünlichen niederhangenden Flügeln, mit weiſſen und ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und zween weiſslichen Mittelflecken.

368. *Megacephala*, der *Dickkopf.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 413. no. 7. t. 7. f. 9. *Phalene groſſe-tête.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues en toit cendrées, avec des rayes ondées noires et une tache ovale au milieu d'un blanc ſale.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 200. no. 7. t. 7. f. 9. der *Dickkopf.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und aſchgrauen dachförmig niederhangenden Flügeln, mit ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und einem eyförmigen weiſsgraulichen Mittelfleck.

369. *Albo-venoſa*, die *Weißader.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 415. no. 8. t. 7. f. 14. *Phalene griſe à nervures blanches.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues en toit griſes, dont les nervures ſont d'un gris blancheâtre.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 301. no. 8. t. 7. f. 14. die *graue weißadrichte Phaläne.*

Die

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und grauen, dachförmig niederhangenden Flügeln, mit weiſsgraulichen Adern.

370. *Hepatica*, die *leberfarbige Eule.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 417. no. 9. t. 6. f. 25. *Phalene couleur de foye.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un gris couleur de foye luiſant avec deux lignes ondées et deux taches noirâtres.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 303. no. 9. t. 6. f. 25. die *leberfarbige Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und grauen, glänzend leberfarbigen niederhangenden Flügeln, mit zwo gewäſſerten Linien, und zween ſchwärzlichen Flecken.

371. *Hippophäe*, die *Weidendorneule.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 419. no. 11. t. 7. f. 16. *Phalene de l' Hippophäe.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un brun luiſant rouſſâtre avec une ligne transverſe rouſſe, et un gros point noir.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 304. no. 11. t. 7. f. 16. die *Weidendornphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und braunglänzend röthlichen niederhangenden Flügeln mit einer röthlichen Queerlinie, und einem dicken ſchwarzen Punkt.

372. *Cinerea*, die *aſchgraue Eule.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 422. no. 13. t. 7. f. 19. *Phalene cendrée à deux taches couleur de ſouffre.*

*Pha-*

*Phalene* à antennes filiformes rousses, à trompe, à ailes rabatues d'un gris cendré agathe avec des rayes transverses noires, et deux taches couleur de souffre.

*Degeer Uebers.* II Th. I B. p. 306. no. 13. t. 7. f. 19. die *aschgraue Phaläne mit zween schwefelgelben Flecken.*

Die *Phaläne* mit braunröthlichen fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und aschgrauen achatfarbigen, niederhangenden Flügeln, mit schwarzen Queerstreifen, und zween schwefelgelben Flecken.

373. *Ypsilon graecum*, das *griechische Ypsilon.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 423. no. 14. t. 7. f. 23. *Phalene* 8, *ou.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un gris d'agathe à nuances couleur de lilas, et à rayes ondées noirâtres, avec une tache couleur de souffre en 8.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 307. no. 14. t. 7. f. 23. *die 8 Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und achatgrauen, lilafarbigen, schattirten, niederhangenden Flügeln, mit gewässerten schwärzlichen Streifen, und einem schwefelgelben Fleck in Gestalt eines griechischen 8.

374. *Filicis*, die *Farrenkrautphaläne.*

*Degeer* Inf. Tom. II. P. I. p. 435. no. 7 t. 7. f. 26. *Phalene de la Fougere.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues rayées de noir, et

et de gris-de-perle avec deux taches cendrées, et une tache et raye ondée d'un blanc jaunâtre.

*Degeer Uebers.* II Th. I B. p. 317. no. 7. t. 7. f. 26. die *Farrenkrautphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, Rückenkamm, und niederhangenden schwarz- und perlgraugestreiften Flügeln, mit zween aschgrauen und einem weissgelblichen Fleck, und eben dergleichen gewässerten Streife.

375. *Angulata*, die *Eckbrust.*

*Degeer* Ins. Tom. II. Part. I. p. 436. no. 8. t. 8. f. 9. *Phalene ardoisée à corcelet angulaire.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à corcelet huppé et angulaire, à ailes rabatues ardoisées avec des taches d'un gris blancheatre, deux taches rousses et quelques traits noirs.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 318. no. 8. t. 8. f. 9. die *schieferfarbige Phaläne mit eckigem Brustschilde.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, Rückenkamm, eckigem Brustschilde, und niederhangenden schieferfarbigen Flügeln, mit grauweisslichen und zween rostfarbigen Flecken, wie auch einigen schwarzen Strichen.

376. *Reticulata*, die *Netzstreife.*

*Degeer* Ins. Tom. II. Part. I. p. 441. no. 11. t. 7. f. 27. *Phalene brune à rayes grises en réseau.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé et angulaire, à ailes rabatues brunes à nervures et à rayes transverses d'un gris clair.

*Degeer Uebers.* II Th. I B. p. 223. no. 11. t. 7. f. 27. die *braune Phaläne mit grauen netzförmigen Streifen.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, Rückenkamm, eckigem Brustschilde, und niederhangenden achatbraunen Flügeln, mit zwo schwarzen gekrümmten Streifen, und einem dreyeckigen Fleck von gleicher Farbe.

377. *Agrippina*, die *surinamische Agrippina.* *)

*Cramer* Pap. exot. I. p. 136. t. 87. Fig. A. Ph. *Agrippina.*

— — p. 138. t. 88. Fig. A.

Maxima. Alis incarnatis cinerascentibus; lineis innumeris transversis undulatis nigris fulvisque.

*Merian.* Surin. t. 20.

378. *Arnea*, die *surinamische Arnea.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 59. t. 36. Fig. G.

Alis *anticis* virescentibus nigro-venosis, flavo-marginatis: disco flavo-rubro, atro-uncinulato; *posticis* incarnatis.

379. *Cajeta*, die *koromandelsche Kajeta.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 48. t. 30. Fig. AB. *Mas;* Fig. C. *Foemina.*

Alis *anticis* fusco-rubris, margine exteriore albis; *lineis* longitudinalibus arcuatis, albo-punctatis, binisque transversis albis: *maculis* binis oblongis nigris, quatuorque ovatis obscure viridibus;

*) Diese ist nicht *Strix* Linn.

dibus; *posticis* ferrugineis dilute atro-maculatis, punctis marginalibus ochreaceis.

380. *Corinna*, die *surinamische Korinna.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 47. t. 29. Fig. H.

Alis testaceis, aureo-marginatis; *anticis* quatuor lineis transversis *aureis*, coeruleo-terminatis; *posticis* punctis quatuor marginalibus fuscis, binis aureis, et in utraque cyaneum.

381. *Ilus*, die *surinamische Ilus.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 145. t. 95. Fig. E. *Foemina.*

Alis *anticis* furvis, apice littera Y fulva, rubro-punctata; *posticis* rubicundis.

382. *Julia*, die *kapensische Julia.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 11. t. 7. Fig. EF.

Alis fusco-rubris, *anticis* flavo-variegatis; *posticis* concoloribus brunneis.

*Houttuin* Nat. Hist. Tom. I. Part. XII. p. 676. t. 92. f. 6. *Foemina.*

*Müllers* Suppl. und Reg. B. p. 310. no. 193. a. Phal. *Julia*, der *Pinselschwanz.*

383. *Latona*, die *guinéische Latona.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 20. t. 13. Fig. B.

*Magna.* Alis obscure brunneis; *anticis* numero 9 olivaceo, macula media atra, notatis; fasciis transversis, lineisque acute undulatis albis.

384. *Manlia*, die — *Manlia.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 144. t. 92. Fig. A.

*Magna.*

*Magna.* Alis ſubfalcatis fuſco-rubentibus; *anticis* binis maculis obſoletis furvis; *poſticis* baſi fuſco-rubris, medio cyaneo-viridibus, apice purpuraſcentibus.

385. *Menete*, die *weſtindiſche Menete.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 110. t. 70. Fig. D.

Alis *anticis* purpuraſcentibus, binis maculis, lineisque longitudinalibus, binisque transverſis, flavicantibus; *poſticis* luteis marginalibus fuſcis, binis maculis longitudinalibus fuſcis.

386. *Milete*, die *nordamerikaniſche Milete.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 26. t. 18. Fig. D.

Alis concoloribus nigerrimis flavo-maculatis.

387. *Nyſeus*, der *ſurinamiſche Nyſeus.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 119. t. 75. Fig. E.

Alis ſubfalcato-dentatis ciliatis; *anticis* flaveſcentibus, lineis transverſis incarnatis, punctis numeroſis nigris; *poſticis* purpuraſcentibus, baſi margineque flavicantibus.

388. *Ora*, die — *Ora.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 139. t. 88. Fig. B.

Alis rubeſcentibus; *anticis* margine anteriore luteo; binis lineis transverſis, binisque lunulis nigris, puncto atro.

389. *Pomona*, die *koromandelſche Pomona.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 122. t. 77. Fig. C.

*Magna.* Alis *anticis* viridi-albo-fuſcoque variegatis, *virga* fuſca bifurcata; *poſticis* ferrugineo-fuſcis, macula *reniformi* fuſca.

390. *Sybaris*, die *jamaische Sybaris.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. E. *Mas.*

Alis concoloribus nigerrimis, albo-maculatis; tribus anticarum margine anteriore punctis ruberrimis.

391. *Tanais*, die *surinamische Tanais.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 106. t. 68. Fig. D. *Foemina.*

Alis fuscis, flavo-nigroque variegatis.

392. *Tybris*, die *surinamische Tybris.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 145. t. 92. Fig. D.

Alis incarnatis; *anticis* fusco-maculatis punctatisque; *posticis* margine interiore abdomineque aurantiacis.

393. *Timolea*, die *surinamische Timolea.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 127. t. 80. Fig. F.

Alis concoloribus fuscis; *anticis* lineis transversis undulatis canescentibus.

394. *Admirabilis*, die *surinamische Wundereule.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 11. t. 103. Fig. G.

Alis *anticis* albo-flavis, puncto ocellari albo, maculisque ovatis pellucidis; *posticis* niveis, abdomine rubro, albo-punctato.

395. *Amphix*, die *koromandelsche Amphix.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 59. t. 134. Fig. C.

Alis *denticulatis*; *anticis* incarnatis, tribus medio punctis nigris, in triangulo positis, margine interiore atro-punctato; *posticis* albo-furvis.

396. *Asylas*, die *kapensische Asylas.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 62. t. 137. Fig. C.

Alis incarnatis; *anticis* atro-lituratis, fascia longitudinali albicante.

397. *Bajularia*, die *amboinische Bajularia.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 115. t. 172. Fig. C.

Alis *anticis* furvis, binis maculis fasciaque transversa albis; *posticis* flavis atro-maculatis fasciatisque.

398. *Caffraria*, die *kaffersche Eule.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 82. t. 147. Fig. F.

Alis furvis; *anticis* flavo-atroque variegatis, punctis marginalibus atris; *posticis* albis, fusco-marginatis.

399. *Capensis*, die *Kapeule.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 109. t. 167. Fig. C.

Alis concoloribus fuscis; *anticis* lineis fasciisque albis variegatis.

400. *Chlorea*, die *surinamische Chlorea.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 12. t. 104. Fig. C.

Alis furvis; *anticis* nigro-flavoque variegatis, *tridente rubro.*

401. *Cocalus*, der *ostindianische Kokalus.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 59. t. 134. Fig. B.

Alis *anticis* viridibus, fusco-lineatis; *posticis* aurantiacis, margine nigris.

402. *Collusoria*, die *surinamische Collusoria.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. F.

Alis furvis; *anticis* fascia longitudinali undulata obscuriore; *posticis* aurantiacis, margine aterrimo, binis figuris atris, *catulum* referentibus.

403. *Cresus*, die *berbizéische Kresuseule.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 72. t. 142. Fig. C.

Alis *anticis* fuscis, atro-argenteoque punctatis; *posticis* incarnato-flavis.

404. *Dolon*, der *surinamische Dolon.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 7. t. 101. Fig. DE. *Foemina*; Fig. F. *Mas.*

*Foem.* Alis nigricantibus, linea transversa albidissima; *anticis* glauco-maculatis; *posticis* fusco-cyaneis, fusco-punctatis.

*Mas.* Alis furvis, apice binis maculis incarnatis, lineisque transversis undulatis albis.

405. *Hermonia*, die *koromandelsche Hermonia.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 119. t. 174. Fig. E.

Alis fusco-nigris; *anticis* fascia transversa brevi alba, flavo-marginata; binisque lunulis glaucis, medio luteis.

406. *Hieroglyphica*, die *kurakaische Bildereule.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 81. t. 147. Fig. D.

Alis *anticis* hieroglyphicis, viridi-flavoque lineatis, trina punctorum atrorum serie marginali; *posticis* fuscis.

407. *Juturna*, die *surinamische Juturna.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 48. t. 129. Fig. E.

Alis brunneis; *anticis* flavo-fasciatis, binisque

que litteris O fuſcis, flavo-marginatis; *poſticis* brunneis concoloribus.

408. *Lelex*, die *ſurinamiſche Lelex.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. C.

Alis luteis, nigro-venoſis.

409. *Lepida*, die *bengaliſche Lepida.*

*Cramer* Pap. exot. exot. II. p. 50. t. 130. Fig. E.

Alis *anticis* viridi-fuſcis; *poſticis* fuſco-rubentibus, baſi flavicantibus.

410. *Levida*, die *ſurinamiſche Levida.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 46. t. 128. Fig. D. *Foemina.*

Alis concoloribus purpuraſcentibus, transverſe nigro-lineatis.

411. *Macarea*, die — *Makarea.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 17. t. 107. Fig. F.

Alis nigerrimis, baſi cyaneo-radiatis; *anticis* faſcia transverſa alba, latere uno rubro-marginato; *poſticis* binis maculis rubris.

412. *Macaria*, die *ſurinamiſche Makaria.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 48. t. 129. Fig. D.

Alis fuſcis, viridi-micantibus, linea transverſa, rubro-alba, margine exteriore lato rubente, atro punctato.

413. *Modeſta*, die *ſurinamiſche Modeſta.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 28. t. 115. Fig. C.

Alis *anticis* furvis, macula marginali ſanguinea; *poſticis* rubeſcentibus.

414. *Mygdon*, der — *Mygdon.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 94. t. 156. Fig. G.

Alis *anticis* nigris, triangulo furvo, baſi aurantiaco, lateribus albicantibus; *poſticis* incarnatis.

415. *Mygdonia*, die *koromandelſche Mygdonia.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 119. t. 174. Fig. F.

Alis nigro-furvis; *anticis* binis lineis transverſis luteis, medio interruptis, litteraque D cyanea, annulis fuſcis incluſa.

416. *Onytes*, die *ſurinamiſche Onytes.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 107. t. 165. Fig. E.

Alis *anticis* fuſco-rubris; *poſticis* pallide fuſcis, omnibus flaviſſime marginatis.

417. *Orodes*, die *ſurinamiſche Orodes.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 49. t. 129. Fig. F.

Alis concoloribus brunneis; *poſticis* binis faſciis coeruleis ad marginem exteriorem.

418. *Orſa*, die *ſurinamiſche Orſa.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 75. t. 143. Fig. F.

Alis niveis; *anticis* ocellis fuſcis pellucidis, margine exteriore linea fuſca undulata, abdomine aurantiaco atrò-annulato.

419. *Perithea*, die *amboiniſche Perithea.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. D.

Alis fuſceſcentibus, baſi faſciaque transverſa flaviſſimis.

420. *Phaſis*, die *ſurinamiſche Phaſis.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 106. t. 165. Fig. B.
Alis *anticis* marmoratis, lineis transversis atris undulatis; *posticis* olivaceis, binis fasciis transversis luteis.

421. *Procus*, der *surinamische Prokus*.

*Cramer* Pap. exot. II. p. 85. t. 149. Fig. G.
*Magna*. Alis *anticis* violaceis fusco-lituratis, littera d fusca insignitis; *posticis* aurantiacis, binis fasciis latis nigris sinuosis, medio continuis.

422. *Priverna*, die *surinamische Priverna*.

*Cramer* Pap. exot. II. p. 108. t. 166. Fig. E.
Alis violaceis, fasciis binis transversis flavissimis, lineisque luteis longitudinalibus partim concatenatis; *posticis* aurantiacis, margine purpurascentibus.

423. *Puera*, die *surinamische Puera*.

*Cramer* Pap. exot. II. p. 10. t. 103. Fig. DE.
Alis supra, *anticis* cinereo-glaucis, margine anteriore rubro-punctatis; *posticis* nigerrimis, flavo-rubroque maculatis; subtus rubris, flavoatroque maculatis.

424. *Pyrgo*, die *surinamische Pyrgo*.

*Cramer* Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. D.
Alis *anticis* concoloribus castaneis, margine anteriore albo; *posticis* fuscis, maculis mediis flavis.

425. *Retorta*, die *koromandelsche Retorte*.

*Cramer* Pap. exot. II. p. 29. t. 116. Fig. D. *Mas*.

Alis fuſco-nigris; *anticis Retorta* chymica.
*Clerk* Icon. t. 54. f. 2. 3.
*Cramer* Pap. exot. III. p. 146. t. 274. Fig. A. *Foemina.*

426. *Salaminia*, die *ſurinamiſche Salaminia.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 117. t. 174. Fig. A.
Alis *anticis* viridibus, margine anteriore rubro-lituratis, faſcia longa lata incarnata, venis nigris, binis ſanguineis, margine exteriore fuſco-rubro, glauco-albo; *poſticis* luteis nigromarginatis, binis in medio uncis nigris.
*Clerk* Icon. t. 48. f. 5. 6.

427. *Sicheas*, der *ſurinamiſche Sicheas.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 86. t. 150. Fig. E.
Alis fuſcis, rubro-transverſe lineatis; *poſticis* flavo-fuſcis.

428. *Suero*, die — *Suero.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 3. t. 97. Fig. F.
Alis nigricantibus, lineis transverſis coeruleis interruptis, margine anteriore antice incarnato, lineola marginali communi ferruginea.

429. *Tages*, die — *Tages.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. D.
Alis furvis, glauco-maculatis.

430. *Tarchon*, die *ſurinamiſche Tarchon.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. G.
Alis *falcatis* concoloribus, obſolete-fuſcis.

431. *Tirhaca*, die *kapenſiſche Tirhaka.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. E.

Alis *anticis* viridibus, binis maculis fuſcis, margine exteriore fuſco, lineis transverſis rubris undulatis; *poſticis* luteis fuſco-maculatis.

432. *Uſeus*, der *ſurinamiſche Uſeus.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. E.

Alis furvis; *anticis* binis maculis glaucis, lineola transverſa glauca communi.

433. *Venulia*, die — *Venulia.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 107. t. 165. Fig. D.

Alis *anticis* atro-punctatis, binis faſciis acuminatis, rubro-marginatis, puncto diaphano; *poſticis* luteis binis punctis margineque nigris.

434. *Acron*, der *berbizéiſche Akron.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 59. t. 227. Fig. B.

Alis fuſcis; *anticis* nigro-hieroglyphicis, margine punctis pallidioribus.

435. *Adiutrix*, die *ſurinamiſche Adjutrix.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 144. t. 272. Fig. E F.

Alis *anticis* rubellis, nigro-maculatis; *poſticis* pallide fuſcis.

436. *Amando*, die *ſurinamiſche Amando.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. E.

Alis fulvis concoloribus, fuſco-maculatis punctatisque; *anticis* falcatis.

437. *Ammonia*, die *koromandelſche Ammonia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 98. t. 250. Fig. D.

Alis fuscis; *anticis* areis furvis, flavis fasciis transversis.

438. *Archesia*, die *koromandelsche Archesia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 145. t. 273. Fig. G.

Alis obscure aurantiacis, atro-lineatis fasciatisque.

439. *Caraenea*, die *batavische Karänea.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 140. t. 269. Fig. EF.

Alis furvis; nigro-venosis, margine postico communi fusco-incarnato, atroque punctato.

440. *Cephise*, die *ostindianische Zephise.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 59. t. 227. Fig. C.

Alis fuscis; *anticis* medio furvis, fascia transversa flava, margine atro-punctatis.

441. *Cupentia*, die *surinamische Kupentia.*

*Cramer* Pag. exot. III. p. 103. t. 252. Fig. E.

Alis *anticis*, fusco-alboque variegatis; *posticis* concoloribus fuscis.

442. *Cyllaria*, die *koromandelsche Zyllaria.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 100. t. 251. Fig. CD.

Alis *anticis* furvis, gagatheo-variegatis; *posticis* purpurascentibus, tribus signaturis albis.

443. *Emmedonia*, die *virginische Emmedonia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. D.

Alis fuscis; *anticis* basi macula, medio fascia, margine 9 lituris transversis obscurioribus; *posticis* subdentatis, viridi-incarnatis: abdomine *sphegiformi.*

444. *Epopea*, die *ſurinamiſche Epopea.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 144. t. 272. Fig. G H.

Alis *anticis* incarnatis, baſi maculis ocellatis, verſusque marginem transverſis latis — nigerrimis; *poſticis* incarnato-fuſcis.

445. *Erichtea*, die *virginiſche Erichtea.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. E.

Alis concoloribus fuſcis, nigro-venoſis; *anticis* binis *bacillis*, *malleisque*, ſcapo obliquo — nigris.

446. *Ezea*, die *guineiſche Ezea.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 78. t. 239. Fig. D.

Alis furvis; *anticis* maculis, lineisque transverſis undulatis nigris; *poſticis* maculis marginalibus flavis.

447. *Filia*, die *kapenſiſche Tochter.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. D.

Alis *anticis* aurantiaco-canis, maculis marginalibus albis; *poſticis* albo-canis.

448. *Grynea*, die *virginiſche Grynea.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 29. t. 208. Fig. H.

*Het virginiſch geele Weskind.* *)

*La Likenée jaune de la Virginie.*

Alis *anticis* caneſcentibus, binis in utraque litteris Y albicantibus; *poſticis* aurantiacis nigroſignatis.

449. *Hyppaſia*, die *koromandelſche Hyppaſia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 99. t. 250. Fig. D.

Alis

*) Im Gegenſatz der *Paranympha* L.

Alis incarnatis; *anticis* triangulo furvo, albo-fasciato.

450. *Inara*, die *koromandelsche Inara.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 78. t. 289. Fig. E.

Alis testaceis; *anticis* basi albicantibus, maculisque fuscis triangularibus.

451. *Luminosa*, die *javanische Lichteule.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 147. t. 274. Fig. D.

Alis furvis; *anticis* basi purpurascentibus, lunulis albis, albo-punctatis, binis margine litteris U albis; *posticis* lineis transversis undulatis nigris.

452. *Marthesia*, die *virginische Marthesia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 127. t. 264. Fig. B.

Alis flavo-incarnatis; *anticis* maculis triangularibus liturisque nigris.

453. *Materna*, die *koromandelsche Materna.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 137. t. 267. Fig. E.

*Magna.* Alis viridi-micantibus fusco-lituratis, alboque longitudinaliter fasciatis; tribus globulis brunneis; *posticis* aurantiacis, binis in medio globulis atris, margineque sinuato nigerrimo.

454. *Neptis*, die *surinamische Neptis.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. F.

Alis ferrugineis albo-maculatis.

455. *Nitida*, die *surinamische Glanzeule.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 147. t. 274. Fig. F.

Alis

Alis *anticis* fulvis, rubro-punctatis, maculis bacillisque transversis olivaceis, quatuor maculis ovatis albis continuis; *posticis* hilare rubris albo-marginatis.

456. *Obscura*, die *koromandelsche Düstereule.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 146. t. 274. Fig. B.

Alis obscure fuscis, fasciis lineisque longitudinalibus et transversis nigerrimis; *anticis* macula obsolete fusca, uno latere albo-nigra.

457. *Ocellata*, die *surinamische Augeneule.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 151. t. 276. Fig. D. *Foemina*; Fig. E. *Mas.*

Alis *anticis* fusco-olivaceis, *posticis* pallidioribus: ocello nigro, albo-pupillato.

458. *Orosia*, die *koromandelsche Orosia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. D.

Alis *anticis* fusco-incarnatis, triangulo obtuso furvo, albo-marginato; *posticis* aurantiacis fusco-marginatis.

459. *Soror*, die *surinamische Schwester.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 150. t. 276. Fig. B.

Alis *anticis* fusco-purpurascenti-nigris, basi aurantiaco-striatis, *posticis* furvis binis maculis aurantiacis.

460. *Spadix*, die *virginische Spadix.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. F.

Alis *anticis* obscure fuscis, lineis transversis ferrugineis, binis ad marginem punctis nigris; *posticis* pallidioribus.

461. *Ti-*

461. *Timais*, die *koromandelſche Timais.*
*Cramer* Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. B.
Alis anticis olivaceis maculis coadunatis incarnatis, binis ocellis nigris, iride aurantiaca, punctisque marginalibus aurantiacis; *poſticis* caneſcentibus.

462. *Umminia*, die *javaniſche Umminia.*
*Cramer* Pap. exot. III. p. 137. t. 267.
Alis olivaceo-rubeſcentibus, *anticis* ſubfalcatis, binisque maculis coadunatis albis, annulo medio aurantiacis.

463. *Vxor*, die *ſurinamiſche Gattinn.*
*Cramer* Pap. exot. III. p. 150. t. 276. Fig. A.
Alis olivaceis; *anticis* fulvo-coeruleoque variegatis, binis punctis albiſſimis; *poſticis* obſcurioribus, binis maculis aurantiacis.

464. *Vidua*, die *guineiſche Wittwe.*
*Cramer* Pap. exot. III. p. 127. t. 264. Fig. C.
Alis *anticis* luteo-fuſcis; *poſticis* incarnatis nigro-venoſis.

465. *Virbia*, die *koromandelſche Virbia.*
*Cramer* Pap. exot. III. p. 146. t. 273. Fig. H.
Alis incarnatis, *anticis* fulvo-punctatis, linea transverſa nigra, antice furcata; *poſticis* binis faſciis acute undulatis.

466. *Schneideriana*, die *ſurinamiſche Schneidereule.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 37. t. 308. Fig. A.
Alis furvis, *anticis* baſi nigro-punctatis ſtri-
atisque,

atisque, margine atra lunulatis; *posticis* transverſe atro-lineatis.

467. *Stenelea*, die *ſurinamiſche Stenelea.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 38. t. 308. Fig. B.
Alis teſtaceis, numeroſe atro-lituratis, omnibus ciliatis, linea marginali undulata nigra.

468. *Herilia*, die *ſurinamiſche Herilia.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 39. t. 309. Fig. A. *Mas.* B C. *Foemina.*
Magna. Alis concoloribus furvis, lineis transverſis atris undulatis; *anticis* ocellis, maculis reniformibus, ſquamisque papilionaceis atris.

469. *Helima*, die *afrikaniſche Helima.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 40. t. 309. Fig. D.
Alis concoloribus fuſco-nigris, lineis faſciisque longitudinalibus pallidioribus.

470. *Sterope*, die *ſurinamiſche Sterope.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 40. t. 309. Fig. E. *Femina.* p. 47. t. 312. Fig. C. *Mas.*
Alis concoloribus luteis nigro-lineatis punctatisque; *anticis* binis maculis marginalibus aurantiacis, nigro-atomatis lineola alba.

471. *Politia*, die *ſurinamiſche Politia.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 41. t. 309. Fig. F.
Alis albis nigro-lineatis punctatisque.

472. *Stolliana*, die *ſurinamiſche Stolliana.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 41. t. 310. Fig. A B.
Alis *anticis* brunneis, nigro-faſciatis punctatisque;

tisque; *posticis* purpurascentibus, disco aurantiaco, basi abdomineque coeruleis.

473. *Ebalea*, die *surinamische Ebalea.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 41. t. 310. Fig. C.
Alis fuscis, *anticis* ocello furvo, margine ferrugineo; *posticis* pallidioribus.

474. *Androgea*, die *surinamische Androgea.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. D.
Alis *anticis* olivaceis, mirifice variegatis; *posticis* albido-rutilantibus.

475. *Cedica*, die *surinamische Zedika.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. E.
Alis fuscis, albido-variegatis.

476. *Choninea*, die *surinamische Choninea.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. F.
Alis brunneis, fasciis coalitis aurantiacis.

477. *Dares*, die *surinamische Dares.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. G.
Alis *anticis* olivaceis variegatis; *posticis* brunneis, basi nigris.

478. *Idonea*, die *surinamische Idonea.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 43. t. 311. Fig. A.
Alis cinerascentibus, fusco-albo-flavo-aurantiacoque variegatis; *posticis* concoloribus fuscis.

479. *Clara*, die — *Klara.*
*Cramer* Pap. exot. IV. p. 43. t. 311. Fig. B.

Alis

Alis fuſcis; *anticis* macula triangulari argentea; *poſticis* diſco albo.

480. *Dyndyma*, die — *Dyndyma.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 44. t. 311. Fig. C.

Alis luteo-fuſceſcentibus; *anticis* macula triangulari furva, linea recta flaviſſima.

481. *Viridata*, der — *Grünling.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 44. t. 311. Fig. D.

Alis *anticis* vireſcentibus, punctis binis ferrugineis; *poſticis* purpuraſcentibus, margine flavo.

482. *O o*, das — *doppelte* O.

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 45. t. 311. Fig. E. *Foemina*; F. *Mas.*

Alis fuſco-flavoque variegatis; *anticis* duplici o argenteo.

483. *Glauca*, der *ſurinamiſche Blauling.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 45. t. 311. Fig. G.

Alis *anticis* glaucis, fuſco-ſtriatis.

484. *Nutrix*, die *ſurinamiſche Nutrix.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 46. t. 312. Fig. B.

Alis fuſco-flavo-aurantiaco-nigroque variegatis.

485. *Amoenita*, die *ſurinamiſche Amönita.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 47. t. 312. Fig. D.

Alis fuſcis, nigro-aureoque punctatis.

486. *Hylea*, die — *Hylea.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. E.

Alis teſtaceis rubro-aurantiacoque variegatis.

487. *Marcellina*, die — *Marzellina.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. F.

Alis nigricantibus, fusco - striatis; *posticis* dentatis; omnibus ciliatis.

488. *Dissimilis*, das *unähnliche Weibchen.*

*Knochs* Beyträge zur Insektengeschichte I St. p. 57. no. 12. t. 4. f. 1. *Larva;* f. 3. *Foemina;* f. 4. *Mas.*

N. spirilinguis, cristata, alis deflexis crenatis, superioribus hepaticis macula conica linea terminali bidentata.

IV. SPANNMESSER: Phal. *Geometrae.*

1. mit *kammförmigen Fühlhörnern.* *)
   - a. etwas *eckigen*,
   - b. *runden* Hinterflügeln.
2. mit *borstenförmigen Fühlhörnern.*
   - a. *eckigen*,
   - b. *runden Flügeln.*

**I. Mit *kammförmigen Fühlhörnern und eckigen Flügeln.***

194. *La-*

*) *Linn.* Geometrae

1. *Pectinatae*
   - a. alis *posticis* subangulosis,
   - b. — *rotundatis.*
2. *Seticornes*
   - a. alis *angulatis*,]
   - b. — *rotundatis.*

Der *ersten* Klasse der Spanner hat *Linné* lauter lateinische Namen gegeben, die sich in *aria*, der *zwoten* aber, die sich in *ata* endigen. S. *Wien. Schmett.* p. 95. Anm.

194. *Lactearia*, der *Milchflügel.*

*Müllers* L. N. S. 5 Th. I B. p. 704. no. 194. der *Milchflügel.*

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 978. no. 23. Ph. *Lactearia*, die *milchweisse Spannmessermotte.*

*Wien. Schmett.* p. 98. *Raupen mit 10 Füßen;* B. *Schoßraupen*, Larvae *Stoloniformes; weißstriemige Spanner:* Ph. G. *Albolineatae.*

No. 9. *Unbekannte Raupe: weisser schneeweißgestrichter Spanner*, Ph. G. *Lactearia.*

— — p. 99. Anm. Vielleicht eine *Abänderung* der *Striataria* L. no. 197.

*Fischers* N. G. von Livl. p. 154. no. 369. Ph. *Lactearia*, der *Milchflügel.*

*Schriften der Dronth. Gesellsch.* IV. p. 283. no. 41. Ph. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 166. no. 194. Ph. G. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 155. no. 56. Phal. setic. spiril. *tota nivea.*

*Act. Upsal.* 1736. p. 34. no. 39.

*Papilio* alis planis *albis.*

*Scop.* Entom. carn. p. 215. no. 529. Ph. *Lactearia.*

*Long.* lin. 5. lat. $3\frac{1}{2}$.

Alba; antennis *pectinatis;* pectinibus villosis, apice setaceis; alis *posticis* angulatis, omnibus strigae transversae vestigio.

*Fabric.* S. E. p. 619. no. 1. *Phalaena Lactearia.* Nom. *Linn.*

In Europae *Nemoribus.*

Tenerrima et fere *pellucida.* *)

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 47. no. 417. Ph. *Lactearia.* Nom. *Linn.*



*) Wenn sie sich abgeflattert hat.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1431. Ph. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 131. no. 44.

*Phalaena* pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus rotundatis *niveis*, corpore flavo.

La *Laiteuſe.*

*Long.* 3 lign. *Larg.* 7 lign.

195. *Vernaria*, der *Frühlingsſpanner.* *)

*Müller* l. c. p. 704. no. 195. der *Frühlingsvogel.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 749. Ph. *Vernaria*, der *Frühlingsmeſſer.*

Bey uns etwas *ſelten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 34. Ph. *Vernaria.*

1) Die Raupen freſſen *Eichen*, *Haſelſtauden*- auch *Erlenblätter.*

2) Da ſolche, und die *Röſelſche* I. Ph. 3. t. 13. *zwo weiſſe* Queerlinien hat, ſo iſt es eher die Vernaria, als die Viridata L. no. 230. wobey *Füeßl.* vielleicht dieſe Röſelſche unrichtig angeführt hat (Chorh. *Meyer*).

*Berlin. Mag.* IV. p. 506. no. 4. Ph. *Vernaria*, das *weiſſe Band.*

Blaſsgrün, mit zwo weiſſen Queerſtreifen, durch

*) Bey dieſem Spanner ſind die Schriftſteller ſehr uneins: *Fabric.* hält ihn für *Röſels* I. N. V. 3 Kl. t. 13. *Füeßl.* hat dieſe *Röſelſche* bey der Viridata L. no. 230. angeführt; *Müller* in ſ. Faun. Fr. hat eine neue Art *Strigata* no. 454 beſchrieben, und dabey dieſe Röſelſche zitirt. *Kleem.* im Raupenkal. p. 37. no. 97. alles zur Viridata gezogen. Wie iſt hieraus zu kommen? Die *Röſelſche* iſt weder Vernaria noch Viridata L. ſondern *Mülleri* Strigata; *Scop.* Fimbrialis no. 535. der *Wiener* Bupleuraria p. 97. n. 4. und *Hufnagels* Fimbriata ſ. *Berl. Mag.* IV. p. 604. no. 64. ſ. *Naturf.* XI. p. 80. no. 64.

durch die *Ober-* und einem durch die *Unterflügel.*

— — p. 620. B. das *Männchen* von *dieser Phaläne* — sagt Hr. *Hufnagel.* Allein dies vermeynte *Männchen* der Vernaria ist G. *Putataria* L. no. 196.

*Naturf.* XI. p. 65. no. 4. Ph. *Vernaria.*

*Knochs* Beyträge zur Insektengeschichte I St. p. 1. t. 1. f. 1. Ph. G. *Sesquistriataria* (Mas).

*Wien. Schmett.* p. 97. B. no. 3. *Waldrebenspannerraupe* (Clematis Vitalbae); *Waldrebenspanner,* Ph. *Vernaria.*

*Schriften der Dronth. Ges.* IV. p. 284. no. 42. Phal. *Vernaria.*

*Schaeff.* Icon. t. 122. f. 5.

*Réaum.* Inf. Tom. II. t. 29. f. 14-19.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1432. Ph. *Vernaria.* Nom. *Linn.*

*Fabric.* S. E. p. 620. no. 3. *Phalaena Vernaria.* *)

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 362. no. 3. t. 6. f. 8. *Phalene à antennes demi-barbues.*

Phalene à antennes barbues à extrémité lisse et à trompe, à ailes horizontales d'un verd celadon pâle, à deux lignes transverses ondées blanches, et dont les inférieures font un angle.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 263. no. 3. t. 6. f. 8. das *halbbärtige Fühlhorn.*



*) Margo alarum fusco-punctatus.
*Larva* ferruginea, albo-nigroque varia, capite dentato.

Dies alles aber gehet auf die *Röselsche* Phaläne I. N. V. 3. t. 13, weil man voraussetzte, diese sey mit Vernaria einerley.

Die *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, die am Ende glatt sind; einem Saugrüssel, horizontalen blassseladongrünen Flügeln, mit zwo gewässerten weissen Queerstreifen und Unterflügeln, die einen Winkel machen.*)

*Réaum.* Inf. II. ed. 4. p. 367. 368. t. 29. f. 14-19.

196. *Putataria*, der *Weißstrich.*

*Müller* l. c. p. 704. no. 196. der *Weißstrich.*

*Berl. Mag.* IV. p. 620. B. das vermeynte Männchen der Vernaria.

*Naturf.* XI. p. 65. no. 4. der kleine Vogel in *Hufnagels* Anm. B. ist nicht das Männchen der Vernaria, sondern die Ph. *Putataria* L. (von *Rottemb.*)

*Wien. Schmett.* p. 98. B. no. 8.

*Unbek. Raupe: perlweißlicher weißstriemiger Spanner*, Ph. *Putataria.***)

*Fabric.* S. E. p. 620. no. 4. *Phalaena putataria* — antennis apice setaceis.

In Europae *Nemoribus.*

*Clerk* Icon. t. 3. f. 9. Ph. *putata.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 47. no. 416. Ph. *putataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1436. Ph. *putataria.* Nom. *Linn.*

197. *Stri-*

*) Ich nehme hierdurch die daselbst angeführten Zitata: als *Rösel* I. Ph. 3. t. 13, und *Müllers* Strigata F. Fr. n. 454. zurück.

**) Im Anhange des Linn. Syst. ed. 12. ist für die Putataria *Schaeff.* Icon. t. 67. f. 10. 11. angeführt. Gewiss von einem Schüler des *Linné*, der sich durch die Aehnlichkeit des Namens verleiten lassen. Denn die Schäffersche Phaläne ist Ph. B. *Potatoria* L. (Foem.), no. 23.

197. *Striataria*, der *Gelbſtrich.*

*Müller* l. c. p. 704. no. 197. der *Gelbſtrich.*

*Wien. Schmett.* p. 99. Anm. Vielleicht nur eine Abänderung der *Lactearia* L. no. 194.

*Berl. Mag.* IV. p. 514. no. 17. Ph. *Stratarìa*, der *Schneevogel.*

Der Grund gelblich weiſs, mit 2 braunen breiten irregulären Queerbinden; die Felder dazwiſchen braunpunktirt.

— p. 622. G. Viel ähnliches mit Hufnagels *Atomaria* no. 12.

*Naturf.* XI. p. 68. no. 17. Ph. *Stratarìa.*

*Clerk* Icon. t. 55. f. 4.

*Fabric.* S. E. p. 620. no. 5. *Phalaena ſtriataria.* Nom. *Linn.*

In Europae *Vmbroſis.*

Alae omnes albidae, ſtrigis *anteriorum* duabus; *poſteriorum* unica, flaveſcentibus.

198. *Vibicaria*, der *Purpurſtrich.*

*Müller* l. c. p. 704. no. 198. der *Purpurſtrich.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 750. Ph. *Vibicaria.*

Bey uns *ſelten.*

*Berl. Mag.* IV. p. 612. no. 82. Ph. *Rubro-faſciata*, die *rothe Binde.*

Strohgelb, mit einer breiten *roſinrothen* Binde durch alle vier Flügel.

*Naturf.* XI. p. 84. no. 82. Rubro - faſciata — eigentlich *faſciaria*, weil ſie unter die *Pectinicornes* gehört, iſt L. *Vibicaria* (v. *Rottemb.*).

*Wien. Schmett.* p. 117. P. *Fadenraupen*, Larvae *Filiformes; bogenſtriemigte Spanner*, Ph. G. *Arcuato-ſtriatae.*

No. 2. *Schmelenſpannerraupe* (Airae montanae), *Schmelenſpanner.* Ph. *Vibicaria.*

*Scop.* Entom. carn. p. 226. no. 562. Ph. *Cruentata.*
*Long.* lin. 6. *Lat.* $4\frac{1}{2}$.
Alae ſupra oſſeae, faſcia communi fimbriaque ruſſeis.
*Schaeff.* Icon. t. 12. f. 5.
*Fabric.* S. E. p. 623 no. 19. *Phalaena Vibicaria.*
Pectinicornis; alis *rotundatis*, flaveſcentibus; ſtrigis tribus purpureis; anteriore obſoletiore.
In Europae *Nemoribus.*
Convenit *Linn.* deſcriptio, at alae *haud angulatae.*
*Geoffr.* Inſ. II. p. 132. no. 48.
*Phalaena* pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus luteis; faſcia transverſa rubra.
La *Bande rouge.*
*Long.* 6 lign. *Larg.* 13 lign.
*Cramer* Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. D. Ph. G. *Vibicaria.*

199. *Thymiaria*, der *Wellenſtrich.*

*Müller* l. c. p. 705. no. 199. der *Wellenſtrich.*
*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 751. Ph. *Thymiaria.*
Bey uns *ſelten.*
*Friſch* Inſ. X. p. 20. 3 Pl. t. 17. no. 17.
Vom braunen *Spannmeſſer* mit den zwey Kopf- und Rückenſpitzen, und ſeinem *grünlichen Papilion.*
*Wien. Schmett.* p. 97. B. no. 5. *Thymianſpannerraupe* (Thymi vulgaris); *Thymianſpanner*, Ph. *Thymiaria.*
Jährlich die *Raupe* immer auf *Schlehen* (Prunus ſpinoſa).
*Albin* Inſ. t. 48. f. 81. *Raupe:* auf dem *Weißdorn* (Crataegus Oxyac.).

200. *Pun-*

200. *Punctaria*, der *Punktstrich.*

*Müller* l. c. p. 705. no. 200. der *Punktstrich.*
*Berl. Mag.* IV. p. 514. no. 18. Ph. *Punctaria*, der *Rothstreif.*

Blassgelb, mit einem rothen Queerstreif und vielen rothen Punkten.

— — p. 622. G. Im Frühjahr die zeitigste unter allen; schon an den Baumstämmen, wenn der Schnee noch nicht weggeschmolzen ist.

*Wien. Schmett.* p. 103. Anm. Ph. *Punctaria.*
— — p. 107. H. *Stricheraupen*, Larvae *Strigillatae*; *wechselnde Spanner*, Ph. G. *Alternantes.*

1) mit einem Queerstriche.

No. 2. *Eichenbuschspannerraupe* (Quercus Roboris); *Eichenbuschspanner*, Ph. *Punctaria.*

*Knochs* Beyträge zur Insektengesch. I St. p. 13. t. 1. f. 4. Ph. *Punct.* Foemina; f. 5. *Larva;* f. 6. *Pupa.*
*Réaum.* Inf. II. t. 29. f. 1-4. *)

*Chenille* arpenteuse verte du chêne. Ph. *Punctaria.*

*Fabric.* S. E. p. 620. no. 6. *Phalaena punctaria.*

In Europa; *Anglia.*

201. *Amataria*, der *Favoritspanner.*

*Müller* l. c. p. 705. no. 201. der *Liebling.*
*Füessl.* schweiz. Inf. p. 39. no. 752. Ph. *Amataria*, der *Lieblingsmesser.*

Bey uns etwas selten auf *Birken.*



*) Dieses Zitatum hat *Linné* zu *Amataria* n. 201, und *Degeer* Tom. II. P. I. p. 360. no. 2. bey G. *Pendularia* L. *Faun.* Suec. ed. 2. no. 1244. gesetzt; die Wiener Entomologen aber p. 103. Anm. sagen: es gehöre zu *Punctaria* L.

*Berl. Mag.* IV. p. 514. no. 19. Ph. *Vibicaria*, das *rothe Band.*

Schmuziggelb, mit einer ſchmalen rothen Binde durch alle vier Flügel; die Hinterflügel mit einer kleinen Spitze.

*Naturf.* XI. p. 68. no. 19. Ph. *Vibicaria* iſt *Linn. Amataria.* (v. *Rottemb.*)

*Wien. Schmett.* p. 103. F. *Aeſteraupen*, Larvae *Ramiformes.*

*Chenilles Arpenteuſes en bâton raboteux.*

*Zackenflüglichte Spanner;* Ph. G. *Angulatae.* No. 9. *Ampferſpannerraupe* (Rumicis acuti et acetoſae); *Ampferſpanner*, Ph. G. *Amataria.*

*Fabric.* S. E. p. 621. no. 7. *Phalaena amataria.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 47. no. 414. Ph. *Amataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1433. Ph. *Amataria.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 128. no. 37.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis patentibus angulatis cinereis, faſcia duplici transverſa, punctoque obſcuriore, atomis cineraſcentibus.

L' *Anguleuſe.*

*Long.* 4½ lign.

*Scop.* Entom. carn. p. 214. no. 528. Ph. *Amataria.*

*Long.* lin. 7. *Lat.* 4.

Per alas expanſas omnes utrinque ab apice primoris unius ad apicem alterius ſociae decurrunt ſtrigae duae obſcuriores; quarum poſtica tenuior et repanda extremitates ſuas adnectit apicibus alarum anticarum, ſeu extremitatibus ſtrigae ſuperioris.

Ama-

Amataria *Linn.* ſolo colore a noſtra differt; illa enim *albida* apicibus alarum margine rufis; noſtra vero *Zinziberis* colore, ſtriga ſuperiore ferruginea, altera fuſca.

202. *Falcataria*, der *Sichelflügel.*

*Müller* l. c. p. 705. no. 202. der *Sichelflügel.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 753. Ph. *Falcataria*, der *Sichelmeſſer.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 177. t. 21. die kleine zimmetbraune mit einem hochfleiſchfarbenen Flecken gezierte, und mit einer beſondern Rücken- auch Schwanzſpitze verſehene *Raupe*, ohne Nachſchieberfüſse. (Seltſame *Puppe* f. 4. 5.)

— Raupenkal. p. 94. no. 273. Ph. *Falcataria*, der *Sichelflügel.*

*Berl. Mag.* IV. p. 514. no. 20. Ph. *Falcataria*, der *Kukuk.*

Okerbraun, mit vielen blaſsgrünen ausgekappten Queerſtreifen; die Spitzen der Oberflügel ſichelförmig.

— — p. 623. I. die Raupe eben ſo beſchrieben, als die *Kühnſche.*

*Gleditſch* Forſtw. I. p. 556. no. 9. Ph. *Falcataria*, der *Kukuk.*

*Gladbachs* Schmetterl. p. 53. t. 23. f. 5. 6. der *S Vogel.*

*Wien. Schmett.* p. 64. T. *Spitzraupen*, Larvae *Cuſpidatae.*

*Chenilles à queue ſimple. Réaum.*

*Spannerförmige Spinner;* Ph. *Bombyces Geometriformes.*

No. 2. *Weißbirkenſpinnerraupe* (Betulae albae); *Weißbirkenſpinner*, Ph. *Falcula*, G. *Falcataria* L.

*Naturf.*

*Naturf.* IX. p. 96. t. 1. f. 6. von der ſeltenen Puppe einer Birkenraupe (*Mas*). (D. *Kühn.*)

*Schaeff.* Icon. t. 64. f. 1. 2.

*Fabric.* S. E. p. 621. n. 8. *Phalaena Falcataria.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 47. no. 415. Ph. *Falcataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1434. Ph. *Falcataria.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. I. Mém. 10. p. 333. t. 24. f. 1-7. (*Foemina.*)

*Chenille* à quatorze jambes, verte, à ſix tubercules coniques et charnus ſur le dos, dont le deſſus du corps eſt d'un brun tirant ſur le pourpre, et dont le poſtérieur, qui eſt dépourvu de jambes, ſe termine en pointe conique — ſur l' *Aune.*

— — p. 695. t. 24. f. 7.

*Phalene* à antennes à barbes et à trompe, dont les ailes ſupérieures, qui ſont brunes et traverſées d'une raye obſcure, ſont courbées en crochet vers l'angle extérieur.

— Tom. II. P. I. p. 353. no. 7. t. 6. f. 1. Phal. *Faucille.* (*Mas.*)

*Phalene* à antennes barbues à trompe, à ailes horizontales d'un blancheâtre feuille-morte rayées de brun, avec une ligne oblique et une tache brune, et dont l'angle extérieur eſt courbé en crochet.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 91. t. 24. f. 1-7.

Die grüne vierzehnfüſsige *Erlenraupe*, mit ſechs kegelförmigen, fleiſchichten Rückenbuckeln, die obenauf braun und purpurfarbig iſt, am Schwanze aber keine Füſse, ſondern nur eine koniſche Spitze hat.

*Degeer Uebers.* 4 Qu. p. 118. t. 24. f. 7.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern und Saugrüssel, dessen Oberflügel braun sind, eine dunkle Queerstreife haben, und am Aussenwinkel hakenförmig gebogen sind.

— — II Th. I B. p. 257. no. 7. t. 6. f. 1. die *Sichelphalene*.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel und horizontalen, weisslich fahlbraunen, braungestreiften Flügeln, mit einer schrägen Linie und braunen Flecken, deren Aussenwinkel hakenförmig gekrümmt ist.

203. *Sambucaria*, der *Spitzschwanz*.

*Müller* l. c. p. 705. no. 203. die *Schwanzecke*.

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 39. no. 754. Ph. *Sambucaria*, der *Schwanzmesser*.

Bey uns etwas *selten*.

*Berl. Mag.* IV. p. 512. no. 14. Ph. *Sambucaria*, der *Spitzschwanz*.

Blassgelb, mit kleinen halbolivenfarbenen Stralen und zwo Queerstreifen durch die Ober- und einem durch die Unterflügel.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 17. no. 26. Ph. *Sambucaria*, der *Spitzschwanz*.

*Röfels* Insektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 25. t. 6. die grosse, braune und dunkelgestreifte *Spannenraupe*.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 949. no. 1. Ph. *Sambucaria*, die *gelbliche Fliedermotte*.

*Wien. Schmett.* p. 103. F. *Aesteraupen*.

No. 1. *Holunderspannerraupe* (Sambuci nigrae); *Holunderspanner*. Ph. *Sambucaria*.

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 16. der *Holunderspanner*.

*Ono-*

*Onomat.* hist. nat. P. 6. p. 413. Ph. *Sambucaria*, der *Holdervogel.*

*List. Goed.* p. 26. no. 10. f. 10. et p. 33. Eruca *Extensor*, seu *Grallator.*

*Raj.* Hist. Inf. p. 177. no. 1.

*Phalaena* media ochroleucos, alis amplissimis; *exterioribus* duabus lineis transversis e fulvo virentibus; *interioribus* una divisis.

*Bekm.* Epit. S. L. p. 166. no. 203. Ph. *Sambucaria.* Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 63. f. 8.

*Fabric.* S. E. p. 621. no. 10. *Phalaena Sambucaria.* Nom. *Linn.*

*Larva* subnodosa, pulla, fusco-lineata.
*Pupa* fusiformis, brunnea, fusco-punctata.
*Ova* costata.

*Sepp* Nederl. Inf. VI. p. 3. t. 1.

De *Vlier-Vlinder.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 138. no. 58.

*Phalaena* seticornis spirilinguis; alis patentibus *sulphureis*, linea duplici transversa obscuriore, inferioribus caudatis.

La *Souffrée à queue.*

*Long.* 10. lign.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1435. Ph. *Sambucaria.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inf. Tom. II. P. I. p. 447. no. 3. *Phalene souffrée à queue.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues d'un jaune paille avec deux lignes transverses d'un jaune foncé, dont les inférieures sont angulaires à deux points bruns.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 327. no. 3. die *schwefelgelbe Schwanzphaläne.*

Die

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und ſtrohgelben breiten Flügeln, mit zwo dunkelgelben Queerlinien, deren Unterflügel eckigt ſind, und zween braune Punkte haben.

204. *Lacertinaria*, der *Eidexſchwanz.*

*Müller* l. c. p. 706. no. 204. der *Eidexſchwanz.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 755. Ph. *Lacertinaria*, der *Eidexmeſſer.*

Auf Birken nicht ſelten.

*Berl. Mag.* IV. p. 510. no. 9. Ph. *Lacertinaria*, die *Zahnmotte.*

Schmuziggelb; die Oberflügel mit zwo braunen Queerſtreifen und ausgezackt.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 30. Ph. *Lacertinaria*, die *Zahnmotte.*

*Wien. Schmett.* p. 64. T. *ſpannerförmige Spinner.* No. 5. *Hangelbirkenſpinnerraupe* (Betulae albae *Virgis pendulis*); *Hangelbirkenſpinner*, Ph. Bomb. *Lacertula*, G. *Lacertinaria* L.

*Sulzers* Geſch. p. 161. t. 22. f. 10. Ph. *Lacertinaria*, der *Eidexſchwanz.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 166. no. 204. Ph. *Lacertinaria.*

*Schaeff.* Icon. t. 66. f. 2. 3.

*Fabric.* S. E. p. 622. no. 11. *Phalaena Lacertinaria.*

Pectinicornis; alis eroſis, luteſcentibus, ſtrigis duabus fuſcis.

*Larva* nuda, rubra, dorſo angulato.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 47. no. 418. Ph. *Lacertinaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1438. Ph. *Lacertinaria.* Nom. *Linn.*

*De-*

*Degeer* Inſ. I. Mém. 10. t. 10. f. 5-8.

*Chenille* à quatorze jambes, brune avec des nuances et des taches obſcures, dont le poſtérieur, qui manque de jambes, ſe termine en pointe ſimple, et qui vit ſur le Bouleau.

— — p. 695. t. 10. f. 7. 8.

*Phalene* à antennes à barbes et à trompe; d'un brun clair jaunâtre, dont les ailes ſupérieures, qui ont deux lignes transverſales brunes, ſont courbées en crochet vers l'angle extérieur.

— II. Part. I. p. 335. no. 3. t. 5. f. 6. la *Chenille* — Phalene *Lacertine.*

*Phalene* à antennes barbues, à trompe; à corcelet uni; à ailes découpées voutées d'un jaune griſeatre avec deux lignes transverſes brunes et un point brun obſcur.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 94. t. 10. f. 5-8.

Die braune vierzehnfüſsige Birkenraupe, mit ſchwarzen Flecken und Schattirungen, die keine Hinterfüſse, ſondern nur eine einfache Schwanzſpitze hat.

— — 4 Qu. p. 117. t. 10. f. 7. 8.

Ein brauner hellgelblicher *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, und einem Saugrüſſel, deſſen Oberflügel zwo braune Queerlinien haben, und gegen den äuſſerlichen Winkel wie Häkchen gebogen ſind.

— II Th. I B. p. 242. no. 3. die *Eidexenmotte.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, glattem Bruſtſchilde, und gelbgraulichen gezackten, gewölbten Flügeln, mit zwo braunen Queerlinien, und einem dunkelbraunen Punkt.

205. *Alniaria*, der *Erlenſpanner.*

*Müller* l. c. p. 706. no. 205. der *Nageflügel.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 756. Ph. *Alniaria*, der *Franſemeſſer.*

Bey uns *ſelten.*

*Berl. Mag.* IV. p. 518. no. 27. Ph. *Alniaria*, das *Brett.*

Okergelb, mit braunen Flecken geſprenkelt, die Flügel ſtark ausgezackt.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 102. no. 290. p. 111. no. 313. Ph. *Alniaria*, der *Nageflügel.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 1. t. 1. die ſchlanke ſchwarzbraune *Spannenraupe.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 557. no. 10. II. p. 751. no. 68. Ph. *Alniaria;* das *Brett;* das *Brettſpiel.*

*Wien. Schmett.* p. 103. F. *Aeſteraupen.* no. 2. *Erlenſpannerraupe* (Betulae Alni); *Erlenſpanner*, Ph. *Alniaria.*

*Fiſchers* N. G. von Livl. p. 154. no. 370. Ph. *Alniaria*, der *Nageflügel.*

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 148. no. 25. Phalena *de l'Aune.*

*Fabr.* S. E. p. 622. no. 12. *Phalaena Alniaria.* Nom. *Linn.*

*Larva* griſeo-fuſca, luteo-punctata; verrucis dorſalibus tribus remotis; caudalibus quatuor approximatis.

*Pupa* coeruleſcens, poſtice attenuata.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 419. Ph. *Alniaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 125. no. 1439. Ph. *Alniaria.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. Tom. I. p. 349. Mém. XI. t. 10. f. 9 - 14.

Grande *Chenille arpenteuſe* en baton à dix jambes, dont la tête eſt égale et unie, et qui mange les feuilles du Bouleau.

*Degeer* Inſ. Tom. I. p. 696. t. 10. f. 13. 14.

*Phalene* à antennes à barbes, ſans trompe; à corcelet jaune-citron, et à ailes découpées d'un jaune d'ocre clair.

— Tom. II. Part. I. p. 305. no. 4.

Phalene *branche ſeche.*

*Phalene* à antennes barbues ſans trompe; à ailes presque horizontales découpées d'un jaune d'ocre clair avec deux lignes obliques brunes, à corcelet jaune-citron.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. 11te Abh. p. 102. t. 10. f. 9-14.

Der groſse zehnfüſsige *Stockſpanner* auf den Birken, mit einigen Hökern und ganz glattem Kopfe.

— — 4 Qu. p. 118. t. 10. f. 13-14.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, einem zitrongelben Halskragen, und hellokergelben ausgezackten Flügeln.

— II Th. I B. no. 4. der *dürre Aſt.*

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, mit hellokergelben gezähnelten, mit zwo braunen Queerſtreifen verſehenen, beynahe horizontalſtehenden Flügeln, und einem zitrongelben Halskragen.

206. *Syringaria*, der *Fliedermeſſer.*

*Müller* l. c. p. 706. no. 206. der *Fliedermeſſer.*

*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 757. Ph. *Syringaria*, der *Gemſemeſſer.*

Auf

Auf der Lonicera und dem Liguſtro *nicht ſelten.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 36. t. 10. die dicke beſonders ſchöne Spannenraupe, mit zwey den Gemſenhörnern ähnlichen Haken, und andern auf dem Rücken ſtehenden Zapfen.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 36. no. 94. Ph. *Syringaria*, der *Fliedermeſſer.*

*Wien. Schmett.* p. 103. F. *Aeſteraupen.*

No. 8. *Fliederſpannerraupe* (Syringae vulgaris); *Fliederſpanner*, Ph. *Syringaria.*

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 17. t. 9. f. 9. 10. 11. der *Fliedermeſſer.*

*Onomatol.* hiſt. nat. P. 6. p. 413. Ph. *Syringaria*, der *Syringenvogel.*

*Fabric.* S. E. p. 622. no. 13. *Phalaena Syringaria.* Nom. *Linn.*

*Larva* glauca luteoque varia, dorſo aculeis ſex, poſticis longioribus recurvis.

*Pupa* folliculata, farcta, antice griſea, poſtice brunnea.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 125. no. 32.

*Phalaena* pectinicornis, alis margine ſinuatis, fulvo - nigro - fuſco - roſeoque marmoratis, ſingulis ſubtus puncto nigro, ſuperioribus extremo dilatato, recurvis.

La *Phalene jaſpée.*

*Long.* 9. lign.

207. *Dolabraria*, der *Hobelſpanner.*

*Müller* l. c. p. 706. no. 207. der *Eichenmeſſer.*

*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 758. Phal. *Dolabraria.*

Bey uns *ſehr ſelten* auf *Birken.*

*Berl. Mag.* IV. p. 516. no. 22. Ph. *Vſtulataria*, der *Brandvogel.*
Weiſslichgelb, mit vielen gelbbraunen Strichlein; die Spitzen der Oberflügel wie ausgebrannt.

*Naturforſch.* XI. p. 69. no. 22. Ph. *Vſtulataria* iſt *Dolabraria* L. (v. *Rottemb.*)

*Wien. Schmett.* p. 104. F. *Aeſteraupen.*
No. 16. *Wintereichenſpannerraupe* (Quercus Roboris); *Wintereichenſpanner*, Phal. *Dolabraria.*

*Sulzers* Geſch. p. 161. t. 22. f. 9. Ph. *Dolabraria*, der *Birkenmeſſer.*

*Fabric.* S. E. p. 623. no. 17. *Phalaena Dolabraria.*
Pectinicornis, alis angulatis, flavis, ſtrigis ferrugineis; angulo ani violaceo.

208. *Prunaria*, der *braune Mondſpanner.*

*Müller* l. c. p. 707. no. 208. der *Schlehedornmeſſer.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 759. Ph. *Prunaria.*
In den Wäldern *nicht ſelten.*

*Berl. Mag.* IV. p. 518. no. 26. Ph. *Fulvularia*, der *geſtreifte Tiger.*
Oraniengelb, mit unzählichen blaſsgrauen Strichlein beſäet.

*Naturf.* XI. p. 70. no. 26. Ph. *Fulvularia* iſt L. *Prunaria* (v. *Rottemb.*).

*Gleditſch* Forſtw. II. p. 753. no. 73. Ph. *Fulvularia*, der *geſtreifte Tiger.*

— — p. 821. no. 15. Phal. *Prunaria*, die *Schlehedornmotte.*

*Wien. Schmett.* p. 104. F. *Aeſteraupen.*
No. 17. *Pflaumenſpannerraupe* (Pruni domeſticae); *Pflaumenſpanner*, Ph. *Prunaria*, et p. 105. *Anm. Wien.*

*Wien. Schmett.* p. 152. wo gezeigt wird, daſs es die *Prunaria* L. ſey.

*Schaeff.* Icon. t. 17. f. 2. 3. *Männchen* und *Weibchen.*

*Scop.* Entom. carn. p. 216. no. 533. Ph. *Corticalis.* *Long.* lin. $10\frac{1}{2}$. *Lat.* $6\frac{1}{2}$.

Alae oſſeae; lineolis transverſis parvis numeroſis ferrugineis; linea craſſiore utrinque pariter ferruginea, in ſingulis alis.

— Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 126. Ph. *Corticalis.* Varietas Hungarica flava, lineolis fuſcis.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 421. Ph. *Prunaria,* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1440. Phal. *Prunaria.* Nom. *Linn.*

*Fabric.* S. E. p. 624. no. 21. *Phalaena Prunaria.* Nom. *Linn.*

*Larva* ferruginea, dorſo antice poſticeque ſpinis duabus.

209. *Pennaria*, der *Endpunkt.*

*Müller* l. c. p. 707. no. 209. der *Rothflügel.*

*Wien. Schmett.* p. 103. E. *Zweigſchoſsraupen; Larvae Surculiformes; geradſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Rectofaſciatae.*

No. 12. *Hagebüchenſpannerraupe* (Carpini Betuli); *Hagebüchenſpanner,* Ph. *Pennaria.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 420. Phal. *Pennaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1441. Phal. *Pennaria.* Nom. *Linn.*

210. *Piniaria*, der *Fichtenſpanner.* (*Mas.*)

*Müller* l. c. p. 707. no. 210. die *Bruchlinie.*



*) *Nicht abgebildet.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 760. Phal. *Piniaria.* In den *Wäldern* nicht ſelten.

*Berl. Mag.* IV. p. 506. no. 2. Phal. *Piniaria*, der *Wildfang.*

Braun, ſo an manchen Orten ins Gelbe fällt; das *Weibchen* fällt mehr ins Gelbbraune, als das Männchen.

— — p. 620. A. Beſtätigung, daſs die gelbbraunen mit ſchwärzlichem Rande die *Weibchen* ſind.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 502. no. 4. Ph. *Piniaria*, der *Wildfang.*

*Wien. Schmett.* p. 106. G. *Streiferaupen;* Larvae *ſtriatae; ſtaubigte Sqanner*, Ph. G. *Pulverulentae.*

3) Mit nur angefangenen Queerſtrichen, oder zuſammengefloſſenen Punkten am Auſsenrande.

No. 7. *Föhrenſpannerraupe* (Pini Sylveſtris); *Föhrenſpanner*, Ph. *Piniaria.* *)

*Gladbachs* Schmett. p. 36. t. 17. f. 1-6. der *Fichtenſpanner* mit ſeiner Raupe und Puppe. **)

*Naturf.* 15 St. p. 67. Beſchr. der *Raupe* (von *Scheven*). Die Larve viel ähnliches mit der Larve der G. *brumatae.*

*Alton. Merkur* no. 110. bey Dresden an den Tannenwäldern groſsen Schaden gethan. Der Name

*) Dieſe *Spannerart* trägt die Flügel in der Ruhe einigermaſsen erhaben, und ſie ſind *mehr auf der Unter-* als Oberſeite mit *Punkten beſtäubt.* Bey beyden Geſchlechtern iſt die Oberſeite gar zu verſchieden. Daher hat *Linné* bey der Beſchreibung ſein Augenmerk vornämlich auf die *Unterſeite* gerichtet.

**) Ich zweifle faſt nicht, daſs nicht dieſer die G. *Piniaria* L. ſey' da das Weibchen davon auch ganz okerbraun iſt.

me *Processionsraupe* falsch, weil diese auf den *Eichen* wohnen.

*Fabric.* S. E. p. 624. no. 23. *Phalaena Piniaria.*
Pectinicornis, alis fuscis, flavo-maculatis, subtus nebulosis, fasciis duabus fuscis.

*Larva* viridis, supra albo—subtus flavo-striata.

*Pupa* folliculata, brunnea.

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 150. no. 30. Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 817. Phal. pectinicornis, spirilinguis, alis planiusculis rotundatis, supra fuscis, antrorsum albis.

*Clerk* Icon. t. 1. f. 10. Ph. *Piniaria.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. no. 1233. p. 325. Phalaena *Piniaria.*

Pectinicornis, alis omnibus fuscis disco bimaculato albo; subtus nebuloso-subfasciatis.

*Sepp* Nederl. Inf. VI. p. 17. t. 4. f. 8. 9. das schwarzbraungelbliche *Männchen;* f. 10. das okergelbe *Weibchen.*

De *Vlinder Anomalus.*

*Schaeff.* Icon. t. 159. f. 1. 2. (Mas, aber verstäubt).

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 351. no. 5. t. 5. f. 20.
*Phalene panachée à raye blanche.*

*Phalene* à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales brunes ou *roussâtres* (Foemina); dont les inférieures sont picquées de points olives en dessous avec une raye longitudinale blanche.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 255. no. 5. t. 5. f. 20. die *weißgestreifte Phaläne mit federbuschartigen Fühlhörnern.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und horizontalen braunen, oder *rostfarbigen* (*Weibchen*) Flügeln, davon die untern auf der Unterseite eine längst herunter-

terlaufende weiſſe Streife haben, und mit olivenfarbigen Punkten geſprenkelt ſind.

β. *Foemina.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 1. no. 818.

*Phalaena* pectinicornis, alis planiuſculis rotundatis nebuloſis *luteſcentibus*, inferioribus linea longitudinali alba.

— — ed. 2. no. 1234. p. 325. Phal. *Tiliaria.*

Pectinicornis; alis *luteſcentibus* ſubtus nebuloſo-faſciatis, linea alba interrupta.

*Clerk* Icon. t. 4. f. 11. Phal. *Tiliaria.*

*Réaum.* Inſ. II. t. 28. f. 6.

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 143. no. 10. Nom. *Linn.* ex F. Su. ed. 1. no. 818.

Antennes en forme *de lance*, dentelées (*Lanceolatae*).

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 390. no. 8. Ph. *Tiliaria*, der *Lindenmeſſer.*

II. *Mit kammförmigen Fühlhörnern und runden Flügeln.*

211. *Elinguaria*, der *gelbbandirte Birnſpanner.*

*Müller* l. c. p. 708. no. 211. der *Kohlſauger.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 761. Ph. *Elinguaria.*

Bey uns *ſelten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 35. Phal. *Elinguaria.*

1) Der *Körper* dicker, als bey Spannern gewöhnlich.
2) Die *Raupen* auf Schlehendornen.
3) Verwandeln ſich unter einem veſten Dache von Seide mit untergemengter Erde.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 35. t. 9. die groſſe braunlichgraue *Spannenraupe* mit dem platten Kopfe.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 28. Ph. *Elinguaria, der Kohlſauger.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 788. no. 14. Ph. *Elinguaria,* die *gelbe Birnmotte, mit der breiten dunkelgelben Binde.*

*Wien. Schmett.* p. 103. E. no. 11. *Geißblattſpannerraupe* (Lonicerae Caprifolii); *Geißblattſpanner,* Ph. *Elinguaria.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 356. Ph. *Elinguaria.*

*Fabric.* S. E. p. 628. no. 43. *Phalaena Elinguaria.* Nom. *Linn.*

*Larva* rugoſa, cinereo-brunneoque variegata.

*Pupa* folliculata, antice fuſca, poſtice brunnea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 422. Ph. *Elinguaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1442. Phal. *Elinguaria.* Nom. *Linn.*

212. *Melanaria*, der *Schwärzling.*

*Müller* l. c. p. 708. no. 212. der *Schwärzling.*

*Wien. Schmett.* p. 115. Anm. Vielleicht nur eine *Abänderung* von *Macularia* L. da bey einigen die *Oberflügel*, gleichſam von der Sonne gebleicht, ganz *weißlich* ausſahen.

*Fabric.* S. E. p. 625. no. 25. *Phalaena Melanaria.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Icon. t. 4. f. 2.

*Knochs* Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 11. t. 1. f. 3. Ph. *Melanaria.*

213. *Macularia*, der *Fleckling.* *)

*Müller* l. c. p. 708. no. 213. der *Fleckling.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 762. Ph. *Macularia*, der *Fleckling.*

Nicht ſelten *nahe bey Wäldern.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 123. t. 14. f. 5.

Der zur 3 Kl. der N. V. gehörige gelb- und ſchwarzgefleckte *Nachtpapilion.*

*Wien. Schmett.* p. 115. N. *Zeichenraupen*, Larvae *ſignatae; halbſtreifigte Spanner;* Ph. G. *Subfaſciatae.*

No. 13. *Unbekannte Raupe. Goldgelber ſchwarzfleckigter Spanner*, Ph. G. *Maculata* (*Macularia* L.).

*Schaeff.* Icon. t. 12. f. 3.

*Scop.* Ent. carn. p. 224. no. 557. Ph. *Maculata.*

*Long.* lin. 7. *Lat.* $4\frac{3}{4}$.

*Flava;* alis omnibus utrinque fuſco-maculatis.

In *pratis* non rara.

*Fabric.* S. E. p. 637. no. 88. *Phalaena Maculata.* Nom. *Linn.*

In *Anglia frequens.*

Antennae mihi omnes *ſetaceae.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 140. no. 61. Phal. ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus flavis, maculis numeroſis fuſcis.

La *Phalene panthere.*

*Long.* 5 lign. *Larg.* 1 pouce.

214. *Atomaria*, der *Atomſpanner.* **)

*Müller* l. c. p. 708. no. 214. der *Sprenkling.*

*Füeßl.*

*) Vielleicht nur eine Abänderung von *Melanaria.*

**) Nicht *Hufnagels* Atomaria: *Berl. Magaz.* IV. p. 510. no. 12. *S. Naturf.* XI. p. 66. no. 12.

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 763. Ph. *Atomaria*, der *Sprenkling*.

*Friſch* Inſ. XIII. p. 12. no. 6. 1 Pl. t. 5. von dem weiſs- und ſchwarzgewürfelten *Spannenmeſſer* auf den Linden.

*Kleem.* Beytr. I. p. 285. t. 34. die zur 3ten Kl. der N. V. gehörige groſse bräunlichgraue, mit zarten Linien und Würfelflecken gezierte zehnfüſsige *Spannenraupe*.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 68. no. 194. Phal. *Atomaria*.

*Gleditſch* Forſtw. I. p. 390. no. 7. Ph. *Atomaria*, der *faule Eſel*.

*Wien. Schmett.* p. 105. G. *ſtaubigte Spanner*.

2) Mit zuſammenſtoſsenden Queerſtrichen.

No. 5. *Flockenkrautſpannerraupe* (Centaureae Scabioſae); *Flockenkrautſpanner*, Ph. G. *Atomaria*.

(Pennata (et Fem.) Iſoſcelata Scop.)

*Cathol.* A. p. 583. Ph. *Atomaria*, der *braunſtaubige Spannmeſſer*.

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 150. no. 31. Ph. *Atomaria*. Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 840.

*Act. Vpſ.* 1736. p. 24. no. 48.

*Papilio* alis planis pallidis angulatis.

*Wilke's* Engl. Moths and Butterfl. Book I. Chap. 3. Cl. I. 5. a. i. No. 1. p. 35. t. 70.

*Scop.* Entom. carn. p. 228. no. 569. Phal. *Pennata* (Mas).

*Long.* lin. $6\frac{1}{4}$. *Lat.* $4\frac{2}{3}$.

Antennae amplae, deflexae, ubique pectinatae, pectinibus piloſis; alae pallide ferrugineae; faſciis obſoletis lineolisque plurimis confluentibus nebuloſae.

*Scop.*

*Scop.* Ent. carn. p. 225. no. 558. Phal. *Isoscelata.* (*Foemina.*)

*Long.* lin. 6. lat. $3\frac{1}{2}$.

Alae supra albae, fasciis 4 lineolisque parvis transversis fuscis, subtus flavescentes.

*Fabric.* S. E. p. 625. no. 26. *Phalaena Atomaria.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 426. Ph. *Atomaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1443. Ph. *Atomaria.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Ins. II. p. 133. no. 50.

*Phalaena* pectinicornis spirilinguis, alis patentibus flavescentibus, fasciis plurimis transversis, nonnullis connexis, atomisque fuscis.

La *Rayure jaune picotée.*

*Long.* 5 lign.

*Bibl.* reg. Paris. p. 26. f. 9. 10. 11.

*Degeer* Ins. Tom. II. Part. I. p. 344. no. 2. t. 5. f. 14. *Phalene jaune à atomes gris.*

*Phalene* à antennes barbues, à trompe; à ailes denteleés horizontales d'un jaune couleur d'orange, toutes parsemées de traits et de petites lignes transverses d'un gris agathe.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 250. no. 2. t. 5. f. 14. die *gelbe Phaläne mit grauen Atomen.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, gezähnelten horizontalen, orangegelben, mit achatgrauen Strichen und kleinen Queerlinien ganz besäeten Flügeln.

*Schaeff.* Icon. t. 17. f. 3.

215. *Pulveraria*, der *Staubling.* *)

*Müller*

*) Nicht *Pulveraria* Hufnag. *Berl. Mag.* IV. p. 518. no. 29. denn diese ist *Defoliaria* L. S. *Naturf.* XI. p. 70. no. 29.

*Müller* l. c. p. 708. no. 215. der *Staubling.*
*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. no. 764. Ph. *Pulveraria*, der *Staubling.*
Bey uns etwas *selten.*
*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 390. no. 9. Ph. *Pulveraria*, die *Sommersprosse.*
*Wien. Schmett.* p. 105. zu den staubigten Spannern G. 1) mit einem *fast gleichfarbigten wellenrandigten Queerbande.*
Anm. In dieser Art *Defoliaria* L. viele *Abänderungen.* Eine davon mag wohl die *Pulveraria* L. seyn.
*Schriften* der Dronth. Ges. IV. p. 284. no. 43. Ph. *Pulveraria.* Nom. *Linn.*
*Fabric.* S. E. p. 627. no. 39. *Phalaena Pulveraria.*
*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1446. Ph. *Pulveraria.* Nom. *Linn.*
*Degeer* Ins. Tom. II. Part. I. p. 350. no. 3. t. 5. f. 19. *Phalene grise à bande olive.* *)
— *Uebers.* II Th. I B. p. 254. no. 3. t. 5. f. 19. die graue *Phaläne* mit der olivenfarbigen Binde.

216. *Fasciaria*, der *Bandling.*

*Mülleri* l. c. p. 708. no. 216. der *Bandling.*
*Berl. Mag.* IV. p. 520. no. 32. Ph. *Neustriaria*, der *Fichtenmesser.*
Röthlichgrau, mit einer etwas dunklern Binde durch die Oberflügel.
*Naturf.* XI. p. 71. no. 71. Ph. *Neustriaria* ist Phal. *Fasciaria* L. (v. *Rottemb.*).

*Gle-*

*) Je ne sçai pas au juste, si la Ph. G. *Pulveraria* L. est de cette espece.

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 503. no. 5. Ph. *Neustriaria*, der *Fichtenmesser*.

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 15. t. 3. die blassgrüne *Spannenraupe* auf den Pappeln.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 35. no. 88. Ph. *Fasciaria*, der *Bandling*.

*Wien. Schmett.* p. 96. A. *Halbeulenraupen*, Larvae *Seminoctuales; doppelstreifigte Spanner*, Ph. G. *Bistriatae*.

No. 2. *Kienbaumspannerraupe* (Pini Sylvestris); *Kienbaumspanner*, Ph. *Fasciaria.* *)

*Scop.* Ent. carn. p. 216. no. 534. Ph. *Cervinalis.* **)

*Long.* lin. 10. *Lat.* 6½.

Alae *cervinae;* anticae fasciis binis, fuscis, dentatis, lineaque alba undata submarginali; *posticae* linea nigra marginali.

*Fabric.* S. E. p. 628. no. 40. *Phalaena Fasciaria.* Nom. *Linn.*

*Fascia* lata ferruginea, margine antico et postico albo.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1444. Ph. *Fasciaria.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 160. no. 100.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis subdeflexis, exterioribus caesio-purpureis, fasciis trans-

*) Anm. Dieser Spanner ändert an Farben sehr merklich ab: bald grünlicht, bald matt- und blassboth, bald isabell- kupfer- oder zimmetfarbig. Vielleicht eine Spielart von *Prosapiaria* L. n. 222.

**) Den die Wiener Entomologen doch p. 111. als eine besondere Art betrachten, und mit dem *Geoffroyschen* Dent de scie für einerley halten: L. *Runzelraupen*, Larvae *Rugosae; mittelstreifigte Spanner*, Ph. G. *Mediofasciatae*. 1) Die Oberflügel braun. No. 1. *Rosenpappelspannerraupe* (Alceae Roseae); *Rosenpappelspanner*, G. *Cervinata* (Cervinalis *Scop.*).

transversis undulatis, interioribus pallidis, omnibus margine serrato.

La *dent de scie.*

*Long.* 8. lign.

*Degeer* Inſ. II. Part. I. p. 348. no. 2. *Phalene griſe à bandes.*

*Phalene* à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales d'un gris cendré avec deux larges bandes brunes découpées transverſes bordées de blanc, et une ligne blanche en Ziczac.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 252. no. 2. die *graue Bandphaläne.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und aſchgrauen horizontal ſtehenden Flügeln, mit zwo breiten braunen gezackten, weiſsgeräñdelten Queerſtreifen, und einer weiſſen zickzackichten Linie.

217. *Betularia*, der *Birkenſpanner.*

*Müller* l. c. p. 709. no. 217. der *Weiſsling.*

*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 765. Ph. *Betularia*, der *Chineſe.*

Nicht ſelten auf *Pappeln*, *Weiden* und *Hanf.*

*Berl. Mag.* IV. p. 518. no. 30. Phal. *Betularia*, der *Birkvogel.*

Ganz weiſs, mit ſchwarzen Punkten und Flecken beſäet.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 359. no. 3. Ph. *Betularia*, der *Birkenmeſſer.* p. 550. no. 9. Ph. *Betularia*, der *weiſſe Birkvogel.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 329. t. 39. f. 1-7. die zur N. V. 3 Kl. gehörige, bald braun, bald grau, oder auch gelblich grüne, groſse, glatte, aſtförmige *Span-*

*Spannenraupe* mit einem gespaltenen dreyeckigen braungelben Kopfe und zehn Füssen.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 85. no. 246. et no. 268. — grosse glatte astförmige *Spannenraupe.* (K. B. t. 39. f. 1 - 7.)

*Sulzers* Gesch. p. 161. t. 23. f. 1. Ph. *Marmorata*, der *Marmormesser.* *)

Der Oberflügel führt drey weisse und zwey braune Bänder, schwarz punktirt und gestreift. Das Männchen hat gekämmte Fühlhörner.

*Wien. Schmett.* p. 99. C. *Rinderaupen*, Larvae *Corticinae; spinnerförmige Spanner*, Ph. G. *Bombyciformes.*

1) *Große Spanner;* Männchen und Weibchen geflügelt.

No. 2. *Birkenspannerraupe* (Betulae albae); *Birkenspanner*, Ph. *Betularia.*

*Abhandl.* der königl. schwed. Akad. der Wiss. Uebers. 17 Th. p. 212. t. 6. f. 2. 3. (Carl *Klerk* Beschr. e. *Nachtvogels.*)

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 18. der *Birkenspanner.*

*Albin* Ins. t. 40. 41. 91. *Raupe* und *Spanner.* **)

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 152. no. 41. Phal. *Betularia.* Nom. *Linn.* ex ed. 1. Faun. Suec. no. 850.

*Bekm.*

*) Hr. *Sulzer* macht daraus eine eigene Art. Sein Exemplar ist in der Zeichnung dunkler als das kleemannische: beyde aber haben den deutlichen Linn. Karakter: *Thorace fascia atra.*

**) Auf allen 3 Tafeln des *Albins* einerley Art, nämlich diese *Betularia* L. Sie nimmt auf verschiedenen Bäumen verschiedene Gestalten an. Daher hat sie *Albin* für 3 besondere Arten gehalten. Und eben dies hat vermuthlich Hr. *Sulzern* bewogen, seine und die *kleemannische* Marmoratam für eine verschiedene Art anzusehen. S. *Wien. Schmett.* p. 99. Anm. *)

*Bekm.* Epit. S. L. p. 167. no. 217. Phal. *Betularia.* Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 88. f. 4. 5.

*Fabric.* S. E. p. 628. no. 41. *Phalaena Betularia.* Nom. *Linn.*

*Réaum.* Inf. Tom. II. t. 27. f. 15.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 423. Ph. *Betularia.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1445. Ph. *Betularia.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inf. Tom. I. p. 344. t. 17. f. 19-22. *Grande Chenille arpenteuse en bâton*, à dix jambes, brune, dont la tête est refendue profondement, et qui vit sur l'Orme.

— — p. 699. t. 17. f. 22.

*Phalene* à antennes en filets et à courte trompe; blanche, avec une infinité de points, de petites taches et rayes noires.

— Tom. II. Part. I. p. 344. no. 1. t. 5. f. 18. *Phalene blanche, tachetée de noir.* (*Mas.*)

*Phalene* à antennes barbues à trompe; à ailes horizontales blanches avec un grand nombre de taches, de points, et de mouchetures noires; à corcelet à raye noire.

— *Uebers.* I. 2 Qu. p. 98. t. 17. f. 19-22. der grosse, braune, zehnfüssige *Stockspanner* mit tief gespaltenem Kopfe auf den Rüstern.

— — 4 Qu. p. 122. t. 17. f. 22.

Ein weisser *Nachtvogel* mit unzählichen schwarzen Punkten, kleinen Streifen und Flecken, mit fadenförmigen Fühlhörnern, und kurzem Saugrüssel.

— II Th. I B. p. 250. no. 1. t. 5. f. 18. die *weisse schwarzgefleckte Phaläne.* (*Männchen.*)

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, horizontalen, weissen, schwarzgefleckten, punktirten, gesprenkelten Flügeln, und *schwarzgestreiftem Brustschilde.*

218. *Pantaria*, die *portugiesische Fleckstreife.* *)

*Müller* l. c. p. 709. no. 218. der *Panterling.*

*Wien. Schmett.* p. 115. N. *Zeichenraupen.*

3) Mit fast zerstreuten Fleckchen **).

No. 12. *Unbekannte Raupe. Weisser düsternfleckichter Spanner*, G. *Pantaria.* (Sylvata *Scop.*)

*Scop.* Ent. carn. p. 220. no. 546. Ph. *Sylvata.*

*Long.* lin. $8\frac{1}{2}$. *Lat.* 5.

Alba; alis *anticis* maculis fuscis subelatis, basi tamen et prope angulum posticum macula maiore obscuriore et colore ferrugineo inquinata; abdomine paleaceo, punctorum nigrorum seriebus 7.

In sylvis *faginis*, umbrosis.

219. *Wauaria*, das *lateinische V.*

*Müller* l. c. p. 709. no. 219. der *W-ling.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. no. 767. Ph. *Wauaria.* Ziemlich gemein auf den *Johannis-* und *Krauselbeerstauden.*

*Berl. Mag.* IV. p. 508. no. 5. Ph. *Vauaria*, das *lateinische V.*

Hellmausefarbig, mit einigen braunen Flecken, darunter einer ein V vorstellet.

*Rösels*

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Linné* fragt hiebey: An femina huius *aptera*? die Wiener Entomologen antworten p. 115. Anm. *) *Nein.* Oder das *Männchen* kann keine *gekämmte* Fühlhörner haben, und die Art müsste alsdann *Pantherata* heissen. Die Fühlhörner unserer Stücke sind nur *borstenförmig.*

*Röfels* Infektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 17. t. 4. die bräunlich grüne gelbgeftreifte und fchwarzpunktirte *Spannenraupe.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 35. no. 90. Phal. *Vauaria*, das *lateinifche V.*

*Frifch* Inf. III. p. 15. no. 6. 2 Pl. t. 3. f. 1 - 3. der grüngelbe und fchwarz befprengte *Spannenmeffer.*

*Gleditfch* Forftwiff. II. p. 1012. no. 5. Ph. *Wauaria*, des *grünen Spannenmeffers maufegraue und fchwarzbandige Motte.*

Das *lateinifche V.*

*Wien. Schmett.* p. 106. G. No. 12. *Johannisbeerfpannerraupe* (Ribes rubri); *Johannisbeerfpanner*, Ph. *Wauaria.*

*Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 371. no. 15. Ph. *Wauaria.*

*Bekm.* Epit. S. L. p. 167. no. 219. Phal. *Wauaria.* Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 58. f. 1.

*Syft. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 151. no. 36. *Le double W; Littera* W.

*Lift. Goed.* f. 12. *Somnolentus.*

*Act. Upfal.* 1736. p. 23. no. 44. *Papilio* alis planis albidis, fafciis linearibus nigricantibus.

*Petiv.* Muf. 3. no. 4. *Phalaena* hortenfis media cinerea, maculis fufcis notata.

*Raj.* Hift. Inf. p. 179. no. 41.

*Phalaena* minor, alis amplis, e cinereo albicantibus, interdum fufco - cinereis, 4 in exteriorum margine maculis linearibus e rufo nigricantibus.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1248. Ph. *Wauaria.* Vulgo *W littera.*

*Fabric.* S. E. p. 626. no. 32. *Phalaena Wauaria.* Nom. *Linn.*

*Larva* ſubpiloſa, viridis, nigro-punctata, linea dorſali lateribusque flavis.

*Pupa* nuda, brunnea, acuminata.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 427. Ph. *Wauaria.* Nom. *Linn.*

— p. 49. no. 434. Ph. *Viduaria.*

Pectinicornis, alis pallentibus, ſuperioribus margine inferiori quatuor maculis fuſcis; *poſtico linea arcuata* undulataque albida.

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1447. Ph. *Wauaria* et *Viduaria* F. Fr. no. 434. Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 132. no. 46.

*Phalaena* pectinicornis, ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, ſuperiorum margine exteriore macula triplici nigro-fuſca.

Le *Damas cendré.*

*Long.* 4. lign. *Larg.* 8. lign.

220. *Sacraria*, die *barbariſche Blutſtreife.* *)

*Müller* l. c. p. 709. no. 220. der *Blutling.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 768. Ph. *Sacraria.*

*Fabric.* S. E. p. 628. no. 42. *Phalaena Sacraria.* Nom. *Linn.*

221. *Purpuraria*, der *Purpurſpanner.*

*Müller* l. c. p. 710. no. 221. der *Purpurling.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 769. Ph. *Purpuraria.*

Bey uns etwas *ſelten.* **)

*Berlin. Mag.* IV. p. 516. no. 25. Phal. *Cruentaria*, das *rothe Band.*

Die

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Füeßl.* hat dabey *Schaeff.* Ic. t. 19. f. 16. angeführt; ſolche iſt aber Pyralis *ſanguinalis* L.

Die Oberflügel grünlichgelb mit *rothen Binden;* die Unterflügel oraniengelb.

*Naturf.* XI. p. 70. no. 25. Ph. *Cruentaria* ist L. *Purpuraria* (v. *Rottemb.*).

*Gleditsch* Forstw. I. p. 653 no. 31. Ph. *Purpuraria*, der *kleinste Spannenmesser.*

— II. p. 821. no. 16. Ph. *Purpuraria*, die *gelbgeflügelte Spannenmessermotte.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 9. *Wegetrittspannerraupe* (Polygoni avicularis); *Wegetrittspanner*, Ph. *Purpuraria.*

— p. 152. wird gezeigt, dass des *Schaeff.* Icon. t. 19. f. 16. nicht diese G. *Purpuraria*, sondern eher Pyralis *Sanguinalis* L. sey.

*Schaeff.* Icon. t. 173. f. 5. 6.

*Fabric.* S. E. p. 629. no. 45. *Phalaena Purpuraria.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 49. no. 432. Ph. *Purpuraria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1448. Ph. *Purpuraria.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 126. no. 34.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis deflexis luteo - rubris, *fascia duplici transversa sanguinea.*

L' *Ensanglantée.*

*Long.* 6. lign.

*Leche* nov. Inf. Spec. p. 32. no. 63.

*Phalaena* pectinicornis flava, alis *fasciis duabus rubentibus* transversalibus (*Mas*).

222. *Prosapiaria*, der *Blaurand.* *)

*Müller* l. c. p. 710. no. 222. der *Stammling.*



*) Vielleicht eine Spielart von G. *Fasciaria* L. S. *Wien. Schmett.* p. 96. Anm. *)

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1252.
Alis lutescentibus: fascia saturatiore vtrinque *striga glauca* distincta.
*Vddm.* Diss. 66. *Phalaena* alis primariis dilute cinnamomeis; fasciis duabus linearibus subcoeruleis.
*Clerk* Icon. t. 3. f. 1. Ph. *Prosapiaria.*
*Fabric.* Mantiss. p. 285. no. 26 - 27. *Phalaena Prosapiaria.*
Pectinicornis, alis lutescentibus, atomis strigisque tribus fuscis, tertia maculari. — In Europae *Nemoribus.*

223. *Pusaria*, der *kleine Weißling.*

*Müller* l. c. p. 710. no. 223. der *Kleinling.*
*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. no. 770. Ph. *Pusaria.*
In den *Wäldern* nicht selten.
*Berlin. Mag.* IV. p. 510. no. 10. Ph. *Pusaria*, das *braune Band.*
Ganz weiss, mit drey blassbraunen Queerstreifen.
— p. 621. E. Einige *Abänderungen.*
*Naturf.* XI. p. 66. no. 10. Ph. *Pusaria.*
Die *Raupe* gelblich grün, mit gelben Einschnitten in den Gelenken. Ueber den Rücken läuft eine karminrothe unterbrochene Linie.
— Deren *Hufnagel* in der Anm. gedenkt, sind bloss eine *Varietät* (v. *Rottemb.*).
*Pontopp.* N. G. v. Dännem. p. 220. no. 45. t. 17. Ph. *Pusaria.* Auf den schneeweissen Flügeln zween undeutliche Striche.
*Wien. Schmett.* p. 107. H. *Stricheraupen*, Larvae *Strigillatae*; *wechselnde Spanner*, Phal. G. *Alternantes.*

2) Mit drey Queerstrichen.

No. 4. *Weißbirkenspannerraupe* (Betulae albae); *Weißbirkenspanner*, Phal. *Pusaria.* (Strigata *Scop.*)

*Schaeff.* Icon. t. 111. f. 7.

*Scop.* Ent. carn. p. 218. no 541. Ph. *Strigata.*

*Long.* lin. 7. *Lat.* $4\frac{1}{2}$.

Alba; alis *anticis* strigis transversis tribus; *posticis* duabus ferrugineis.

*Fabric.* S. E. p. 625. no. 27. *Phalaena Pusaria.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 49. no. 430. Ph. *Pusaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1449. Ph. *Pusaria.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Ins. Tom. II. Part. I. p. 448. no. 4. t. 8. f. 12. *Phalene blanche à trois lignes grises.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues blanches, traversées de trois, et les inférieures de deux lignes grises.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 329. no. 4. t. 8. f. 12. Die *weisse Phaläne* mit drey *grauen Linien.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel und breiten weissen Flügeln, davon die Oberflügel drey, die Unterflügel aber zwo graue Queerlinien haben.

224. *Vespertaria*, der *portugiesische Abendspanner.* *)

*Müller* l. c. p. 710. no 224. der *Abendling.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 4. *Unbekannte Raupe; weißgrauer dunkelstreifiger Spanner*, Phal. *Vespertaria.*

*Fabric.* S. E. p. 626. no. 31. *Phalaena Vespertaria.* Nom. *Linn.*

Habitat in *Germania*, *Anglia.*



*) *Nicht abgebildet.*

225. *Papilionaria*, der *tagfalterartige Spanner.*
*Müller* l. c. p. 710. no. 225. der *Tagling.*
*Füeßl.* schweiz. Inſ. p. 40. no. 771. Ph. *Papilionaria*, der *Tagmeſſer.*
Nicht ſelten auf *Birken.*
*Friſch* Inſ. X. p. 20. no. 17. 3 Pl. t. 17. vom braunen *Spannmeſſer* mit den zwey Kopf- und Rückenſpitzen, und ſeinem *grünlichen* Papilion.
*Berl. Mag.* IV. p. 506. no. 1. Ph. *Praſinaria*, das *grüne Blatt.*
Grasgrün, mit drey ſchmalen gelblich weiſſen unterbrochenen parallellaufenden Queerſtreifen.
*Naturf.* XI. p. 63. no. 1. Ph. *Praſinaria*, iſt L. *Papilionaria* (v. *Rottemb.*).
*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. t. XII. p. 43. die ſchöne grüne breitleibige *Spannenraupe* mit dem beſondern Kopf (Foemina).
— IV. p. 134. t. 18. f. 3. Ein ungemein ſchöner celadongrüner *Nachtvogel* der dritten Klaſſe. (Mas.)
*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 96. Ph. *Papilionaria*, der *Tagling.*
*Wien. Schmett.* p. 97. B. no. 1. *Buchenſpannerraupe* (Fagi ſylvaticae); *Buchenſpanner*, Ph. *Papilionaria.*
*Fiſchers* N. G. v. Livl. p. 154. no. 371. Ph. *Papilionaria*, der *Tagling.*
*Schäffers* Abhandl. von Inſ. III. p. 83. c. tab. adj. f. 1-7. die *Ellernraupe.*
— Icon. t. 17. f. 1.
*Fabric.* S. E. p. 624. no. 20. *Phalaena Papilionaria.* Nom. *Linn.*
*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 425. Ph. *Papilionaria.* Nom. *Linn.*

*Mül-*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1450. Ph. *Papilionaria.* Nom. *Linn.*

226. *Tripunctaria*, der *asiatische Dreypunkt.*

*Müller* l. c. p. 710. no. 226. der *Punktling.*
*Seligm.* ausl. Vögel I. t. 69.
*Fabric.* S. E. p. 627. no. 35. *Phalaena tripunctaria.*

Pectinicornis, alis fuscis, *anticis* fascia macularia, *posticis* disco albo.

Fascia alarum e *maculis quinque* constat.

*Cramer* Pap. exot. II. p. 34. t. 22. Fig. E. Ph. *Tripunctaria.*

227. *Tricinctaria*, der *amerikanische Dreygürtel.* *)

*Müller* l. c. p. 711. no. 227. der *Gürtling.*
*Mus.* Ludov. Vlricae p. 394. no. 29.

*Corpus* magnitudo Pap. *Cardamines.*

*Antennae* pectinatae, fuscae.

*Alae* concolores, flavae, at supra pallidiores.

*Arcus* fuscus ex costa Primoris ad anum ducit.

*Arcus altera* a costa Primorum ducit per medium alae anterioris, ad marginem alae posticae.

*Arcus tertius* apicem Alae anterius claudit.

228. *Caffraria*, der *Kafferspanner.* **)

*Müller* l. c. p. 711. no. 228. der *Kafferling.*
*Linn.* Muf. Lud. Vlr. p. 393.

*Corpus* mediae magnitudinis, albicans, capite subflavescente.

*Antennae* albae, bifariam pectinatae, radiis fuscis.



*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

*Alae* ſubconcolores, patentes, integerrimae, albidae.

*Primores ſupra* punctis ocellaribus luteis, centro ferrugineo, *ſeptem* in faſciae formam digeſtae. Praeter haec tria ejusmodi puncta verſus baſin et unum medio.

— *ſubtus* concolores, ſed obſoletiores. Puncta 7 ut ſupra, ſed alia tantum duo, quorum unum in medio, unum ad marginem anticum verſus baſin.

*Poſticae* ſimiles, ſed puncta 7 obſoleta ſupra, ſubtus evidentiora.

Punctum ferrugineum, lunatum, in medio alae ſubtus, absque annulo luteo.

229. *Iatropharia*, der *amerikaniſche Purgirnuß-ſpanner.*

*Müller* l. c. p. 711. no. 229. der *Purgierling.*
*Cathol.* I. p. 46. Ph. *Iatropharia.*
*Clerk* Icon. t. 55 f. 3.
*Merian.* Surin. t. 38. f. 1.
*Fabric.* S. E. p. 627. no. 36. *Phalaena Iatropharia.* Nom. *Linn.*

III. *Mit borſtenförmigen Fühlhörnern und eckigen Flügeln.*

230. *Viridata*, der *grünflüglichte Spanner.**)
*Müller* l. c. p. 711. no. 230. der *Grünflügel.*
*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 772. Phal. *Viridata,* der *Grünflügel.*

Bey uns nicht ſelten in *Hecken und Gebüſche.*

*Wien. Schmett.* p. 97. B. no. 7. *Brombeerſpanner-raupe*

*) S. unſere Anmerk. bey Linn. *Vernaria* no. 195.

*raupe* (Rubi fruticosi); *Brombeerspanner*, Ph. *Viridata.*

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 19. der *Grünflügel; Brombeerspanner.*

*Réaum.* Inf. Tom. II. Mém. 9. p. 149. *Arpenteuse de la ronce.*

*Albin.* Inf. t. 48. f. 80. *Vierhörnigte Raupe* auf *Haselnußblättern.*

*Scop.* Ent. carn. p. 215. no. 530. Ph. *Viridata.*

*Long.* lin. $5\frac{1}{4}$. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Alae montano viridi colore tinctae, striga fimbriaque pallidiore, margine crassiore flavescente.

*Fabric.* S. E. p. 630. no. 54. *Phalaena Viridata.* Nom. *Linn.*

231. *Margaritata*, der *perlflüglichte Spanner.*

*Müller* l. c. p. 712. no. 231. der *Perlflügel.*

*Wien. Schmett.* p. 95. A. No. 1. *Haynbüchenspannerraupe* (Carpini Betuli); *Haynbüchenspanner*, Ph. *Margaritaria.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 49. no. 428. Ph. *Margaritaria.*

Subpectinicornis, *alis margaritaceis*, fascia rivulari lutescente, extremitatibus fuscis.

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1452. Ph. *Margaritaria.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1249. Ph. *Margaritaria.*

*Geoffr.* Inf. II. p. 137. no. 57.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis patentibus, sinuatis, pallido-glaucis, fascia transversa obscuriore.

Le *Celadon.*

*Long.* 9. lign. *Larg.* 21. lign.

*Réaum.*

*Réaum.* Inſ. I. t. 39. f. 13 14.
*Chenille à forme de poiſſon.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 132. no. 77. *Phalaena* minor alis ex coeruleo viridibus, exterioribus duabus lineis transverſis albicantibus diſtinctis.

232. *Notata*, der *Zeichenflügel.*

*Müller* l. c. p. 712. no. 232. der *Zeichenflügel.*

*Wien. Schmett.* p. 104. F. No. 11. *Weidenſpannerraupe* (Salicis Pentandrae etc.); *Weidenſpanner*, Ph. *Notataria* (Notata L.).

*Berl. Mag.* IV. p. 600. no. 53. Ph. *Exuſtata*, der *Vierling.*

Weiſsgrau, mit 4 braunen Flecken, welche in einem Viereck zuſammenſtehn; die Unterflügel mit einer ſtumpfen Spitze.

*Naturf.* XI. p. 76. no. 53. Ph. *Exuſtata* iſt Linn. *Notata* (v. *Rottemb.*).

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 34. Ph. *Exuſtata*, der *Vierling.*

*Clerk* Icon. t. 6. f. 11.

233. *Porata*, der *italiäniſche Punktflügel.* *)

*Müller* l. c. p. 712. no. 233. der *Punktflügel.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. *Stengelraupen*, Larvae *Pedunculares; zackenſtriemigte Spanner*, Phal. G. *Crenatoſtriatae.*

1) Mit ſtumpfgezähnten Unterflügeln; die Männchen mit ſehr gekämmten Fühlhörnern.

No. 7. *Aeberreißſpannerraupe* (Artemiſiae campeſtris); *Aeberreißſpanner*, Phal. *Selenaria* (*Porata* Linn.).

*Fabric.* S. E. p. 631. no. 56. *Phalaena Porata.*

Seti-

*) *Nicht abgebildet.*

Seticornis, alis pallidis, rufo pulverulentis, omnibus puncto ocellari albo. — In *Europa, Anglia.*

234. *Repandata*, der *wellenflüglichte Spanner.*

*Müller* l. c. p. 712. no. 234. der *Wellenflügel.*

*Füeßl.* schweiz. Inſ. p. 40. no. 773. Ph. *Repandata*, der *Wellenflügel.*

Nicht ſelten auf den *Eibenbäumen.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 2. *Weißbüchenſpannerraupe* (Carpini betuli); *Weißbüchenſpanner*, Ph. *Repandata.*

*Hollar* Inſ. t. 3. f. 2. (*Naturf.* IX. p. 222.) Ph. *Repandata.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 233. t. 18. f. 1. der mit ausgekappten, weiſs und grau gemengten, auch mit aus- und eingekappten ſchwarz und bräunlichgelb gezeichneten Flügeln gezierte *Spannenpapilion.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 750. no. 62. Ph. *Repandata:* der *aſchgraue* braungewäſſerte *Spannenmeſſervogel* mit eckigten Flügeln, wovon die untern einen zurückgeſchlagenen ſchwarzen Rand haben.

*Clerk* Icon. t. 6. f. 8. Ph. *Repandata.*

235. *Dubitata*, das *Räthſel.* *)

*Müller* l. c. p. 712. no. 235. das *Räthſel.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 610. no. 80. Ph. *Fuliginata*, das *Käuzlein.*

Glänzend grau, mit braunen ausgeſchwungenen Queerbinden, die Flügel ausgezackt.

*Naturf.* XI. p. 84. no. 80. Ph. *Fuliginata* iſt Linn. *Dubitata* (v. *Rottemb.*).

*Kleem.*

*) *Linné* ſagt davon: Statura *Geometrae;* Magnitudo *Noctuae;* Facies *Tineae.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 134. t. 28. f. 2. der mit gelblich grauen, schwarzbraungezeichneten *Vorder*-und mit aschfarbig braungrau gezeichneten, nett ausgekappten Hinterflügeln gezierte *Spannenpapilion.*

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 748. no. 51. Ph. *Fuliginata*, das *Käuzlein.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. *Sheineulenraupen*, Larvae *Noctuiformes*; *wellenstriemigte Spanner*, Ph. G. *Vndatae.*

1) Die Unterflügel klein ausgezähnt.

No. 3. *Wegedornspannerraupe* (Rhamni cathar.); *Wegedornspanner*, Ph. *Dubitata.*

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 150. no. 33. Phal. *Dubitata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 842. (ed. 2. no. 1259.)

*Clerk* Phal. t. 6. f. 2.

236. *Emarginata*, der *Rändelflügel.*

*Müller* l. c. p. 713. no. 236. der *Rändelflügel.*

*Berl. Mag.* IV. p. 526. no. 46. Ph. *Erosata*, die *Zackmotte.*

Okerbraun, mit 4 schwarzen Punkten, und 2 feinen Queerstreifen, die Flügel ausgeschwungen und gezackt.

*Naturf.* XI. p. 73. no. 46. Ph. *Erosata* ist L. *Emarginata* (von *Rottemb.*).

*Gleditsch* Forstw. I. p. 656. no. 43. Ph. *Erosata*, die *Zackmotte.*

— II. p. 753. no. 74. Phal. *Emarginata*, die *blassgelbe Spannenmessermotte*, *mit 2 hellgrauen Streifen und ausgeschweiften Flügeln.*

*Wien. Schmett.* p. 104. F. No. 10. *Unbekannte Raupe. Beinfarbener rothgestrichter Spanner*, Ph. *Emarginata.*

Anm.

Anm. Das *Männchen* dieses *Spanners* hat doch *haarichte* Fühlhörner (Antennae *pubescentes* L.).

*Fabric.* S. E. p. 631. no. 57. *Phalaena emarginata.*

Seticornis, alis subemarginatis, pallidis; fasciis duabus griseis punctoque fusco.

*Clerk* Phal. t. 4. f. 12.

IV. *Mit borstenförmigen Fühlhörnern und runden Flügeln.*

237. *Chaerophyllata*, der *schwarzflüglichte Spanner.*

*Müller* l. c. p. 713. no. 237. der *Kerbelfreund.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. no. 774. Ph. *Chaerophyllata*, der *Schwarzflügel.*

Nahe bey den Wäldern auf den Viehweiden nicht selten.

*Wien. Schmett.* p. 116. O. *Spreckenraupen*, Larvae *Punctatae; einfärbigte Spanner*, Ph. G. *Unicolores.*

No. 1. *Kälberkernspannerraupe* (Chaerophylli Sylvestris); *Kälberkernspanner*, Ph. *Chaerophyllata.*

*Gladbachs* Schmett. p. 41. t. 19. f. 4. 5. Phal. *Chaerophyllata: Mas* et *Foemina;* der *Mohr mit weissen Flügelspitzen.*

*Beschäftig.* der naturforsch. Fr. zu Berlin III. p. 33. t. 1. f. 3. Ph. G. *Chaerophyllata;* der *Mohr mit weissen Flügelspitzen.* (D *Kühn.*)

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 154. no. 55. Ph. *Atra.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 864.

*Act Upsal.* 1736. p. 23. no. 25. *Papilio* alis nigris, apicibus albis.

*Scop.*

*Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 115. no. 127. Ph. *Chaerophyllata.*

Alis *anticis* totis nigris, soloque apicis margine albo.

In Montibus circa *Schemnitzium* non rara.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. no. 1274. Ph. *atrata.*

*Fabric.* S. E. p. 634. no. 73. *Phalaena Chaerophyllata.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1457. Ph. *Chaerophyllata.* Nom. *Linn.*

238. *Clathrata*, der *gitterflüglichte Spanner.*

*Müller* l. c. p. 713. no. 238. der *Gitterflügel.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. no. 775. Ph. *Clathrata*, der *Gitterflügel.*

Nicht selten in Wäldern im *Grase.*

*Berl. Mag.* IV. p. 614. no. 90. Ph. *Clathrata*, das *Gitter.*

Weiss mit braunen gegitterten Streifen.

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 748. no. 54. Ph. *Clathrata*, das *gelbe Gitter.*

*Wien. Schmett.* p. 107. H. *wechselnde Spanner.*

3) Mit unter einander verflochtenen Nerven und Queerstrichen.

No. 5. *Unbek. Raupe. Gelblichtweisser braunschwarzgegitterter Spanner*, Ph. *Clathrata.*

*Sulzers* Gesch. p. 162. t. 23. f. 2. Ph. *Clathrata*, der *Gitterflügel.*

Gelblichweisse Flügel, mit drey bis vier Reihen brauner Linien, *gittermässig* unordentlich durchzogen.

*Scop.* Entom. carn. p. 217. no. 536. Ph. *Retialis.*

*Long.* lin. 6. *Lat.* 4.

Alae albae; venis fasciisque 4 murinis *reticulatae.*

*Fabric.*

*Fabric.* S. E. p. 634. no. 72. *Phalaena Clathrata.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 135. no. 53.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis; alis patentibus fuſcis, utrinque maculis albis quadrangulis teſſellatis.

Les *barreaux*. *Long.* 5. lign. *Larg.* 11. lign.

239. *Vndulata*, der *Wellenſpanner.*

*Müller* l. c. p. 713. no. 239. die *Braunwelle.*

*Berl. Mag.* IV. p. 512. no. 13. Ph. *Undulataria*, die *Wellenmotte.*

Weiſslichgrau, mit vielen dicht an einander liegenden wellenförmigen bräunlichen Queerlinien.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 752. no. 70. Ph. *Vndulata*, die *Werftmotte*, oder *Spannenmeſſer des Werfts.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K.

3) Feine Wellenlinien über alle Flügel.

No. 16. *Saalweidenſpannerraupe* (Salicis Capreae); *Saalweidenſpanner*, Ph. *Vndulata.*

*Fabric.* S. E. p. 632. no. 59. *Phalaena Vndulata.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1463. Ph. *Vndulata.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Phal. t. 6. f. 3.

240. *Flaveolata*, das *indianiſche Gelbfeld.*

*Müller* l. c. p. 714. no. 240. das *Gelbfeld.*

*Linn.* Muſ. Lud. Vlr. p. 396. no. 31.

*Corpus* quartae ſ. quintae magnitudinis; Capite, Thorace, Lingua, Abdomine flavum, apice abdominis nigro.

*Antennae* ſetaceae, nigrae.

*Pedes* flavo - et nigro - varii.

*Alae primores* utrinque nigrae.

*Macula* flava, magna, extrorſum crenata, antice ſinu excavata, ad marginem tenuiorem, verſus baſin.

*Poſticae* utrinque a baſi ultra medium flavae.

*Margo* diſcum verſus crenatus; reliquum alae verſus marginem exteriorem nigrum.

Nervi alarum apice albeſcunt.

*Cramer* Pap. exot. I. p. 139. t. 88. Fig. C. Ph. *Flaveolata.*

*Seba* Theſ. IV. t. 7. f. 7. 8. t. 13. f. 3. 4.

241. *Aeſtuata*, der *indianiſche Kettenſpanner.*

*Müller* l. c. p. 714. no. 241. t. 22. f. 9. der *Kettenvogel; der röthlichbraune weiſsgefleckte kapenſiſche Nachtvogel.*

*Fabric.* S. E. p. 638. no. 98. *Phalaena Aeſtuata.*

Seticornis, cyaneo - nigra, albo - maculata.

Statura P. *Vrticatae*, at paulo maior. Thorax et abdomen cyanea, ſtriis quatuor albis.

*Linn.* Muſ. Lud. Vlr. p. 397. no. 32. Ph. *Aeſtuata.*

*Corpus* tertiae magnitudinis, pallidum.

*Antennae* nigrae.

*Pedes* pallidi, albo - notati.

*Alae* omnes concolores utrinque, fuſcae.

— *Primores* utrinque concolores.

*Maculae* 2 oblongae, fere contiguae, albae ad baſin.

*Maculae* 6 albae oblongae, obtuſae, coadunatae, in diſco.

*Margo* linea alba notatus.

— *Poſticae* fuſcae.

*Macu-*

*Macula* ex 7 albis, linearibus, obtusis coadunatis, maiorem alae partem a basi versus marginem occupans.

*Margo* posticus lineola alba.

242. *Grossulariata*, der *gefleckte Tiger.*

*Müller* l. c. p. 714. no. 242. der *Tintenfleck.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. no. 776. Ph. *Grossulariata*, der *Tiger.*

Auf den *Krausel*- und *Johannisbeerstauden* häufig.

— Mag. der Entomol. II. p. 37. Ph. *Grossulariata.* (Chorh. *Meyer.*)

*Berl. Mag.* IV. p. 602. no. 59. Ph. *Grossulariata*, der *gefleckte Tiger.*

Weiss mit schwarzen Flecken; an einigen Orten safrangelb.

*Frisch* Ins. III. p. 14. no. 5. 2 Pl. t. 3. vom weissen *Spannmesser* mit schwarzen und gelben Flecken.

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 9. t. 2. die graulich weisse *Spannenraupe* mit dem gelben Bauche und schwarzen Flecken auf dem Rücken.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 102. no. 291. p. 112. no. 314. Ph. *Grossulariata*, der *Tintenfleck;* der *gefleckte Tiger*, der *Harlekin.*

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 1012. no. 6. Ph. *Grossulariata*, der *gefleckte Tiger.*

*Pontopp.* N. G. v. Dännem. p. 221. no. 48. Phal. *Grossulariata;* Dänisch: *Snare-Orm; Schlingenwurm.*

*Fischers* N. G. von Livl. p. 154. no. 372. Ph. *Grossulariata*, der *Tintenfleck.*

*Wien. Schmett.* p. 115. N.

3) Mit fast zerstreueten Fleckchen.

No. 11. *Stachelbeerſpannerraupe* (Ribes Groſſulariae); *Stachelbeerſpanner*, Ph. *Groſſulariata.*

*Blumenbachs* Handb. der N. G. p. 371. no. 16. Ph. *Groſſulariata.*

*Leske* Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. no. 20. Phal. *Groſſulariata*, der *Tiger.*

*Onomat.* hiſt. nat. P. 6. p. 374. Ph. *Groſſulariata.*

*Seligman* ausl. Vögel. Tom. VI. t. 97.

*Bekm.* Epit. S. L. p. 167. no. 242. Ph. *Groſſulariata.* Nom. *Linn.*

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 152. no. 40.

*Petiv.* Muſ. p. 4. no. 7. *Eruca* geometrica, pulchre variegata, *Groſſularias* depaſcens.

*Phalaena* hortenſis alba, maculis plurimis nigris inſignita.

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 178. no. 14.

*Phalaena* media, alis amplis albis, maculis crebris nigris et lineis transverſis luteis variis.

— p. 179. *Eruca* maiuſcula groſſula, albo-rubro-nigroque coloribus varia.

— p. 373. no. 1. *Eruca* Geometra Groſſulariam depaſcens.

*Schaeff.* Icon. t. 67. f. 1. 2.

*Scop.* Entom. carn. p. 219. no. 544. Ph. *Groſſulariata.*

*Long.* lin. 9. *Lat.* 6.

Alba; alis fuſco-maculatis, *anticis* ſupra baſi faſciaque flavis.

*Fabric.* S. E. p. 631. no. 58. *Phalaena Groſſulariata.* Nom. *Linn.*

*Larva* Geometra ſubpiloſa, ſupra cinerea, nigro-punctata, ſubtus flava.

*Pupa* ſubfolliculata, atra: faſciis flavis.

Mülle-

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 49. no. 435. Ph. *Grossulariata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1458. Phal. *Grossulariata.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 137. no. 56.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, maculis inaequalibus nigris plurimis, faſciaque transverſa lutea.

La *Mouchetée.*

*Long.* 8. lign. *Larg.* 1½. pouce.

*Bibl. Reg. Pariſ.* p. 16. f. 2. Ph. *hortenſis.*

243. *Crataegata*, der *Heckenkriecher.*

*Müller* l. c. p. 714. no. 243. t. 22. f. 10. der *Heckenkriecher.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 777. Ph. *Crataegata*, der *Gelbflügel.*

Bey uns *etwas ſelten.*

*Berl. Mag.* IV. p. 522. no. 37. Ph. *Luteolata*, die *gefleckte Zitrone.*

*Wien. Schmett.* p. 104. F. No. 13. *Weißdornſpannerraupe* (Crataegi Oxyac.); *Weißdornſpanner*, Ph. *Crataegata.*

*Beſchäft.* naturf. Fr. zu Berl. IV. p. 29. t. 2. Ueber den *Weißdornſpanner* nach Hn. *Sepp.* Ph. *Crataegata.* (*Bergſträſſer.*)

*Schrift.* der Dronth. Geſellſch. III. p. 368. no. 34. Ph. G. *Luteolata.* Nom. *Linn.* (*Ström.*)

*Bekm.* Epit. S. L. p. 167. no. 240. Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 163. f. 2. 3.

*Linn.* S. N. ed. 10. p. 525. no. 168. Ph. *Luteolata.*

*Uddm.* Diſſ. 70. *Phalaena* flava, alis patentibus macula tricuſpide fuſca, pupilla alba.

*Scop.* Ent. carn. p. 224. no. 556. Ph. *Crataegata.*

*Long.* lin. 9. *Lat.* 5½.

Lutea tota; alis anticis margine ſuperiore maculis ferrugineis 5, antice minoribus, macula ocellari dentata alba; iride fuſca, ferrugineae ſecundae adnata.

*Fabr.* S. E. p. 633. no. 65. *Phalaena Crataegata.* Nom. *Linn.*

*Larva* griſea, tuberculo dorſali didymo.

*Pupa* fuſca, folliculo cinereo, ferrugineo-maculato.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1459. Phal. *Crataegata.* Nom. *Linn.*

*Sepp* Nederl. Inſ. VI. p. 25. t. 6. De *Hagedoorn-Vlinder.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 139. no. 59.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus luteis, duplici punctorum cinereorum ordine, ſuperioribus maculis duabus, et rachi croceo-ferrugineis.

La *Citronelle rouillée.*

*Long.* 7. lign. *Larg.* 15. lign.

244. *Populata*, der *Pappelnſpanner.*

*Müller* l. c. p. 715. no. 244. die *Sudelſpitze.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 778. Ph. *Populata.*

Auf den *Pappelbäumen etwas ſelten.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 684. no. 8. Ph. *Populata*, der *Spannenmeſſer der Aſpen.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. *Schuppenraupen*, Larvae *Squamoſae; eckeſtreifige Spanner*, Ph. G. *Angulato-faſciatae.*

2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.

No. 17. *Aeſpenraupenſpannerraupe* (Populi Tremulae etc.); *Aeſpenſpanner*, Phalaena *Populata.*

*Fabric.*

*Fabric.* S. E. p. 632. no. 60. Phal. *Populata.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Phal. t. 5. f. 14. 15.

245. *Bilineata*, die *Doppellinie.*

*Müller* l. c. p. 715. no. 245. t. 22. f. 11. die *Ziegelwelle.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 779. Ph. *Bilineata*, die *güldene Kette.*

Ziemlich gemein in *Wäldern* im *Graſe.*

*Berl. Mag.* IV. p. 600. no. 55. Ph. *Bilineata*, die *güldne Kette.*

Pomeranzengelb, mit verſchiedenen weiſſen und braunen ſchmalen ſchlangenförmigen Queerſtreifen.

*Naturf.* XI. p. 77. no. 55. Ph. *Bilineata.* Die *Raupe* auf dem Rücken weiſsgrau, an den Seiten und am Bauche aber gelblichweiſs; zu Ende des Aprils im Graſe. (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtw. II. p. 753. no. 75. Ph. *Bilineata;* die gelbe *Spannenmeſſermotte* mit einer zurückgeſchlagenen Binde, und ſchwarz und weiſſen Saume.

*Schriften der Dronth. Geſellſch.* IV. p. 284. no. 44. Ph. *Bilineata.* Nom. *Linn.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 17. *Wiederſtoßſpannerraupe* (Lychnidis dioicae); *Wiederſtoßſpanner*, Ph. *Bilineata.*

*Anm.* Nur bey wenigen Stücken dieſer Art verbreiten ſich zwo ſchwarze Queerlinien auf den Oberflügeln einigermaſſen in ein Queerband. (Faſcia L.)

*Schaeff.* Icon. t. 12. f. 4.

*Scop.* Ent. carn. p. 227. no. 566. Ph. *Bilineata.*

*Long.* lin. 6. *Lat.* 4.

Alae utrinque ſulphureo-ochreaceae; anticae ſupra lineis binis repando-dentatis fuſcis albisque; omnibus ſubtus limbo fuſceſcente.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 50. no. 445. Ph. *Bilineata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 127. no. 1467. Phal. *Bilineata.* Nom. *Linn.*

*Fabric.* S. E. p. 635. no. 75. *Phalaena bilineata.* Nom. *Linn.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 143. no. 68.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis; alis patentibus luteis, lineolis fuſcis et albidis vndulatis, limbo dentato.

La *Brocatelle d'or.*

*Long.* 4. lign. *Larg.* 10 lign.

246. *Chenopodiata*, der *Gänſefußſpanner.*

*Müller* l. c. p. 715. no. 246. der *Hochpunkt.*

*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 780. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor.*

Bey uns *etwas ſelten;* in Bündten.

*Friſch* Inſ. V. p. 35. no. 14. 2 Pl. t. 14. von dem *grünen Ausſpanner* mit drey weiſſen Linien auf jeder Seite. *)

*Berlin. Mag.* IV. 602. no. 58. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor. Hellblaſsgelb* mit Ockerbraun ſchattirt.

*Kleem.* Beytr. I. p. 313. t. 37.

Die zur 3ten Klaſſe der *Nachtvögel* gehörige glatte mit eckigen Abſätzen und Zeichnungen begabte zehnfüſsige Spannenraupe.

*Naturforſch.* XI. p. 77. Ph. *Chenopodiata* iſt die *Kleemanniſche.*

1) Die

*) Dieſes Zitatum ſtehet nach *Linné* bey ſeiner *Prunata* no. 250; es gehöret aber eigentlich hierher. S. *Naturf.* XI. p. 77.

1) Diese gleichet einigermaſsen der Ph. *Prunata* L. no. 250. weil Kl. ſeine Figuren nach ſehr dunklen Exemplaren entworfen; die meiſten Stücke der *Chenop.* aber weit heller ausfallen.

2) Die Zeichnungen der Prunata weit dunkler als ſelbſt bey den dunkelſten Exemplaren der Chenop. auch hat die Prunata *nichts gelbliches* wie jene. (v. *Rottemb.*)

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 84. no. 244. p. 92. no. 266. Ph. *Chenopodiata.*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 1013. no. 7. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor.*

*Wien. Schmett.* p. 112. M.

1) Mit einer Ecke des Queerbandes.

No. 2. *Gänſefuſsſpannerraupe* (Chenopodii viridis); *Gänſefuſsſpanner*, Ph. *Chenopodiata* — und p. 153. daſs die *Schaeff.* Icon. t. 76. f. f. 4. 5. nicht *Chenopodiata*, ſondern ihre *Menſuraria* ſey p. 111. no. 2.

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 153. no. 47. Phal. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 856.

*Act. Vpſ.* 1736. p. 24. no. 47.

*Papilio* alis planis griſeis, faſcia pallida.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 49. no. 436. Ph. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 127. no. 1460. Phal. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

*Fabric.* S. E. p. 636. no. 83. *Phalaena Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

247. *Comitata*, der *Braunpunkt.*

*Müller* l. c. p. 715. no. 247. der *Geſelle.*

*Wien. Schmett.* p. 112. M.

 1) Mit

1) Mit einer Ecke des Queerbandes.

No. 3. *Unbekannte Raupe. Blaſsockergelber bräunlichtſtreifiger Spanner*, Ph. *Comitata.*
— Der *Chenopod.* ſehr ähnlich p. 108. (*)

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 50. no. 437. Ph. *Comitata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1461. Ph. *Comitata.* Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 51. f. 10.

*Fabric.* S. E. p. 632. no. 61. *Phalaena Comitata.* Nom. *Linn.*

248. *Plagiata*, der *breitbandirte Spanner.*

*Müller* l. c. p. 715. no. 248. das *Breitband.*

*Füeſsl.* ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 781. Phal. *Plagiata*
Bey uns *nicht ſelten.*

*Berl. Mag.* IV. p. 522. no. 38. Ph. *Plagiata*, das *doppelte Band.*
Der Grund weiſsgrau, mit einigen braunen Queerſtreifen, die theils heller, theils dunkler ſind.

*Wien. Schmett.* p. 111. L. *Runzelraupen;* Larvae *Rugoſae; mittelſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Medio-faſciatae.*

2) Die Oberflügel grau.

No. 4 *Johanniskrautſpannerraupe* (Hyperici perforati); *Johanniskrautſpanner*, Ph. *Plagiata.*

*Schaeff.* Icon. t. 12. f. 1. 2. *)

*Clerk* Phal. t. 6. f. 1.

249. *Miata*, der *Doppelhaken.*

*Müller* l. c. p. 716. no. 294. die *Dreynull.*

*Füeſsl* Magaz. der Entom. II. p. 37. Ph. *Miata.*

1) Die *Raupe* friſst *Eichblätter*, auch *Schlehenblätter.*

2) Das

*) An haec; an Mülleri *Matronaria*: Faun. Fridr. p. 49. no. 433.
— Zool. D. Pr. no. 1455.

2) Das dritte Paar der Vorderbeine ganz roth.

3) Die Haut des Oberleibes durchaus grünlich gelb. (Chorh. *Meyer.*)

*Berl. Mag.* IV. p. 522. no. 41. Ph. *Miata*, der *Doppelhaken.*

Blaſsgrün mit vielen ſchmalen braunen Strichen und grauen Flecken.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 751. no. 67. Ph. *Miata*, der *Doppelhaken.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 222. t. 27. f. 1-8. *Raupe bis zum Ey des Vogels.*

— p. 120. t. 14. f. 1. 2. *Männchen* und *Weibchen.*

Die platte, bräunlich graue, mit einem herzförmig getheilten Kopfe, und hellem rautenförmig ſchwarz gezeichneten Rücken verſehene zehnfüſsige *Spannenraupe.*

Der zur N. V. 3 Kl. gehörige bräunlich graue und mit vielen Kappenzügen gezierte *Nachtpapilion.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 104. no. 295. Ph. *Miata.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M.

2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.

No. 21. *Mayenſpannerraupe* (Betulae albae); *Mayenſpanner*, Ph. *Miaria* (*Miata* L.).

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 154. no. 54. Phal. *Miata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 863.

*Act. Vpſal.* 1736. p. 23. no. 43.

*Papilio* alis planis vireſcentibus cinereo-maculatis.

*Réaum.* Inſ. II. t. 29. f. 11-13.

*Fabric.* S. E. p. 633. no. 67. *Phalaena Miata.*

Seticornis, alis griſeis, faſciis tribus viridibus, intermedia latiore, fuſco-undata.

250. *Pru-*

250. *Prunata*, der *Graufügel.* *)

*Müller* l. c. p. 716. no. 250. der *Greisflügel.*
*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 40. no. 782. Ph. *Prunata.*
Bey uns *etwas selten.*
*Berl. Mag.* IV. p. 600. no. 54. Ph. *Prunata*, der *Erpel.*
Dunkelbraun, mit 2 bräunlich gelben irregulären Queerstreifen, welche etwas weissgefleckt sind.
*Naturf.* XI. p. 76. no. 54. Ph. *Prunata.* Die Grundfarbe der *Raupe* von Hrn. *Hufnagel* unrichtig beschrieben, die niemals grün, sondern braun ist.
*Wien. Schmett.* p. 105. Anm. (*) p. 113. M.
2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.
No. 19. *Zwetschkenspannerraupe* (Pruni domesticae); *Zwetschkenspanner*, Ph. *Prunata.*
*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 155. no. 57. Phal. *Prunata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 866.
*Clerk* Phal. t. 7. f. 3. Ph. *Prunata.*
*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1464. Ph. *Prunata.* Nom. *Linn.*
*Fabric.* S. E. p. 632. no. 64. *Phalaena prunata.* Nom. *Linn.*

251. *Aversata*, der *Finnländer.*

*Müller* l. c. p. 716. no. 251. der *Finnländer.*
*Füessl.* schweiz. Inf. p. 40. no. 783. Ph. *aversata.*
Bey uns selten.
*Wien. Schmett.* p. 117. P.

No.

*) Der *Chenopodiatae* ähnlich. S. unsere Anm. bey derselben no. 246. Es gehört auch das vom Linné zu Prunata gesetzte Ziatum *Frisch* zu jener.

No. 3. *Unbek. Raupe. Bleicher braungeſtrichter Spanner*, Ph. *Averſata*.

*Cathol*. A. p. 636. Ph. *Averſata*.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1468. Ph. *Averſata*.

*Clerk* Phal. t. 5. f. 7.

252. *Triſtata*, der *Trauerſpanner*.

*Müller* l. c. p. 716. no. 252. der *Kloſtervogel*.

*Füeßl*. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 784. Ph. *Triſtata*. Auf Birken *nicht ſelten*.

*Gleditſch* Forſtw. II. p. 752. no. 71. Ph. *Triſtata*, die *weiß- und ſchwarzgewäſſerte Spannenmeſſermotte*.

*Wien. Schmett*. p. 113. M.

3) Mit hellem Durchſchnitte, und unrichtigem Rande des Queerbandes.

No. 26. *Unbekannte Raupe; ſchwarzer* weiſsſtreifigter und ſchwarzgeſtrichter Spanner.

*Syſt. Nat*. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 53. Phal. *Triſtata*. Nom. *Linn*. ex Faun. Suec. ed. 1. no. 862.

*Act. Vpſ*. 1736. p. 23. no. 25. *Papilio* alis planis albidis; faſciis latis cinereis.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 50. no. 440. Ph. *Triſtata*. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1465. Ph. *Triſtata*. Nom. *Linn*.

*Fabric*. S. E. p. 634. no. 71. *Phalaena Triſtata*. Nom. *Linn*.

Othon. *Fabric*. Faun. Groenland. p. 195. no. 149. Ph. *Triſtata*. Nom. *Linn*.

Habitat in *Betula nana*, et aliis fruticibus montanis, numeroſa ſatis.

*Clerk* Phal. t. 1. f. 13.

253. *Al-*

253. *Alchemillata*, der *Alchemiſtenkrautſpanner.*

*Müller* l. c. p. 715. no. 253. der *Alchymiſt.*

*Wien. Schmett.* p. 112. M.

No. 8. *Sinauſpannerraupe* (Alchemillae vulgaris); *Sinauſpanner*, Ph. *Alchemillata.*

*Martini* allgem. Geſch. d. N. II. p. 46. der *Alchymiſt*; der *Sinauvogel.*

*Schriften der Dronth. Geſellſch.* IV. p. 285. No. 45. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 50. no. 444. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1466. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Inſ. Tom. I. p. 358. t. 22. f. 10-16.

Petite *Chenille arpenteuſe* verte, à dix jambes, dont les ſeparations des anneaux ſont jaunâtres, qui a tout le long de chaque côté du corps une raye blanche, et qui vit ſur le Pied-de-Lion.

— — p. 695. t. 22. f. 16.

*Petite Phalene* à antennes à barbes, et à trompe, dont les ailes ſupérieures, qui ſont amples et plates, ont des rayes ondées blanchâtres et brunes.

— Tom. II. Part. I. p. 357. no. 10. *Phalene du Pied-de-Lion.*

*Phalene* à antennes barbues à trompe; à ailes horizontales d'un brun griſeatre avec deux bandes ondées, et une ligne en Ziczac blanches ſur les ſupérieures.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 106. t. 22. f. 10-16. die kleine zehnfüſsige *Spannenraupe*, mit gelblichen Ringgelenken, und an beyden Seiten weiſsgeſtreift, auf der *Sinau*, oder *Alchemiſtenkraut.*

De-

*Degeer Uebers.* 4 Qu. p. 117. t. 22. f. 16.

Ein kleiner *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, und Saugrüssel, dessen breite und flache Oberflügel weissliche und braune wellenförmige Streifen haben.

— II Th. I B. p. 259. no. 10. die *Sinau- oder Alchymistenkrautphaläne.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und horizontalen braungraulichen Flügeln, mit zwo gewässerten weissen Binden, und einer solchen zickzackichten Linie auf den Oberflügeln.

254. *Hastata*, das *Spießband.*

*Müller* l. c. p. 717. no. 254. das *Spießband.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. no. 785. Ph. *Hastata*, das *Spiessband.*

Bey uns *etwas selten.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 369. t. 44.

Die zehnfüssige, zimmetbraune, zartgestreifte, und auch schwarze *Spannenraupe* mit gelben hufeisenförmigen Seitenflecken und zehn Füssen.

*Wien. Schmett.* p. 113. M.

No. 25. *Birkenbuschspannerraupe* (Betulae albae); *Birkenbuschspanner*, Ph. *Hastata.*

*Syst. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 154. no. 52. Ph. *Hastata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 861.

*Act. Ups.* 1736. p. 24. no. 46. *Papilio* alis planis cinereis, fasciis albis punctatis.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1470. Ph. *Hastata.* Nom. *Linn.*

*Fabric.* S. E. p. 634. no. 70. *Phalaena Hastata.* Nom. *Linn.*

Fasciae

Fasciae albae in nostro specimine *nigro-punctatae.* *)

Othon. *Fabric.* Faun. Groenl. p. 195. no. 150. Phal. *Hastata.* Nom. *Linn.* — *Gras-Fidrilde.* Ol. 602?

Frequenter obvia mensibus Iunio et Iulio in *graminibus* et *muscis* montanis: *Tristatae* socia, oui similis, sed *maior.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 455. t. 8. f. 20. no. 7.

*Phalene blanche et noire à tache en fer-de-pique.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues blanches avec des bandes ondées et des taches découpées noires tant en dessus qu'en dessous.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 334. no. 7. t. 8. f. 20. die weiss und schwarze *Phaläne* mit einem weissen Fleck, wie ein *Pikeneisen.*

Die Phaläne mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und breiten weissen Flügeln, mit gewässerten Binden, und schwarzen gezackten Flecken sowohl unten als oben.

255. *Albicillata,* das *Weissfeld.*

*Müller* l. c. p. 717. no. 255. das *Weissfeld.*

*Füessl.* schweiz. Inf. p. 41. no. 786. Ph. *Albicillata,* der *Weissger.*

Bey uns *etwas selten.*

*Wien. Schmett.* p. 114.

2) Die Queerflecken am Unterrande.

No. 8. *Unbekannte Raupe.* *Milchweisser grauschwarzfleckichter Spanner,* Ph. *Albicillata.*

*Knochs*

*) Auch in dem *Kleemannischen* Exemplar.

*Knochs* Beyträge zur Insektengeschichte I St. p. 40. no. 7. t. 2. f. 8. *Larva.* Ph. *Albicillata*, der *weisse Schleyer.*

*Fabric.* S. E. p. 634. no. 69. *Phalaena Albicillata.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Phal. t. 1. f. 12.

256. *Dealbata*, der *Bleicher.*

*Müller* l. c. p. 717. no. 256. der *Tüncher.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 41. no. 786. Ph. *Dealbata*, der *Bleicher.* In den Wäldern *nicht selten.*

*Wien. Schmett.* p. 116. O.

No. 3. *Unbek. Raupe; weisser, unten schwarzadrichter Spanner*, Ph. *Dealbata.*

*Sulzers* Gesch. p. 162. t. 23. f. 3. Ph. *Dealbata*, der *Getünchte.*

Die *obere Seite* der Flügel wie getüncht, die *untere* mit schwarzen Adern durchzogen, und auf den vordern ein halbes Möndchen.

*Fabric.* S. E. p. 632. no. 63. *Phalaena dealbata.* Nom. *Linn.*

257. *Marginata*, der *Braunrand.*

*Müller* l. c. p. 717. no. 257. der *Flicker.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. no. 788. Ph. *Marginata*, der *Braunrand.*

Nicht selten in *Wäldern im Grase.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 524. no. 42. Ph. *Marginata*, das *Kalbfell.*

Ganz weiss, mit dunkelgraubraunem Rande und Flecken.

— p. 625. O. ändert sich sehr ab; einige beynahe ganz weiss.

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 570. no. 8. II. p. 751. no. 66. Phal. *Marginata*, das *Kalbfell.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N.
No. 10. *Haselstaudenspannerraupe* (Coryli Avellanae); *Haselstaudenspanner*, Ph. *Marginata.*
*Sulzers* Kennz. der Inf. t. 16. f. 96. Ph. *Hortulata.**)
*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 154. no. 51. Phal. *Marginata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 860.
*Act. Vps.* 1736. p. 23. no. 37. *Papilio* alis planis albis, maculis fuscis inaequalibus marginalibus.
*Mülleri* Faun. Fridr. p. 50. no. 441. Ph. *Marginata.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1471. Ph. *Marginata.* Nom. *Linn.*
*Fabric.* S. E. p. 633. no. 66. *Phalaena Marginata.* Nom. *Linn.*

Interdum maculae aliquot nigrae in disco alae.

*Scop.* Entom. carn. p. 221. no. 548. Ph. *Staphylaeata.* **)

*Long.*

*) Dies war nach *Linn.* S. N. ed. 10. Ph. *Vrticalis*, und ed. 12. Ph. *Vrticata.* Allein wenn man damit die Abbildung der wahren *Vrticata*: *Rösel* I. N. V. 4. t. 14. vergleicht, so wird man die deutlichste Verschiedenheit bemerken. Vermuthlich ist daher *Sulzers* Phaläne eine Abänderung der Ph. *Marginata*, wobey sie auch *Linné* angeführt hat. S. *Wien. Schmett.* p. 122. Anm.

**) Variat 1) *Alis anticis*: fascia abrupta fusca, maculisque marginalibus coalitis.
2) — — macula parva disci maculisque marginalibus disjunctis.
3) — — posticis limbo, et disco fusco-fasciato maculato.
4) — — limbo maculis tribus obsoletis, fascia nulla.

*Long.* lin. $5\frac{3}{4}$. *Lat.* $3\frac{2}{3}$.

Alae concolores albae; *anticae* limbo maculisque binis contiguis fuſcis craſſiori margini impoſitis.

Habitat in *Fago*, in *Staphylaea.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 139. no. 60.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, margine undique interrupte fuſcis.

La *Bordure entrecoupée.*

*Long.* 6. lign. *Larg.* 11. lign.

258. *Ocellata*, das *Doppelauge.* *)

*Müller* l. c. p. 717. no. 258. das *Doppelauge.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 789. Ph. *Ocellata*, das *Doppelauge.*

Bey uns *ſelten.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M.

No. 9. *Labkrautſpannerraupe* (Galii Sylvatici); *Labkrautſpanner*, Phal. *Ocellata* (Faſciata *Scop.*).

*Scop.* Ent. carn. p. 221. no. 550. Ph. *Faſciata.* **)

*Long.* lin. 6. *Lat.* lin. $4\frac{1}{2}$.

Alba; alis *anticis* ſupra baſi faſciaque dentata fuſco ferrugineoque variis.

*Fabric.* S. E. p. 635. no. 78. *Phalaena ocellata.*

Seticornis, alis albidis; faſcia lata abbreviata fuſca, puncto ſubocellari atro.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 50. no. 442. Ph. *Ocellata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1472. Ph. *Ocellata.* Nom. *Linn.*



*) *Nicht abgebildet.*

**) Habitus et faſciae figura, ut in *Friſch* Inſ. VII. t. 19. f. 2; ſed *colores alii.*

259. *Janata*, der *indianiſche Janus.**)

*Müller* l. c. p. 717. no. 259. der *Janus.*

*Linn.* Muſ. Lud. Ulr. p. 398. no. 33. Ph. *Janata.*

*Corpus* mediae magnitudinis, cinereum.

*Antennae* nigrae.

*Oculi* nigri.

Alae *primores ſupra* cinereae.

Lineae 2, ſaturatiores, undatae, transverſae, remotae.

— — *ſubtus* cinereo-fuſcae.

Faſcia alba in medio.

— *poſticae ſupra* fuſcae.

Faſcia transverſalis alba.

Maculae 3, albae, in margine poſtico.

— — *ſubtus* cinereae.

Lineae 2 ſaturatiores, undatae, transverſae.

Macula rotunda, fuſca, ad angulum ani.

*Fabric.* S. E. p. 635. no. 80. *Phalaena Janata.*

Seticornis, alis cinereis; *poſticis* ſupra fuſcis, faſcia punctisque tribus albis.

260. *Fluctuata*, die *Waſſerwoge.*

*Müller* l. c. p. 718. no. 260. die *Waſſerwoge.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 790. Ph. *Fluctuata.*

Bey uns *etwas ſelten.*

*Friſch* Inſ. VII. p. 27. no. 19. 3 Pl. t. 19. vom gelbgrünen *Spannenmeſſer*, der aufgerichtet zu ſtehen pflegt.

*Berlin.*

*) *Nicht abgebildet.*

*Linné* hat dabey eine artige Bemerkung:

Si Ph. *ſubtus* inſpiciatur, ut cauda ſit capitis loco, refert eandem ſupra, antice viſam: hinc *Hyſteronproteron*, vel *Janus bifrons* audit.

*Berlin. Mag.* IV. p. 604. no. 65. Ph. *Fibulata*, der *Gartenvogel.*

Weisslich mattaschgrau gefleckt mit einigen dunkelbraunen Flecken auf den Oberflügeln.

*Naturf.* XI. p. 80. no. 65. Ph. *Fibulata* ist L. *Fluctuata* (v. *Rottemb.*).

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 750. no. 61. Ph. *Fluctuata*, das *weisse Bändchen.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N.

1) Das Queerband vom Aussenrande bis in den Mittelraum.

No. 2. *Merrettigspannerraupe* (Cochleariae Armoraciae); *Merrettigspanner*, Phal. *Fluctuata.*

*Schriften der Dronth. Ges.* III. p. 369. no. 35. Phal. *Fluctuata.* Nom. *Linn.*

*Olaffens* Reis. durch Isl. I. p. 320. no. b. Ph. *Fluctuata.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. *Sepos.* p. 594. no. 2288. *Phalaena* seticornis spirilinguis, alis patentibus, *erucae viridis baccilliformis.*

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 150. no. 35. *Phalene du Pin.* Ph. *Fluctuata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 844.

*Fabric.* S. E. p. 634. no. 74. *Phalaena Fluctuata.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 50. no. 443. Ph. *Fluctuata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1473. Ph. *Fluctuata.* Nom. *Linn.*

*Schaeff.* Icon. t. 123. f. 6.

*Geoffr.* Ins. II. p. 143. no. 69.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis patentibus albis, lineolis fasciisque plurimis undulatis fuscis, limbo subdentato.

La *Brocatelle d'argent.*
*Long.* 4. lign. *Larg.* 10. lign.

261. *Juniperata*, der *Wacholderspanner.*

*Müller* l. c. p. 718. no. 261. der *Wacholdervogel.*
*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 1044. no. 1. Ph. *Juniperata*, die *aschgrauliche Wacholdermotte.*
*Wien. Schmett.* p. 110. K.
4) Ein wechselndes Queerband über die Oberflügel.
No. 29. *Krammetsspannerraupe* (Juniperi communis); *Krammetsspanner*, Ph. *Juniperata.*
*Cathol.* I. p. 405. Ph. *Juniperata.*
*Clerk* Phal. t. 2. f. 8.

262. *Sordiata*, die *Saloppe.*

*Müller* l. c. p. 718. no. 262. die *Saloppe.*
*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 41. no. 791. Ph. *Sordiata.*
Bey uns *etwas selten.*
*Röfels* Insektenbel. III. p. 17. t. 3. f. 3. die grosse, weisslichbraune, gewässerte, mit Spitzen und Knöpflein besetzte Spannenraupe der *Rose von Jericho.*
*Kleem.* Beytr. I. p. 235. t. 28. f. 3. 4. der grosse mattledergelbe und mit etwas ausgekappten Hinterflügeln begabte *Spannenpapilion.*
Der hellumbrabraune mit hellledergelben Flecken, und ausgekappten Hinterflügeln besetzte *Spannenpapilion.*
*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 32. Ph. *Sordiata*, die *Saloppe.*
*Wien. Schmett.* p. 105. Anm. Ph. *Sordiata.*
*Naturf.* XV. p. 65. t. 3. f. 15. (*Capieux.*) (*Mas.*)
*Schaeff.* Icon. t. 164. f. 6. 7.

263. *Incanata*, das *Mäntelchen.*

*Müller* l. c. p. 718. no. 263. das *Mäntelchen.*

*Berl. Mag.* IV. p. 604. no. 62. Ph. *Incanata*, das *Mausfell.*

Durchaus weissgrau.

*Wien. Schmett.* p. 117. P.

No. 7. *Unbekannte Raupe: graulichter wellenschattigter Spanner*, Ph. *Incanata.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 51. no. 447. Ph. *Incanata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1474. Ph. *Incanata.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Phal. t. 3. f. 3.

264. *Immutata*, der *Scheckspanner.*

*Müller* l. c. p. 719. no. 264. der *Nämliche.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P.

No. 6. *Ehrenpreißspannerraupe* (Veronicae agrestis); *Ehrenpreisspanner*, Ph. *Immutata.*

*Fabric.* S. E. p. 637. no. 92. *Phalaena Immutata.*

Seticornis, alis niveis, strigis undatis, obscurioribus, margine postico nigro punctato.

*Geoffr.* Inf. II. p. 140. no. 63.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis patentibus albidis, atomis cinerascentibus, et fascia undulata ferruginea.

*Les Atomes à une bande.*

*Long.* 5. lign.

*Clerk* Phal. t. 6. f. 11.

265. *Immorata*, der *Leimflügel.* *)

*Müller* l. c. p. 719. no. 265. der *Zauderer.*



*) *Nicht abgebildet.* Gar kein anderer Schriftsteller dabey angeführt.

266. *Remutata*, der *Randpunkt*.

*Müller* l. c. p. 719. no. 266. Ein *Anderer*.

*Berl. Mag.* IV. p. 606. no. 69. Ph. *Trilineata*, der *Dreyſtrich*.

Blaſsgelb, etwas grau beſtäubt, mit drey braunen Queerlinien durch alle vier Flügel, und einem ſchwarzen Punkt in jedem Oberflügel.

*Naturf.* XI. p. 81. no. 69. Ph. *Trilineata* iſt Ph. *Remutata* L. (v. *Rottemb.*)

*Wien. Schmett.* p. 117. P.

No. 5. *Zaunwickenſpannerraupe* (Viciae ſepium); *Zaunwickenſpanner*, Ph. *Remutata*.

*Clerk* Phal. t. 5. f. 12.

267. *Succenturiata*, der *Anhangſpanner*.

*Müller* l. c. p. 719. no. 267. der *Anhang*.

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 792. Ph. *Succenturiata*.

Bey uns *nicht ſelten*.

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 30. t. 7. das gelblich grüne *Spannenräuplein der Pflaumenbäume*, mit dem dunklen Rückenſtreif.

*Friſch* Inſ. IV. p. 31. no. 16. 2 Pl. t. 16. der kleine *Spannenmeſſer* auf dem *Till*.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 17. no. 27. Ph. *Succenturiata*, p. 36. no. 92. Ph. *Succenturiata*. *)

*Wien. Schmett.* p. 110. K.

No. 24.

führt. Sollte dieſe *Linné* allein gekannt haben? In der Faun. Suec. ed. 2. no. 1290. die genaueſte Beſchreibung.

*) Es muſs aber an beyden Orten heiſſen: *Röſel* I. Phal. 3. t. 7. und nicht t. 8. weil no. 93. dieſe *Röſelſche* t. 8. mit Recht als eine *neue* Geometra angeführt wird, die *Linné* Faun. Suec. ed. 2. Sepoſ. p. 548. no. 2286. beſchrieben hat.

No. 24. *Unbekannte Raupe* *); *aschgrauer langflüglichter Spanner*, Ph. *Succenturiata* (*Signata Scop.*).

*Scop.* Ent. carn. p. 231. no. 578. Ph. *Signata*. *Long.* lin. 5. *Lat.* 3½.

Albida; alis *anticis supra* strigis duabus obsoletis fuscescentibus, punctoque nigro utrinque.

*Fabric.* S. E. p. 637. no. 86. *Phalaena Succenturiata.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Phal. t. 5. f. 2.

*Geoffr.* Inf. II. p. 141. no. 64.

*Phalaena* seticornis spirilinguis, alis patentibus albis, superioribus macula nigra, et fascia duplici in extremo undulata.

La *Phalene blanche à tache et bande noire.* *Long.* 4. lign. *Larg.* 9. lign.

268. *Strigilata*, der *kammstrichigte Spanner*.

*Müller* l. c. p. 719. no. 268. der *Kammstrich*.

*Wien. Schmett.* p. 117. P.

No. 4. *Vogelwickenspannerraupe* (Viciae Craccae); *Vogelwickenspanner*, Ph. *Strigilata.* (*Variegata Scop.*)

*Scop.* Ent. carn. p. 222. no. 553. Ph. *Variegata.* **) *Long.* lin. 6½. *Lat.* 4¼.

 Albi-

*) Die Wiener Entomologen müssen die *Röselsche* I. Ph. 3. t. 7. nicht für die Succent. L. halten, weil sie die Raupe für noch unbekannt ausgeben; indessen haben sie doch den vom *Linné* angemerkten karakteristischen Umstand mit angeführt: *langflüglichter Spanner:* und den hat die *Röselsche*.

**) Hr. Rath *Scop.* setzt hinzu: Cf. Geom. *Immutata* Cel. *Linn.* Dies mag den Ritter bewogen haben, diese Varieg. mit seiner Immut. für einerley zu halten, und bey der letztern den Scop. zu zitiren.

Albida; atomis fasciisque undatis tenuibus fuscis variegata; alis omnibus puncto medio margineque nigro punctato utrinque.

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1476. Ph. *Strigilata.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Phal. t. 5. f. 2.

269. *Didymata*, der *Zwillingspanner.*

*Müller* l. c. p. 720. no. 269. der *Doppellappen.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M.

No. 13. *Megerkrautspannerraupe* (Galii Molluginis); *Megerkrautspanner*, Ph. *Galiata.* (*Didymata Linn.*) *)

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 50. no. 438. Ph. *Didymata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1477. Ph. *Didymata.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Phal. t. 6. f. 10.

270. *Rectangulata*, der *Winkelhaken.*

*Müller* l. c. p. 720. der *Winkelhaken.*

*Berl. Mag.* IV. p. 524. no. 43. Ph. *Viridulata*, das *grüne Bändchen.*

Schwarzgrau mit hellgrünen Queerstreifen; die Flügel länglicht. **)

*Naturf.* XI. p. 73. no. 43. Ph. *Viridulata*, scheint Ph. *Rectangulata* L. zu seyn; jedoch bin ich noch ungewiss. (v. *Rottemb.*)

*Gleditsch* Forstw. II. p. 750. no. 59. Ph. *Rectangulata*, der *rechte Winkel.*

*Wien.*

*) Die 2 braunen Fleckchen (macula fusca biloba L.) oder Punkte am Unterrande zeigen sich nur bey einigen *Spielarten.*

**) Hufnagels Rectangulata p. 606. no. 71. ist nicht des *Linné* Rectangulata. S. *Naturf.* XI. p. 82.

*Wien. Schmett.* p. 112. L.
No. 9. *Aepfelspannerraupe* (Pyri mali); *Aepfelspanner*, Ph. *Rectangulata.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1478. Phal. *Rectangulata.* Nom. *Linn.*

*Fabric.* S. E. p. 636. no. 85. *Phalaena Rectangulata.* Nom. *Linn.*

*Clerk* Phal. t. 8. f. 6.

271. *Ocellata*, das *Violetauge.* *)

*Müller* l. c. p. 720. no. 271. das *Violetauge.*

272. *Vrticata*, der *Nesselspanner.*

*Müller* l. c. p. 720. no. 272. t. 22. f. 12. der *Nesselspanner.*

*Füeßl.* schweiz. Inf. p. 40. no. 793. Ph. *Vrticata*, der *Nesselspanner.*
Auf den *Nesseln* häufig.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 78. no. 225. p. 89. no. 258. Ph. *Vrticata*, der *Nesselspanner.*

*Rösels* Insektenbel. I. N. V. 4 Kl. p. 37. t. 14. der grünlichgraue dunkel und hellgestreifte *Blattwickler* auf der grossen Brennessel.

*Wien. Schmett.* p. 121. B. kurzschnauzigte *Zünsler*, Ph. *Pyralides Brevipalpes.*
1) Die Flügel gewässert (undulatae).
No. 12. *Brennesselzünslerraupe* (Vrticae urentis); *Brennesselzünsler*, Ph. Pyr. *Vrticalis.*

*List.* *Goed.* p. 150. no. 61. f. 61.
Eruca *Munda*, quia puram se conservare solet.
— s. *Paresca*, quia *pari* eam persequuntur. *Raj.*

*) Nicht mit no. 258. *Ocellata* zu verwechseln. Diese gegenwärtige *nicht abgebildet.*

*Raj.* Hift. Inf. p. 222. no. 73.

*Phalaena* minor, alis oblongis ex albo et coeruleo nigricante variis, ad exortum flavis.

*Bekm.* Epit. S. L. p. 167. no. 272. Phal. *Vrticata.* Nom. *Linn.*

*Syft. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 151. no. 37. *Teigne de l'Ortie.*

*Petiv.* Gazoph. p. 51. *Phalaena minor* alba, maculis nigrefcentibus ornata.

*Schaeff.* Icon. t. 119. f. 1. 2.

*Scop.* Ent. carn. p. 220. no. 547. Ph. *Vrticata.*

*Long.* lin. 6¾. *Lat.* 4.

Alae albae; macularum fufcarum ordinibus transverfis binis pofticis; thorace anoque flavis.

*Poda* Muf. graec. t. 2. f. 2. Ph. *Saliftaria.*

*Hollar* Inf. t. 10. f. 3. (*Naturf.* IX. p. 223.) Phal. *Vrticata.*

*Fabric.* S. E. p. 639. no. 101. *Phalaena Vrticata.* Nom. *Linn.*

*Larva* 16-poda, nuda, albida, dorfo fufco, collari bipunctato. Latet intra folium urticae, quod contorquet.

Conjungit *Geometras Linn.* cum *Pyralidibus.*

*Pupa* folliculata, brunnea.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 51. no. 448. Ph. *Hortulata*, et no. 449. Ph. *Vrticata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1479. Ph. *Vrticata.* Nom. *Linn.*

*Réaum.* Inf. I. t. 49. f. 17. 18.

*Geoffr.* Inf. II. p. 135. no. 54.

*Phalaena* feticornis fpirilinguis, alis patentibus albo-fufcoque nebulofis, ano flava.

La *queue jaune.*

*Long.* 7. lign.

Degeer

*Degeer* Inſ. I. p. 418. Mém. 13. t. 28. f. 12-19.

*Chenille* à ſeize jambes, verte, avec une raye d'un verd obſcur tout le long du dos, qui plie les feuilles de l'*Ortie*, et ſ'en nourrit.

— — p. 701. t. 28. f. 18. 19.

*Phalene* à antennes en filets; blanche, à taches noires nuancées, et à corcelet jaune.

— Tom. II. Part. I. p. 445. §. 1. no. 1. *Phalene queue jaune.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes horizontales blanches, à taches ovales noires, et dont le corcelet et le derriere ſont jaunes.

— *Ueberſ.* I. 3 Qu. 13te Abh. p. 23. t. 28. f. 12-19.

Die ſechzehnfüſsige grüne *Neſſelraupe* mit der langen dunkelgrünen Rückenſtreife.

— — 4 Qu. p. 124. t. 28. f. 18. 19.

Ein weiſſer *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, ſchwarzſchattirten Flecken und gelbem Halskragen.

— II Th. I B. p. 326. no. 1. der *Gelbſchwanz.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen weiſſen Flügeln, mit eyförmigen ſchwarzen Flecken, gelbem Bruſtſchilde und Schwanze.

273. *Limbata*, der *Braunſaum.* *)

*Müller* l. c. p. 720. no. 273. der *Braunſaum.*

*Wien. Schmett.* p. 122. B.

4) Mit einem Mittelpunkt.

No. 20. *Ginſterzünſlerraupe* (Spartii juncei); *Ginſterzünſler*, *Pyralis Limbalis.* S. p. 121. Anm. (*) **)

*Fa-*

*) *Nicht abgebildet.*

**) Wo aber die Zahlen verſetzt zu ſeyn ſcheinen.

*Fabric.* S. E. p. 639. no. 102. *Phalaena Limbata.* Nom. *Linn.*

274. *Nymphaeata*, der *Seeblumenſpanner.*

*Müller* l. c. p. 721. no. 274. der *Schwimmer.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 794. Phal. *Nymphaeata*, der *Seeblumſpanner.*

Im Graſe, an feuchten Orten, nahe bey Seen und Sümpfen.

*Berlin. Mag.* IV. p. 618. no. 99. Ph. *Nitidulata*, der *Waſſervogel.*

Shneeweiſs, mit einigen irregulären hellbraunen Zeichnungen.

*Naturf.* XI. p. 89. no. 99. Ph. *Nitidulata* iſt L. *Nymphaeata.* (v. *Rottemb.*)

*Wien. Schmett.* p. 121. B.

2) Die Flügel gegittert (*Reticulatae*).

No. 13. *Seeblumenzünſlerraupe* (Nymphaeae luteae ac albae); *Seeblumenzünſler*, *Pyralis Nymphaealis.*

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 227. no. 87. *Phalaena* minor, piſcinas et ſtagna frequentans, alis utrisque albo et fuſco colore variis.

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 152. no. 42. *Phalene de la Lentille d'eau:* Phal. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 851.

*Act. Upſ.* 1736. p. 24. no. 52. *Papilio* alis planis e nitido albis, omnibus *reticulatis.*

*Schaeff.* Icon. t. 189. f. 4. 5.

*Fabric.* S. E. p. 640. no. 105. *Phalaena Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 51. no. 450. Ph. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1480. Ph. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

275. *Po-*

275. *Potamogata*, der *Saamenkrautſpanner.*

*Müller* l. c. p. 721. no. 275. der *Saamkrautſpanner.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 794. Ph. *Potamogata*, der *Saamkrautſpanner.*

Häufig am *Katzenſee.*

*Berl. Mag.* IV. p. 604. no. 66. Ph. *Nymphaeata*, die *Nymphe.*

Glänzend weiſslich, mit olivenbraunen in einander gezogenen Zeichnungen.

*Naturf.* XI. p. 80. no. 66. Ph. *Nymphaeata* iſt L. *Potamogata.* (v. *Rottemb.*)

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 152. no. 44. *Phalene du Potamogeton.* Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 852.

*Act. Vpſal.* 1736. p. 24. no. 51. *Papilio* alis planis nitidis albis, inferioribus reticulatis.

*Schaeff.* Icon. t. 118. f. 5. 6.

*Fabric.* S. E. p. 642. no. 104. *Phalaena Potamogata.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 51. no. 451. Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1481. Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.*

276. *Stratiotata*, das *Amphibium.*

*Müller* l. c. p. 721. no. 276. das *Amphibium.*

*Wien. Schmett.* p. 123. B.

No. 23. *Waſſeraloëzünslerraupe* (Stratiotis Aloidis); *Waſſeraloëzünsler*, *Pyralis Stratiotalis.*

*Mannigf.* (neue) 3 Jahrg. p. 350.

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 153. no. 45. Phal. *Stratiotata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 854.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 142. no. 66.

*Pha-*

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, faſciis linearibus fuſcis, punctoque nigro.

La *Phalene griſe à lignes brunes et point noir.*

*Long.* 3½. lign. *Larg.* 9. lign.

*Degeer* Inſ. I. Mém. 16. p. 517. t. 37. f. 1-19.

*Chenille* aquatique verte, qui au premier coup d'œil ſemble être velue, et qui mange les feuilles du *Stratiotes* ou de l' *Aloë Paluſtris* de Bauhin.

— — p. 702. t. 37. f. 16-18.

*Phalene* à antennes en filets, à ailes planes, griſes, nuancées de blanc ſur le mâle, et brunes ſur la femelle: d'une Chenille aquatique du *Stratiotes.*

— *Ueberſ.* I. 3 Qu. p. 85. t. 37. f. 1-19.

Eine grüne *Waſſerraupe*, die beym erſten Anblick rauch ſcheint, und die Blätter der Waſſeraloe friſst.

— — 4 Qu. p. 125. t. 37. f. 16-18.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, flachen, grauen, bey dem *Männchen* weiſs ſchattirten, und bey dem *Weibchen* braunen Flügeln, von einer *Waſſerraupe* der Waſſeraloe.

— II. Part. I. p. 426. no. 15. *Phalene aquatique du Stratiotes.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues griſes ou brunes avec un point blanc bordé de noir, et dont les ailes inférieures ſont blanches à rayes noires.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 309. no. 15. die *Waſſeraloëphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und grauen oder braunen nieder-

derhangenden Flügeln, mit einem weissen schwarzgerändelten Punkt, und weissen schwarzgestreiften Unterflügeln.

277. *Paludata*, der *Sumpfspanner.* *)

*Müller* l. c. p. 721. no. 277. der *Morastläufer.*

*Berl. Mag.* IV. p. 526. no. 47. Phal. *Institata*, die *Kreidenmotte.*

Ganz schneeweiss; der Rand mit gelben Flecken; in den Unterflügeln ein schwarzer Punkt.

*Naturf.* XI. p. 74. no. 47. Ph. *Institata:* wo es sehr wahrscheinlich gemacht wird, dass diese Inst. L. *Paludata* sey. (v. *Rottemb.*)

278: *Lemnata*, der *Wasserlinsenspanner.*

*Müller* l. c. p. 721. no. 278. der *Wasserschmetterling.*

*Berl. Mag.* IV. p. 614. no. 88. Ph. *Gemmata*, der *Edelstein.*

Schneeweiss, in der Mitte eines jeden Flügels ein schwarzer Punkt; der Hinterrand der Unterflügel schwarz mit einer Reihe weisser Punkte.

*Naturf.* XI. p. 86. no. 88. Ph. *Gemmata* ist L. *Lemnata*, und beynahe der *kleinste* unter den Spannmessern. (v. *Rottemb.*)

*Wien. Schmett.* p. 121. B.

5) Einfarbigte (Vnicolores).

No. 30. *Wasserlinsenzünslerraupe* (Lemnae majoris).

La *Chenille de lentille aquatique Réaum.*

*Wasserlinsenzünsler*, Ph. *Lemnalis.*

*Raj.*

*) *Nicht abgebildet.*

*Raj.* Hist. Inf. p. 205. no. 102.
*Phalaena aquatica* minima alba sive argentea.
*Fabric.* S. E. p. 640. no. 106. *Phalaena Lemnata.* Nom. *Linn.*
*Réaum.* Inf. II. t. 32. f. 1 et 13.
*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1482. Ph. *Lemnata.* Nom. *Linn.*
*Syst. Natur.* du Regn. Anim. II. p. 153. no. 43. *Phalene de lentille d'eau;* Ph. *Lemnata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 852.

279. *Hyalinata*, der *amerikanische Durchsichtige.* *)
*Müller* l. c. p. 722. no. 279. der *Dreyeckflügel.*
*Fabric.* S. E. p. 640. no. 103. *Phalaena hyalinata.* Nom. *Linn.*
Parva; abdomen cylindricum, niveum, ano valde barbato, barba nigra.

280. *Cingulata*, der *Ringelflügel.*
*Müller* l. c. p. 722. no. 280. der *Ringelflügel.*
*Wien. Schmett.* p. 123. B.
6) Mit hellen Wellenstrichen (Albido-repandae).
No. 31. *Unbekannte Raupe. Schwarzer Zünsler mit weissem Queerstriche*, Ph. *Cingulalis.*
*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 162. no. 96. Phal. *Cingulata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 906.
*Act. Upsal.* 1736. p. 23. no. 38. *Papilio* alis planis nigris; linea transversa alba.
*Fabric.* S. E p. 638. no. 93. *Phalaena Cingulata.* Nom. *Linn.*
*Geoffr.* Inf. II. p. 194. no. 32.
*Tinea* nigra, fascia transversa alba.

La

*) *Nicht abgebildet.*

La *Teigne cordeliere.*
*Long.* 2½. lign.
*Clerk* Phal. t. 2. f. 10.

281. *Brumata*, der *Froſtſchmetterling.*

*Müller* l. c. p. 722. no. 281. der *Winterſchmetterling.*

*Füeßl.* ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 796. Ph. *Brumata*, der *Winterſpanner.*

Bey uns nicht ſelten, doch niemals ſchädlich.

*Berl. Mag.* IV. p. 612. no. 85. Ph. *Hyemata*, der *Spätling.*

Gelblichgrau mit blaſsbraunen ausgekappten Queerlinien.

*Naturf.* XI. p. 85. no. 85. Ph. *Hyemata* iſt L. *Brumata.* (v. *Rottemb.*)

*Kleem.* Beytr. I. p. 256. t. 31. f. 1-12.

Die zur 3ten Kl. der N. V. gehörige ſchädliche, geſellige, glatte, grüne, mit weiſſen Streifen gezierte, und mit 10 Füſsen verſehene *Spannraupe* *)

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 26. no. 58. Ph. *Brumata*, der *Froſtſchmetterling.*

*Friſch* Inſ. V. p. 35. no. 14. 2 Pl. t. 14. der grüne *Ausſpanner* mit drey weiſſen Linien auf jeder Seite.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 787. no. 13. Ph. *Brumata*, der *Froſtnachtſchmetterling.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K.

No. 9. *Frühebirnſpannerraupe* (Pyri communis); *Frühebirnſpanner*, G. *Brumata* (Fem. aptera).



*) Vielleicht eine Mittelart: Ph. *Brumata* media. *Glaſer* von ſchädl. Raupen p. 18.

*Glasers* physikal. ökon. Abhandl. von den schädlichen Raupen der Obstbäume, verbess. Aufl. p. 18. 117. 150. Ph. *Brumata* minor, der *Frostnachtschmetterling.*

*Bekmanns* phys. ökon. Bibl. V. p. 249. Phal. *Brumata.*

*Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss.* XXXII. p. 19. Bericht vom Fangen der *Frostnachtschmetterlinge* (*Cronstedt*).

— — p. 26. angestellte Versuche, die *Frostschmetterlinge* zu hindern. (*Adlerheim.*)

*Raj.* Hist. Ins. p. 181. no. 4.

*Phalaena* alis latis, exterioribus albicantibus cum tinctura viridi aut coerulea.

— — p. 369. no. 9. *Eruca* geometra parva, pallide seu ex flavo virens, lineolis albicantibus tum secundum longitudinem tum transversis.

*Fabric.* S. E. p. 636. no. 81. *Phalaena Brumata.* Nom. *Linn.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 424. Ph. *Brumata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1483. Phal. *Brumata.* Nom. *Linn.*

*Degeer* Ins. 1. Mém. XI. p. 360. t. 24. f. 11-16.

*Chenille arpenteuse* verte, à rayes longitudinales blanches qui plie ou attache ensemble les feuilles de plusieurs especes d'arbres, et qui s'en nourrit.

Le Papillon *femelle* de cette Chenille est *sans ailes.*

— — p. 700. t. 24. f. 11. 12. 13. 14.

*Phalene* à antennes en filets, à longs poils; d'un brun clair et grisâtre, dont les ailes de la femelle sont très-courtes.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 452. no. 6. *Phalene hyemale.*

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues d'un gris-brun à lignes transverſes plus obſcures, et dont la femelle manque d'ailes.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. 11te Abh. p. 107. t. 24. f. 11-16.

Die grüne *Spannraupe*, mit langen weiſſen Streifen, welche die Blätter von vieler Art Bäumen, die ihr zur Nahrung dienen, zuſammenwickelt, und von der das Schmetterlingsweibchen *keine Flügel* hat.

— — 4 Qu. p. 123. t. 24. f. 11-14.

Ein hellbrauner graulicher Nachtvogel, mit fadenförmigen langbehaarten Fühlhörnern, deſſen Weibchen ſehr kurze Flügel hat.

— II B. I Th. p. 531. no. 6. die *Winterphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und breiten graubraunen Flügeln, mit dunklern Queerlinien; das Weibchen ungeflügelt.

*Unabgebildete Linnéiſche Spanner.*

1. *Pennaria* no. 209.
2. *Pantaria* no. 218.
3. *Sacraria* no. 220.
4. *Veſpertaria* no. 224.
5. *Tricinctaria* no. 227.
6. *Caffraria* no. 228.
7. *Porata* no. 233
8. *Ocellata* no. 258
9. *Immorata* no. 265.
10. *Ocellata* no. 271.
11. *Limbata* no. 273.

12. *Paludata* no. 277.
13. *Hyalinata* no. 279.

## *Neue Arten von Spannern.*
(Geometrae.)

1. Ph. *Geom. Hirtaria*, der *Rauchflügel.* *)

*Linn.* S. N. ed. 12. Tom. III. App. Anim. p. 225.
Pectinicornis; alis *hirtis* canis: ſtrigis duabus nigris, poſterioribus approximatis, antennis atris.

— Faun. Suec. ed. 2. p. 325. no. 1236.

*Clerk* Phal. t. 7. f. 1.

*Wien. Schmett.* p. 99. C. *Spinnerförmige Spanner.* No. 3. *Kirſchenſpannerraupe* (Pruni Ceraſi); *Kirſchenſpanner*, G. *Hirtaria.*

*Degeer* Inſ. Tom. I. Mém. 11. p. 354. t. 22. f. 6-9. **)
*Grande Chenille arpenteuſe* en bâton, à dix jambes, brune, à rayes longitudinales, qui tirent ſur la couleur de chair, dont le haut de la tête n'eſt point refendu, et qui mange les feuilles du Saule et de l'Ozier.

— — p. 697. t. 22. f. 9.
*Phalene* à antennes à barbes noires, ſans trompe, griſe à rayes ondées noirâtres ſur les ailes, et à corcelet tacheté de noir.

— Tom. II. Part. I. p. 306. no. 5. *Phalene à ailes velues.*
*Phalene* à antennes barbues, ſans trompe; à ailes presque horizontales griſes velues, avec des mouchetures noires ſur les nervures.

*Degeer*

*) An G. *Hirtaria Fabric.* Mantiſſ. p. 286? Pectinicornis, alis cinereis; ſtriga fuſca undata albae innata.

**) Die Puppe liegt *über* 19 *Monat*, ehe der Vogel auskömmt.

*Degeer Uebers.* I. 11te Abh. 2 Qu. p. 103. t. 22. f. 6-9.

Der grosse, braune, zehnfüssige, fleischfarbig gestreifte *Stockspanner* auf den Bruch- und Zachweiden mit ungespaltenem Kopfe.

— — 4 Qu. p. 120. t. 22. f. 9.

Ein grauer *Nachtvogel* mit schwarzen bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüssel, mit wellenförmigen schwärzlichen Streifen auf den Flügeln, und einem schwarzgefleckten Halskragen.

— II Th. I B. p. 220. no. 5. der *Rauchflügel.*

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, und mit grauen, haarichten, auf den Adern schwarzgefleckten, beynahe horizontal liegenden Flügeln.

2. *Defoliaria*, der *Blatträuber.*

*Linn.* S. N. ed. 12. Tom. III. p. 225. Ph. *Defoliaria.*

Pectinicornis; alis griseis, medio albis; puncto lituraque postica nigris; *Femina aptera.*

— Faun. Suec. ed. 2. p. 326. no. 1238. Ph. *Defoliaria.*

*Clerk* Phal. t. 7. f. 4.

*Réaum.* Ins. II. t. 30.

*Rösels* Insektenbel. III. p. 83. t. 14.

Die zu der 3 Kl. der N. V. gehörige rothbraune *Spannenraupe*, nebst ihrer Verwandlung in einen *ungeflügelten* Papilion weibliches Geschlechts. (*Weibchen.*)

— p. 241. t. 40. f. 6. das *geflügelte Männchen.*

*Füeßl.* schweiz. Ins. p. 40. t. 766. Ph. *Defoliaria.*

Bey uns sehr gemein auf allen Arten von Stauden, Gewächsen und Bäumen.

— Magaz. der Entomol. II. p. 36. Ph. *Defoliaria.* (Chorh. *Meyer.*)

*Berl. Mag.* IV. p. 518. no. 29. Ph. *Pulveraria*, die *Sommersprosse*.

Okergelb mit einer breiten braunen Binde, und vielen braunen Punkten; das *Weibchen* hat keine Flügel.

*Naturforsch.* XI. p. 70. no. 29. Ph. *Pulveraria* ist L. *Defoliaria*. (v. *Rottemb.*)

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 390. no. 9. Ph. *Pulveraria*, die *Sommersprosse*.

*Abhandl.* der schwed. Akad. der Wiss. XXXII. p. 21. Ph. *Defoliaria*.

*Glasers* physikal. ökon. Abhandl. von schädlichen Raupen der Obstbäume p. 24. 30. die *große Art von Frostnachtschmetterlingen*: Ph. *Brumata maior*, Ph. *Defoliaria* t. 2. f. 1-6.

*Mülleri* Faun. Fr. p. 48. no. 424. Ph. *Defoliaria*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1451. Ph. *Defoliaria*. Nom. *Linn.*

*Fabric.* S. E. p. 625. no. 30. *Phalaena Defoliaria*. Nom. *Linn.*

— Femina aptera, nigro-*punctata*.

*Larva* ferruginea, stria laterali sulphurea.

*Pupa* brunnea.

*Müllers* Suppl. und Reg. B. p. 313. no. 236. c. Phal. *Defoliaria*, der *Schabflügel*.

3. *8-maculata*, der *Achtfleck*.

*Linn.* Mantiss. p. 540.

Seticornis, alis nigris; omnibus maculis duabus albis rotundatis. Habitat in *Anglia*.

*Müllers* Suppl. und Reg. B. p. 313. no. 236. d. Ph. *8-maculata*, der *Engländer*.

4. *Ri-*

4. *Ribearia*, der *Johannisbeerſpanner*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 326. no. 1239.
Pectinicornis; alis griſeis fuſco-ſubfaſciatis, faſcia poſtica moniliformi.

*Clerk* Phal. t. 6. f. 5. Ph. *Ribeata*.

5. *Pendularia*, der *Hangpuppenſpanner*.

*Linn.* Faun. Suec. p. 327. no. 1244. Ph. *Pendularia*.
Pectinicornis; alis omnibus cinereis ocello ferrugineo ſtrigaque nigro-punctata.
Habitat in *Salice*.
Larva *Incarnata*, *pupa pendula*.

*Clerk* Phal. t. 7. f. 5.

*Wien. Schmett.* p. 107. H. *wechſelnde Spanner*. No. 1. *Hangelbirkenſpannerraupe* (Betulae albae); *Hangelbirkenſpanner*, Ph. *Pendularia*.

*Réaum.* Inſ. II. ed. 4. p. 364-366. t. 29. f. 1.

*Degeer* Inſ. Tom. II. Part. I. p. 360. no. 2. t. 6. f. 7. *Phalene à Criſalide ſuſpendue*.
*Phalene* à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales d'un blanc ſale un peu cendré avec deux lignes transverſes de points noirs et un petit oeil roux, et dont les inférieures ſont un angle.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 262. no. 2. t. 6. f. 7. die *Hangpuppenphaläne*.
Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen weiſsgraulichen, etwas aſchfarbigen Flügeln, mit zwo Queerlinien von ſchwarzen Punkten, und einem kleinen braunröthlichen Auge, deren Unterflügel einen Winkel machen.

6. *Carbonaria*, der *Kohlenſpanner*.

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 327. no. 1246.

Pectinicornis *nigra;* alis ſtrigis tribus albidis undatis ſubinterruptis; antica remotiore.

*Clerk* Phal. t. 1. f. 11. Ph. *Carbonaria.*

7. *Fuliginaria*, der *Schlottfegerſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 327. no. 1247. Ph. *Fuliginaria.*

Pectinicornis; alis nigris albo punctato-vndulatis, ſubtus griſeſcentibus.

*Clerk* Phal. t. 8. f. 7.

*Fabric.* S. E. p. 629. no. 46. *Phalaena fuliginaria.*

Pectinicornis; alis atris, albo-ſubfaſciatis; ſubtus griſeis; faſciis fuſcis.

8. *Margaritaria*, der *Perlflügel.* *)

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1249.

Subpectinicornis; alis *margaritaceis;* faſcia rivulari luteſcente, extremitatibus fuſcis. — *Holmiae.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1452. Ph. *Margaritaria.* Nom. *Linn.*

9. *Quadrifaſciaria*, die *Vierbinde.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1253.

Pectinicornis, alis griſeis, faſcia fuſca undata, puncto atro.

*Clerk* Phal. t. 6. f. 4. Ph. *Quadrifaſciata.*

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 48. no. 431. Ph. *Quadrifaſciaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1453. Ph. *Quadrifaſciaria.* Nom. *Linn.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 289. no. 77. 78.

Se-

*) Nicht mit *Linn. Margaritata* no. 231. zu verwechſeln.

Seticornis; alis griſeo-fuſcis, faſcia lata nigra; puncto ſubocellari nigro.

In Europae *pratis ſylvaticis.*

*Alae* ſubtus albidae puncto centrali ſtrigisque nigris.

*Wien. Schmett.* p. 112. M. *Eckeſtreiſigte Spanner.* No. 6. *Unbek. Raupe; bräunlicher düſternſtreiſiger Spanner*, Ph. *Quadrifaſciaria.*

10. *Bidentata*, der *zweyzähnichte Spanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1255.

Seticornis, alis eroſis griſeis, puncto nigro ocellari; ſuperioribus faſcia ſaturatiore. — In *Roſa et Alno.*

*Clerk* Phal. t. 7. f. 2. Geometra *Bidentata.*

*Degeer* Inſ. Tom. I. Mém. 12. p. 378. t. 25. f. 1-6.

*Chenille arpenteuſe en bâton*, d'un brun griſeatre; à quatorze jambes, ou à ſix intermédiaires de grandeur inégale, quatre de ces jambes étant très-petites.

— — p. 695. t. 25. f. 6.

*Phalene* à antennes à barbes et à trompe; à ailes découpées d'un brun griſeatre, dont les ſupérieures ſont traverſées de deux rayes ondées obſcures, qui renferment un point noir.

— Tom. II. Part. I. p. 343. no. 1.

*Phalene brune à deux rayes et un point.*

*Phalene* à antennes barbues, à trompe; à ailes découpées horizontales d'un brun griſeatre avec deux rayes transverſes ondées obſcures bordées de blanc et un point noir au milieu.

— *Ueberſ.* I. 12te Abh. 2 Qu. p. 121. t. 25. f. 1-6.

Die

Die graulichbraune, vierzehnfüſsige aſtförmige *Spannraupe* mit ſechs ungleichen Bauchfüſſen, darunter viere ſehr klein ſind.

*Degeer Ueberſ.* I. 4. Qu. p. 118. t. 25. f. 6.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und braungraulichen ausgezackten Flügeln, davon die Oberflügel zwo dunkle wellenförmige Streifen haben, zwiſchen welchen ein ſchwarzer Punkt befindlich iſt.

— II Th. I B. p. 249. no. 1. die *braune zwogeſtreifte und einpunktirte Phalene.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und gezackten horizontalſtehenden, braungraulichen Flügeln, mit zwo wellenförmigen dunkeln, weiſsgerändelten Queerſtreifen, und einem ſchwarzen Mittelpunkt.

11. *Teſtata*, der *muſchelbraune Spanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 331. no. 1262.

Seticornis; alis ſuperioribus fulveſcentibus; macula pallida ſtriga alba, lineolaque apicis alba. — *Maiuscula.*

12. *Citrata*, der *Zitronblätterſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 332. no. 1265.

*Citrata*, ſeticornis, alis griſeis macula ſubterminali albo-fulva ſtriaque alba, apicis lineola fuſca.

Habitat in Foliis *Citri*, quae noctu edebat Larva Geometra viridi-palleſcens. Magnitudo Ph. *Piniariae.*

13. *Liturata*, der *gelbgeſtrichte Spanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 334. no. 1273.

Seti-

Seticornis, alis ſubangulatis cineraſcentibus; litura poſtica flava, apice ſubtus dealbatis.

*Clerk* Phal. t. 6. f. 6. Ph. *Liturata.*

*Wien. Schmett.* p. 106. G.

No. 10. *Unbek. Raupe; hellgrauer gelbfleckigter Spanner*, Ph. *Liturata.*

14. *Lividata*, der *grüngelbe Spanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 337. no. 1285.

Seticornis; alis antice pallidis ſtriga fuſca, poſtice fuſcis ſtriga pallida.

*Clerk* Phal. t. 5. f. 10.

15. *Ferrugata*, der *kleine Roſtſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 338. no. 1292.

Seticornis; alis purpuraſcentibus; ſtrigis tribus albidis, poſtice cinereis, macula didyma fuſca.

*Fabric.* S. E. 637. no. 87. Ph. *Ferrugata.* Nom. *Linn.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. *Schuppenraupen.*

No. 11. *Vogelkrautſpannerraupe* (Alſines mediae); *Vogelkrautſpanner*, G. *Ferrugaria* (*Ferrugata* L.).

16. *Abſinthiata*, der *Wermuthſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 339. no. 1296.

Seticornis; alis obſcure cinereis puncto lituriſque tribus nigris marginalibus, punctoque ani albo.

*Clerk* Phal. t. 8. f. 9. Ph. *Abſinthiata.*

17. *Purpurata*, die *Purpurbinde.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. no. 1302.

Seticornis; alis ſuperioribus vireſcentibus; faſciis duabus *purpureis*; inferioribus luteis ſubtus litura purpuraſcente.

*Fabric.* S. E. p. 637. no. 91. Ph. *Purpurata.* Nom. *Linn.*

18. *Albo-punctata*, der *Weißpunkt.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſita*, p. 548. no. 2285. Pectinicornis ſpirilinguis; alis patentibus cinereis; faſciis duabus fuſcis. — Habitat in *Vmbroſis.*

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 150. no. 34. Nom. *Linn.*

19. *Rubroſtriata*, der *rothe Rückenſtreif.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſ.* p. 548. no. 2286. Seticornis, ſpirilinguis, alis patentibus canis, faſciis cinereis duabus tribusve punctoque nigro. Habitat in pratis arboribus conſitis.

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 152. no. 39. Nom. *Linn.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 32. t. 8. das dickere grüne *Spannräuplein mit dem rothen Rückenſtreif.*

20. *Graminea*, der *Grasſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſ.* p. 548. no. 2287. Seticornis, ſpirilinguis; alis patentibus flaveſcente-niveis, faſciisque linearibus nigris. Habitat in *Pratis* et in *Gramine.*

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 153. no. 49. Nom. *Linn.*

21. *Muſcaria*, der *Fliegenſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2289.

*Pha-*

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis incumbentibus griſeis, albo-fulvoque reticulato-maculatis.

Habitat in *Sambuco*.

Magnitudo *maioris muſcae*.

*Liſt. Goed.* p. 136. f. 55.

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 156. no. 61. *Phalene du Sureau.* Nom. *Linn.*

22. *Humulata*, der *Hopfenſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2291.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis depreſſis fuſcis, linea utrinque ferruginea, humeris gibbis, faſciculoque medii dorſi.

23. *Hortulana*, der *Gartenſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2292.

Seticornis, ſpirilinguis, alis deflexis pallide griſeis; faſcia ſaturatiore. Habitat in *hortis.*

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 159. no. 75. *Phalene de Jardin.* Nom. *Linn.*

24. *Arbuſtata*, der *Strauchſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2293.

Seticornis, ſpirilinguis; alis deflexis ſupra fuſcis, margine albam lineolam emittentibus.

Inter *Arbuſta.*

*Syſt. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 159. no. 76. Nom. *Linn.*

25. *Domeſtica*, der *Hausſpanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2294.

Seticornis, ſpirilinguis; *corniculis* duobus recurvis baſi criſtatis, alis plano incumbentibus.

In

In *Domibus*, frequens Vere.

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 159. no. 77. Nom. *Linn.*

*Réaum.* Inf. I. t. 18. f. 12-14.

*Schriften der Dronth. Gesellsch.* IV. p. 286. no. 47. Nom. *Linn.* Norv. *Forvaeld.*

26. *Sylvestris*, der *Waldspanner.*

*Linn.* Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2295.

Seticornis, spirilinguis, corniculis duobus subulatis recurvis, alis nigricantibus supra albo-maculatis. — In *Nemoribus.*

*Syst. Nat.* du Regn. Anim. II. p. 159. no. 78. *Phalene des bosquets.* Nom. *Linn.*

27. *Tetralunaria*, das *Fensterchen.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 506. no. 3.

Die innere Hälfte aller vier Flügel meist braun, mit einem durchsichtigen halben Rande, die äussere Hälfte weisslichgelb mit braunen Punkten; der äussere Rand ausgeschweift, und ausgezakt.

*Naturf.* XI. p. 64. no. 3. G. *Tetralunaria.*

1) In der Grösse der *Syringaria.*
2) Das *Männchen* merklich kleiner.
3) Der Vogel einer der seltensten und schönsten. *) (v. *Rottemb.*)

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 550. no. 8. Ph. *Tetralunaria*, das *Fensterchen.*

28. *Repandaria*, der *breite Saum.*

*Berl. Mag.* IV. p. 508. no. 6.

Die

*) Dessen *Abbildung* zu wünschen.

Die Flügel ausgeschwungen; das innere Feld pomeranzengelb mit einem braunen Queerstrich, das äussere Feld etwas ins Bläuliche fallend.

*Naturf.* XI. p. 65. no. 6. Ph. *Repandaria.* In der Grösse der Ph. *Vavaria* L. no. 219. (v. *Rottemburg.*)

29. *Fuliginaria*, die *Kellermotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 508. no. 7.

Dunkelerdfarbig, mit einigen hellgrünen Flecken.

— p. 621. C. Raupe soll *Moos* fressen.

*Naturf.* XI. p. 65. no. 7. Ph. *Fuliginaria.* Das *Weibchen* in der Grösse der *Vavaria*; das *Männchen* kleiner. (v. *Rottemb.*)

30. *Vrticaria*, die *Nesselmotte.* *)

*Berl. Magaz.* IV. p. 508. no. 8.

Weissgrau, braun bestäubt mit unterbrochenen ausgekappten braunen Queerstreifen.

— p. 621. D. die kleinere Art wahrscheinlich die *Männchen.*

*Naturf.* XI. p. 65. no. 8. Ph. *Vrticaria.* In der Grösse der *Atomaria* L. no. 214. Die *Raupe* zu Ende des Augusts auf dem *Rhamno.* (v. *Rottemb.*)

31. *Flammeolaria*, die *Flammenmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 510. no. 11.

Weiss-

*) Obgleich die Beschreibung des *Linné* von seiner *Vrticata* no. 272. einigermassen mit dieser übereinkömmt, so ist dennoch die Hufnagelsche eine ganz eigene Art, wie der Hr. von *Rottemburg* ebenfalls zu bestätigen scheint.

Weiſsgelb mit okergelben geflammten Zeichnungen, und einem ſchwarzen Punkt in der Mitte der Oberflügel.

*Naturf.* XI. p. 66. no. 11. Ph. *Flammeolaria.* Einer der *kleinſten* dieſer Klaſſe. (v. *Rottemb.*)

32. *Atomaria*, der *faule Eſel.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 510. no. 12.

Weiſsgrau, mit braunen Queerſtreifen, die Flügel mit wenigen Staubfedern beſetzt.

— p. 622. F. Die *Phaläne* bekömmt man ſelten zu ſehen, *theils* weil ſie wie Baumrinde ausſieht; *theils* weil ſie ſchon ſo zeitig im *April* auskömmt.

*Naturf.* XI. p. 66. no. 12. Ph. *Atomaria.* Nicht *Atomaria* L. no. 214. ob ſie gleich die Gröſse und den Bau derſelben hat. Der *Augenſchein* unterſcheidet beyde am deutlichſten. (v. *Rottemb.*)

*Kleem.* Beytr. I. p. 299. t. 35. f. 1. 2. 3. 4. *Raupe und Puppe.* Die groſse glatte, bald dunkelrothbraune, bald röthlichgraue, mit vielen zarten Linien überzogene, und mit etlichen Reihen ſchöner gelber Queerflecken auf dem Rücken gezierte, zehnfüſsige *Spannraupe.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 136.

*Glditſch* Forſtwiſſ. I. p. 390. no. 7. Ph. *Atomaria*, der *faule Eſel.*

33. *Lichenaria*, die *Moosmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 512. no. 15.

Der Grund hellgrau mit vielen, theils dunkelgrünen, theils braunen und grauen Punkten, Zeichnungen und Strichen.

*Naturf.* XI. p. 67. no. 15. Ph. *Lichenaria.* In der Gröſse der *Vavaria* L. Farben und Zeichnungen, auch die ganze Geſtalt der Raupe dem *Moos* ſo ähnlich, daſs man ſie, wenn ſie darauf ſitzt, kaum davon unterſcheiden kann. (v. *Rottemb.*)

*Knochs* Beyträge zur Inſektengeſchichte, I. St. p. 49. no. 10. t. 3. f. 5-9.

Ph. G. pectinicornis, alis griſeis populeo cupreoque adſperſis; anticis lineis duabus vndulatis nigris albo-diſtinctis, poſticis vna.

34. *Similaria*, der *Semmelvogel.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 512. no. 16.

Weiſslichgelb mit braunen Binden, und vielen dergleichen Punkten.

*Naturf.* XI. p. 67. no. 16. Ph. *Similaria.* Etwas gröſser als *Lichenaria;* aber ſchwer zu beſchreiben. (v. *Rottemb.*)

35. *Binaria*, der *Sperber.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 516. no. 21.

Okerbraun, mit zween ſchwarzen Punkten auf jedem Oberflügel, deren Spitzen ſichelförmig ſind; das Weibchen etwas heller.

*Naturf.* XI. p. 68. no. 21. Ph. *Binaria*, das *Weibchen* die Gröſse der *Falcataria*; das *Männchen* kaum halb ſo groſs. (v. *Rottemb.*)

36. *Sepiaria*, die *Zaunmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 516. no. 23.

Dunkel aſchgrau, mit zwo ſchmalen braunen Queerſtreifen.

— p. 624. *Raupe und Phaläne* häufig an alten breternen *bemooſten Zäunen.*

*Naturf.* XI. p. 69. no. 23. Ph. *Sepiaria.* Von den *kleinſten.* (v. *Rottemb.*)

37. *Faſciolaria*, die *Bandmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 516. no. 24.
Braun, mit gelblichen Binden; der äuſsre Rand gelblich.

*Naturf.* XI. p. 70. no. 24. Ph. *Faſciolaria.* Auch unter die *kleinſten.* Die *Raupe* auf *Tannen.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 752. no. 72. Ph. *Faſciolaria*, die *Bandmotte.*

38. *Arenaria*, die *Sandmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 518. no. 28.
Weiſsgrau, braun beſtäubt, mit geſchlungenen Queerſtreifen durch die Oberflügel.

39. *Quercinaria*, das *gelbe Blatt.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 520. no. 31.
Strohgelb, mit zwo braunen Streifen durch die Oberflügel; alle vier Flügel ausgeſchweift, und ausgezackt.

— p. 624. L. Viel ähnliches mit *Alniaria.*

*Naturf.* XI. p. 70. no. 31. Ph. *Quercinaria.* Auf beyden Seiten aller vier Flügel blaſsſchwefelgelb. — In der Gröſse der Ph. *Syringaria* — nicht das Männchen der Ph. *Alniaria.* (v. *Rottemb.*)

*Kleemanns* Beytr. I. p. 219. t. 26. a b. Der zur 3ten Kl. der N V. gehörige hellledergelbe *Spannenpapilion* mit zierlich aus- und eingeſchweiften, auch bräunlichgelb gezeichneten Flügeln.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 655. no. 40. Ph. *Quercinaria*, das *gelbe Blatt.*

40. *Ace-*

40. *Aceraria*, der *Widder*.

*Berlin. Magaz.* IV. p. 520. no. 33.
Ganz leberfarbig, mit kleinen gelblichen Flecken besäet.

— p. 624. M. Noch eine Art mit weisslichem Grunde mit verschiedenen, zum Theil unterbrochenen Queerstreifen. Vielleicht das *Weibchen*, wie die Fühlhörner anzuzeigen scheinen.

*Naturf.* XI. p. 71. no. 33. Ph. *Aceraria*. Das *Weibchen* hat eine *weiße* Grundfarbe. Das *Männchen* weit stärker mit braunen Punkten besäet. Die Grösse der *Vavaria*. (v. *Rottemb.*)

41. *Pruinata*, die *Reifmotte*.

*Berlin. Magaz.* IV. p. 520. no. 34.
Weisslichgrün, wie bestäubt, mit dunkelgrünen, und einer weissen ausgekappten Queerstreife.

— p. 625. N. Einige haben keine grüne Farbe, sondern fallen ganz ins Weissliche, oder ins Röthlichgraue.

*Naturf.* XI. p. 72. no. 34. Ph. *Pruinata*. Eigentlich *Pruinaria*. Die Grundfarbe aller vier Flügel weisslichgrün. In der Grösse der *Vavaria* und *Pectinicornis*. (v. *Rottemb.*)

42. *Pustulata*, die *Beule*.

*Berlin. Magaz.* IV. p. 520. no. 35.
Schön gelblich grün, mit einem gelblichgrauen Fleck an dem äussern Ende des innern Randes aller vier Flügel, dergleichen auch an dem Vorderrande des Unterflügels.

*Naturf.* XI. p. 72. no. 35. Ph. *Pustulata*.
Der gelblichgraue Fleck am Unterwinkel

 jedes

jedes Flügels (in angulo ani). In der Gröſse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 655. no. 41. Ph. *Puſtulata*, die *Beule.*

43. *Serrata*, die *Säge.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 522. no. 36.

Der Grund weiſslich, mit ſehr vielen hellbraunen ausgekappten Queerlinien.

*Naturf.* XI. p. 72. no. 36. Ph. *Serrata.*

In der Gröſse der *Puſtulata.* (v. *Rottemb.*)

44. *Siterata*, das *grüne Moos.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 522. no. 39.

Dunkelgrün mit Braun vermiſcht, und einer breiten braunen Binde.

*Naturf.* XI. p. 73. no. 39. Ph. *Siterata.*

In der Gröſse der *Fimbriata.* (v. *Rottemb.*)

45. *Concatenata*, die *Kette.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 522. no. 40.

Schmutziggelb mit verſchiedenen grauen, ausgekappten unterbrochenen Queerſtreifen.

46. *Fuſcata*, der *Sperling.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 524. no. 44.

Durchaus bräunlich grau.

*Naturf.* XI. p. 73. no. 44. Ph. *Fuſcata.*

Zu den kleinſten Arten. Nicht gröſser, als die *Viridulata.* (v. *Rottemb.*)

47. *Hortulata*, der *Fuchskopf.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 524. no. 45.

Weiſs,

Weifs, mit dunkelgrauen Flecken, der Rückenfchild und Kopf gelb.

48. *Albipunctata*, das *weiße Auge.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 526. no. 48.
Weifsgrau, mit 2 Reihen brauner Punkte, in der Mitte jedes Flügels ein kleiner weifser, braun geränderer Fleck.

*Naturf.* XI. p. 74. no. 48. Ph. *Albipunctata:* follte *Albipunctaria* heifsen, weil das *Männchen* haarige Fühlhörner hat. (v. *Rottemb.*)

*Gleditfch* Forftwiff. I. p. 557. no. 11. p. 656. no. 42. Ph. *Albipunctata*, das *weiße Auge.*

49. *Luridata*, der *Hornträger.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 526. no. 49.
Gelblichgrau mit kleinen braunen Strichen befäet, mit 2 roftfarbigen Queerftreifen durch die Oberflügel.

*Naturf.* XI. p. 75. no. 49. Ph. *Luridata.* In der Gröfse der Ph. *Plagiata.* (v. *Rottemb.*)

50. *Nigropunctata*, der *Tintenfleck.*

*Berl. Mag.* IV. p. 526. no. 50.
Weifsgrau, mit blafsgrauen Queerftreifen, und einem fchwarzen Punkt in jedem Flügel.

*Naturf.* XI. p. 75. no. 50. Ph. *Nigropunctata.* In der Gröfse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditfch* Forftwiff. II. p. 750. no. 60. Ph. *Nigropunctata*, der *Dintenfleck.*

51. *Bidentata*, der *Zweyzack.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 600. no. 51.
Gelblichbraun, am Rande ins Weifse fallend, mit

mit einem ſchwarzgrauen, breiten Queerſtreif, der in eine Spitze ausläuft.

*Naturf.* XI. p. 75. no. 51. Ph. *Bidentata.* In der Gröſse der *Vavaria. (v. Rottemb.)*

52. *Transverſata*, der *Einſiedler.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 600. no. 52.

Blaſsgelbbraun, mit vielen dunkel- und blaſsgrauen Queerſtreifen.

*Naturf.* XI. p. 76. no. 51. Ph. *Transverſata.* In der Gröſse der Ph. *Luteolata* ſ. *Crataegata. (v. Rottemb.)*

53. *Truncata*, der *Flüchtling.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 602. no. 56.

Der Grund an der Einlenkung der Flügel rothbraun, in der Mitte grauweiſs beſtäubt, am Ende roſtfarbig und grau, weiſs beſtäubt.

— p. 625. P. Die Farben ſehr abwechſelnd. Sehr ſchwer, ſie am Stamme des Baumes zu erkennen.

*Naturf.* XI. p. 78. no. 56. Ph. *Truncata.*

In der Gröſse der *Plagiata. (v. Rottemb.)*

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 36. Ph. *Truncata*, der *Flüchtling.*

54. *Dimidiata*, das *abgeſchnittene Band.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 602. no. 57.

Blaſsgelblichgrau, mit einigen ſchwarzen Punkten, und einem ſchwarzen Strich, ſo kaum bis an die Hälfte der Flügel reicht.

*Naturf.* XI. p. 78. no. 57. Ph. *Dimidiata.*

Zu den kleinſten; kaum die Gröſse der Ph. *Nymphaeata.*

55. *Cucu-*

55. *Cuculata*, das *Säumchen.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 602. no. 60.

Weiſs, an der Einlenkung der Oberflügel braun, an der Spitze eine braune Binde; die Unterflügel weiſsgrau.

*Naturf.* XI. p. 79. no. 60. Ph. *Cuculata.* In der Gröſse der *Clathrata.* (v. *Rottemb.*)

56. *Angulata*, die *Fichtenrinde.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 604. no. 61.

Grau, mit einer okerbraunen breiten Binde durch die Oberflügel, an der Einlenkung braun.

*Naturf.* XI. p. 79. no. 61. Ph. *Angulata.* Eigentlich *Angularia.* In der Gröſse der *Plagiata.* (v. *Rottemb.*)

57. *Flaveolata*, die *Kanarienmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 604. no. 63.

Ganz gelblichweiſs.

*Naturf.* XI. p. 80. no. 63. Ph. *Flaveolata.*

Schmalflüglich; in der Gröſse der *Vrticata.* (v. *Rottemb.*)

58. *Fimbriata*, der *weiſse Saum.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 604. no. 64.

Ganz grasgrün, mit einem weiſsen Rande, und weiſsen Queerſtreifen durch alle vier Flügel.

*Naturf.* XI. p. 80. no. 64. Ph. *Fimbriata.* Sollte *Fimbriaria* heiſsen, wegen der kammförmigen Fühlhörner. Iſt etwas gröſser als ihn *Röſel* abgebildet hat.

*Röſels* Inſektenbel. I. NV. 3. Kl. p. 46. t. 13. Das kleine, ſehr ſchlanke und braungeſchuppte *Spannenräuplein.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 97. (nicht Viridata *Linn.*)

*Wien. Schmett.* p. 97. B. *Schoßraupen. Weißstriemigte Spanner.*

No. 4. *Hasenöhrchenspannerraupe* (Bupleuri falcati); *Hasenöhrchenspanner*, G. *Bupleuraria.* (Fimbrialis *Scop.*)

*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 654. no. 37. Ph. *Fimbriata*, der *weiße Saum.*

*Scop.* Entom. carn. p. 216. no. 535. Ph. *Fimbrialis.* *Long.* lin. 6. *Lat.* 5.

Alae capparinae; *anticae* strigis *binis* albis; *posticae* vna: omnibus fimbria *albida*, *ferrugineo-punctata.* *)

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 51. no. 454. Ph. *strigata:* Seticornis (Femina), alis viridibus, *margine tessulato;* strigis *duabus* albis.

— Zool. Dan. Prodr. p. 129. no. 1486. Ph. *Strigata.*

59. *Emarginata*, die *krumme Linie.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 606. no. 67.

Dunkelgrau, weiss bestäubt, mit 2 ausgebogenen gelblichen Queerstreifen; der äussere Rand der Oberflügel ausgeschnitten.

*Naturf.* XI. p. 81. no. 67. Ph. *Emarginata.* Nicht die Ph. *Emarginata Linn.* Dieser in der Grösse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

60. *Muricata*, die *Purpurmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 606. no. 70.

Am äussern Rande oraniengelb, das übrige dunkel

*) Dies sind die vorzüglichsten Karaktere, um ihn nicht mit *Linn.* G. *viridata* no. 230. zu verwechseln.

dunkel purpurroth mit einigen oraniengelben Flecken.

*Berlin. Magaz.* IV. p. 625. Q. zu den *Kleiſt en* dieſer Klaſſe, aber ſchön gezeichnet, und ſelten.

*Naturf.* XI. p. 81. no. 70. Ph. *Muricata.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 748. no. 53. Ph. *Muricata*, die *Purpurmotte.*

61. *Rectangulata*, der *rechte Winkel.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 606. no. 71.

Blaſsgrün; die Oberflügel mit einigen dunkelgrauen Queerſtreifen, ſo weiſs gerandet; die Unterflügel hell aſchgrau.

*Naturf.* XI. p. 82. no. 71. Ph. *Rectangulata.* Nicht die *Rectangulata Linn.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 750. no. 59. Ph. *Rectangula*, der *rechte Winkel.*

Die Flügel grün und braunbandig; unten eine rechtwinklichte Zeichnung.

62. *Halterata*, der *Doppelflügel.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 608. no. 72.

Weiſs mit Aſchgrau beſtäubt; die Unterflügel ganz weiſs.

— p. 626. R. An der Einlenkung der Unterflügel eine Art eines doppelten Flügels.

*Naturf.* XI. p. 82. no. 72. Ph. *Halterata.* Die mit vier Unterflügeln die *Männchen;* die andern, denen ſie fehlen, die *Weibchen.* (v. *Rottemb.*)

*Kleem.* Beytr. I. p. 169. t. 19. f. a. b. Der zur 4ten Kl. der N. V. gehörige, und mit 6, als 2 hellgrauen, ſchwarz gezeichneten groſsen *Vorder*- und 4 weiſsgrauen kleinern *Hinterflügeln* gezierte *Papilion.*

*Wien.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. *Scheineulenraupen. Wellenstriemigte Spanner.*

No. 10. *Bergbuchenspannerraupe* (Fagi Sylvaticae). *Bergbuchenspanner*, G. *Hexapterata.*

*Degeer* Inſ. Tom. II. P. I. p. 459. t. 9. f. 8. no. 9. *Phalene à ſix ailes.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues d'un gris blancheatre à trois bandes ondées jaunâtres & un point noir, dont le *mâle* a une *troiſieme paire de très-petites ailes.*

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 338. no. 9. t. 9. f. 8. Die *ſechsflüglichte Phaläne.*

Die Phaläne mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und breiten grauweiſslichten Flügeln, mit drey gelblichen gewäſſerten Binden, und ſchwarzem Punkt, davon das Männchen noch ein *drittes Paar ganz kleine Flügel* hat.

63. *Bicolorata*, der *Mittelpunkt.*

*Berl. Mag.* IV. p. 608. no. 73.

Schneeweiſs; die Oberflügel an der Einlenkung gelbbraun, dergleichen Fleck in der Mitte mit einem ſchwarzen Punkt, am äuſsern Rande ſchwarzgrau.

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 557. no. 12. Ph. *Bicolorata*, der *Mittelpunkt.*

64. *Virgata*, die *Stengelmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 608. no. 74.

Weiſsgrau, mit einer breiten braunen, weiſseingefaſsten Binde durch die Oberflügel, in welchen ein ſchwarzer Punkt.

*Naturf.* XI. p. 83. no. 74. Ph. *Virgata.* In der Gröſse der G. *Succenturiata* L. (v. *Rottemb.*)

65. *Obli-*

65. *Obliterata*, der *Perpendikel.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 608. no. 75.

An der Einlenkung gelblichgrau, gegen den äuſsern Rand braun, das Weibchen mehr gelbgrau.

— p. 626. S. Sie legen, wenn ſie auf den Blättern ſitzen, die Flügel ſo oben zuſammen, wie die Tagvögel.

*Naturf.* XI. p. 83. no. 75. Ph. *Obliterata.*

Das *Weibchen* auf der Oberſeite aller 4 Flügel weiſslich und braun beſtäubt; das *Männchen* aber graubraun. (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 35. Ph. *Obliterata*, der *Perpendikel.*

66. *Curvata*, der *Krummſtrich.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 608. no. 76.

Dunkelgrau, mit einer weiſsgrauen breiten Binde.

67. *Rubiginata*, der *Eiſenroſt.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 610. no. 77.

Roſtfarbig mit 3 dunklern ausgeſchwungenen Queerſtreifen.

*Naturf.* XI. p. 83. no. 77. Ph. *Rubiginata.* Eine der kleinſten, gleicht in der Gröſse und Grundfarbe der Ph. *Fuſcata*, unterſcheidet ſich aber durch die 3 Queerlinien. (v. *Rottemb.*)

68. *Farinata*, die *Kornmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 610. no. 78.

Weiſslichgrau, fein beſtäubt, welches ihr ein bläuliches Anſehen giebt.

*Naturf.* XI. p. 84. no. 78. Ph. *Farinata.* Die

*Ober-*

*Oberflügel* aufserordentlich fein grau beſtäubt, daher *perlfarbig*. Die *Unterflügel* ſchneeweiſs. In der Gröſse der *Plagiata.* (v. *Rottemb.*)

69. *Dilatata*, die *Furche.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 610. no. 81.

Weiſsgrau mit einigen braunen Queerſtreifen und Binden.

*Naturf.* XI. p. 84. no. 81. Ph. *Dilatata.* In der Gröſse der Ph. *Halterata.* (v. *Rottemb.*)

70. *Deſignata*, die *braune Binde.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 612. no. 83.

Aſchgrau, mit einer breiten braunen Binde durch die Oberflügel, welche 2 Spitzen haben.

*Naturf.* XI. p. 85. no. 83. Ph. *Deſignata.* (v. *Rottemb.*)

71. *Igneata*, die *Brandmotte.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 612. no. 84.

Aſchgrau, mit einer brandgelben Queerbinde durch alle 4 Flügel.

*Naturf.* XI. p. 85. no. 84. Ph. *Igneata.* In der Gröſse der *Averſata.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 749. no. 58. Ph. *Igneata*, die *Brandmotte.*

72. *Serpentata*, die *Welle.*

*Berlin. Magaz.* IV. p. 612. no. 86.

Röthlichgelb, mit vielen geſchlängelten dunklen Queerlinien.

*Naturf.* XI. p. 86. no. 86. Ph. *Serpentata.* Die Grundfarbe des *Weibchens* okerbraun; des *Männ-*

*Männchens* rothbraun. In der Gröſse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)

73. *Spadiceata*, der *Bräunling.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 612. no. 87.
Gelblichgrau mit 2 rothen Queerbinden; die Unterflügel dunkelgrün.

74. *Humiliata*, das *rothe Säumchen.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 614. no. 89.
Schmuziggelb, mit blaſsgrauen ausgeſchwungenen Queerſtreifen; der andere Rand röthlich.

75. *Contaminata*, das *Tiſchtuch.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 614. no. 91.
Schneeweiſs, an der Einlenkung okerbraun; dergleichen Fleck an dem Vorderrande der Oberflügel; der äuſsere Rand grau.

*Naturf.* XI. p. 86. no. 91. Ph. *Contaminata.* In der Gröſse der *Remutata.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 749. no. 55. Ph. *Contaminata*, das *Tiſchtuch.*

76. *Graminata*, die *Erdmotte.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 614. no. 92.
Gelblichgrau, mit weiſslichen ausgeſchwungenen Queerſtreifen.

*Naturf.* XI. p. 86. no. 92. Ph. *Graminata.* In der Gröſse der *Halterata.* (v. *Rottemb.*)

77. *Zonata*, das *braune Band.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 616. no. 93.
Aſchgrau, mit einer gelb eingefaſsten Binde in den Oberflügeln, in welcher Mitten ein ſchwarzer Fleck.

78. *Corculata*, das *schwarze C.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 616. no. 94.

Röthlichbraun, an dem äussern Rande ein schwarzes C, an der Einlenkung gelblichgrau.

*Naturf.* XI. p. 87. no. 94. Ph. *Corculata.* In der Grösse der *Notata.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 794. no. 57. Ph. *Corculata*, das *schwarze C.*

79. *Innotata*, die *Beyfußmotte.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 616. no. 95.

Dunkelgrau, mit einem schwarzen Punkt in der Mitte der Oberflügel, die Flügel ziemlich lang.

*Naturf.* XI. p. 87. no. 95. Ph. *Innotata.* In der Grösse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)

*Knochs* Beyträge zur Insektengesch. I St. p. 22. t. 1. f. 7. *Larva.* f. 8. *Phaläna.*

80. *Albulata*, der *Weißling.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 616. no. 96.

Weissgrau mit dunklern Queerstreifen, in der Mitte eines jeden Flügels ein schwarzer Punkt.

*Naturf.* XI. p. 88. no. 96. Ph. *Albulata.* Nächst der *Lemnata* die kleinste. (v. *Rottemb.*)

81. *Coronata*, die *Krone.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 616. no. 97.

Weissgelb mit olivenfarbenen in einander gezogenen Zeichnungen.

*Naturf.* XI. p. 88. no. 97. Ph. *Coronata.* Die grösste Aehnlichkeit mit den Ph. *Aquaticis.* In der Grösse zwischen *Potamogata* und *Nymphäata.* (v. *Rottemb.*)

82. *Pal-*

82. *Pallidata*, das *braune Säumchen.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 617. no. 98.
Glänzend, blaſsgelb mit einigen feinen braunen Strichen, der äuſsere Rand braun.

*Naturf.* XI. p. 88. no. 98. Ph. *Pallidata.* In der Gröſse der *Halterata.* (v. *Rottemb.*)

83. *Tridentata*, das *breite Band.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 618. no. 100.
Weiſs, an der Einlenkung braun, mit einer breiten braunen Binde durch die Oberflügel.

*Naturf.* XI. p. 89. no. 100. Ph. *Tridentata.* In der Gröſse der *Remutata.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. II. p. 749. no. 56. Ph. *Tridentata*, das *breite Band.*

84. *Biſelata*, die *Bürſtenmotte.*

*Berlin. Mag.* IV. p. 618. no. 101.
Schmuziggelb, gegen den äuſsern Rand bräunlich grau, mit einem Punkt in der Mitte jedes Flügels.

— p. 626. T. Einige am Ende der beyden Hinterfüſse einen Haufen kleiner Federchen, wie ein Pinſel.

*Naturf.* XI. p. 89. no. 101. Ph. *Biſelata.* In der Gröſse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)

*Gleditſch* Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 38. Ph. *Biſelata*, die *Bürſtenmotte.*

85. *Margine punctata*, die *doppelte Punktreihe.*

*Röſels* Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 41. t. 11.
Die geſchmeidige, mit verſchiedenen Schuppenflecken und Punkten gezierte Spannenraupe. Alis repandis cervinis atomariis, margine flaveſcente. *duplici ſerie punctorum nigrorum.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 95.

86. *Umbrata*, der *Nachtſchatten.*

*Röſels* Inſektenbel. III. p. 21. t. 4.

Die geſchmeidige braune Spannenraupe, mit weiſsen Rücken- und Seitenflecken.

Nigricans, alis cinereis, nigro-punctatis venoſisque.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 33.

87. *Clypeata*, die *Schildmotte.*

*Kleemanns* Beytr. I. p. 225. t. 26. f. 1-6.

Alis umbroſis nigricantibus, margine *clypeis cinereis.*

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 25. no. 57.

Die zur N. V. 3 Kl. gehörige, mit 10 Füſsen verſehene glatte, röthlich braungelb gefleckte, und ſchwarz getüpfelte Spannenraupe.

88. *Sericata*, die *Seidenmotte.*

*Kleem.* Beytr. I. p. 231. 232. t. 27. f. A.

Der zur dritten Kl. der N. V. gehörige, als Seide glänzende, und mit verſchiedenen Kappenzügen gezierte, und gemaſerte bräunlich graue Spannenpapilion. (coll. t. 14. f. 1. 2. t. 28. f. 1. 2.)

Magna. Alis nigro-fuſcis, venis, lineis undulatis, atomisque innumeris nigris.

89. *Rubro-ſtriata*, die *Rothader.*

*Kleemanns* Beytr. I. p. 301. t. 35. f. A B C D.

Die einſame, glatte, dunkelbräunlich graue zartgeſtreifte, zehnfüſsige Spannenraupe, mit zween höckrigen Abſätzen.

Alis *anticis* nigricantibus, *rubro-venosis*, *posticis* flaveolatis, nigro-punctatis striatisque.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 27. no. 61.

90. *Glauco-fasciata*, der *Blaustrich*.

*Kleemanns* Beytr. I. p. 377. t. 40. f. 1-5.

Die halbspannende grasgrüne gelbgestreifte Raupe mit ungleichen Bauchfüssen des Nachtvogels 2ter Klasse.

Alis aurantiacis, nigro-striatis maculatisque; *anticis* fascia transversa glauca.

*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 136.

*Degeer* Inf. I. p. 377. t. 21. f. 10. 11.

Chenille *arpenteuse* verte, à seize jambes, dont les huit intermédiaires membraneuses sont très-inégales entre elles en grandeur.

— *Uebers.* I. 2 Qu. p. 119. t. 21. f. 10. 11.

Die grüne sechzehnfüssige *Spannraupe* mit acht stumpfen Mittelfüssen von ungleicher Grösse.

91. *Quadrifaria*, das *Schildvögelein*.

*Sulzers* Gesch. p. 162. t. 23. f. 4.

Braun, auf jedem Flügel mit einem grossen gelben Fleck, auf beyden Seiten gleich.

92. *Rubro-ciliata*, das *rothe Fränzchen*.

*Naturf.* III. p. 7. t. 1. f. 3. no. a. (D. *Kühn.*)

Alis stramineis rubro-fasciatis.

*Füessl.* Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 3.

*Schäff.* Icon. t. 22. f. 5. (verstäubt).

93. *Trifasciata*, die *Dreybinde*.

*Naturf.* III. p. 7. t. 1. f. 4. no. b. (*Kühn*).

Alis flaveolatis griseo-atomatis; *tribus fasciis* transversis rubescentibus.

*Füessl.* Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 4.

94. *Quadripunctata*, der *Vierpunkt.*

*Naturf.* III. p. 7. t. 1. f. 5. no. c. (*Kühn*).

Alis pallide-flavis, oblique fusco-striatis, *punctis quatuor fuscis.*

*Füessl.* Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 5.

95. *Annulata*, der *Ringelspanner.*

*Naturf.* VI. p. 92. t. 4. f. 2. (D. *Schulz*).

Paleacea, striis 2 et fascia nigra undulata cum *annulo nigro* in cunctis alis. In *Germaniae Dumetis.*

96. *Centumnotata*, der *Hundertspanner.*

*Naturf.* VI. p. 93. t. 4. f. 5. (D. *Schulz*).

Albo-nigroque nebulosa, fascia lata, in medio angustiore cervina, ad apicem alarum.

*Fabric.* Mantiss. p. 290. no. 83. 84. Ph. *Centumnotata.*

Seticornis; alis ferrugineo-fuscoque variis, fascia media grisea *C atro notata.*

97. *Vestalis*, der *weiße Schleyer.*

*Naturf.* XIII. p. 30. no. 4. t. 3. f. 7. a b. (*Walch*).

G. *antrorsum* alis *superioribus* albis margine lato cinereo, lineis serratis nigris et fuscis ornato; *inferioribus* itidem albis et ad marginem maculis nebulosis, *retrorsum* alis omnibus unicoloribus dilute cinereis, fascia obscuriore et in medio nigro puncto notatis.

98. *Tigris*, der *kleine Tiger.*

*Naturf.*

*Naturf.* XIII. p. 31. no. 5. t. 3. fig. 8. a b. (*Walch*).
*Antrorſum* alae *ſuperiores* albae maculis et punctis nigris; *inferiores* albae punctis tantum nigris ſubtiliſſimis adſperſae; *retrorſum* alae omnes dilute flavae punctis nigris rarioribus.

99. *Frumentata*, der *Getreideſpanner.*

*Naturf.* XV. p. 112. t. 3. f. a b c. (D. *Meyer.*)
Seticornis, alis rotundatis, *ſuperioribus* albidis, cinereo-faſciato-maculatis, macula vireſcente rhombea; *inferioribus* ſubangulatis fulvis, baſi et margine interiori nigreſcentibus.

Ad *Pragam Bohemiae.*

*Larva* primo vere victitat graminibus, *frumentis infeſta.*

100. *Pectinataria*, das *gekämmte Fühlhorn.*

*Knochs* Beytr. zur Inſektengeſch. I. p. 55. t. 3. f. 10.
Alis viridibus; faſciis duabus crenatis lineolaque albeſcente ſubterminali undulata.

101. *Funebris*, der *Trauerſpanner.*

Der *Königl. Norwegiſchen Geſellſch. Schr.* IV. p. 285. t. 16. f. 17.
Seticornis, *alis atris*, maculis albis; *ſuperioribus* tribus, *inferioribus* duabus.

102. *Fulvulata*, der *Sibiriſche Birkenſpanner.*

*Pallas* Reiſ. Ausz. II. no. 95.
Magnitudo paulo ſupra Crataegatam; corpus nigrum valde hirſutum. Alae *ſuperiores* ſupra fuſco-fuliginoſae; *ſecundariae* luteo-fulveſcentes.

In *Betulis Sibiriae.*

*Müllers* Suppl. B. p. 313. t. 236. e. Ph. *Fulvulata*, der *Birkenvogel.* *)

103. *Prasinaria*, der *Lerchbaumspanner.* **)
*Wien. Schmett.* p. 96. A. no. 3.

104. *Cythisaria*, der *Geißkleespanner.*
*Wien. Schmett.* p. 97. B. no. 2.

105. *Bajularia*, der *Eichenspanner.*
*Wien. Schmett.* p. 97. B. no. 6.
Die *Raupe* immer mit Blütschuppen und andern dergleichen Dingen beladen; daher könnte man sie auch den *Lastträger* nennen.
*Geoffr.* Inf. II. p. 126. no. 33.

*Pha-*

*) Ich könnte hier aus *Gladbachs* Schmetterl. noch einige anführen: allein Beschreibungen und Abbildungen sind so unvollkommen, daſs der Kenner keine Befriedigung findet. Daher will ich sie nur nachweisen.

1) p. 19. t. 9. f. 3. 4. der *kleine rare weiſse Blausieb.*
2) p. 20. — f. 5. 6. der *weiſse Ochs.*
3) p. 23. t. 11. f. 1. 2. die *kleine Diana.*
4) p. 24. t. 12. f. 1. 2. das *kleine Steindeckerchen.*
5) p. 26. — f. 5. 6. das *Manchettenvögelchen.*
6) p. 33. t. 14. f. 1-8. t. 15. f. 1-4. die *Halbtrauer.*
7) p. 36. t. 16. f. 6. 7. das *rare Rosevögelchen.*
8) p. 38. t. 18. f. 1. 2. das *Pulvervögelchen.*
9) p. 43. t. 20. f. 1. 2. der *gelbe Vter.*
10) p. 47. t. 21. f. 1-7. das *Kayservögelchen mit seiner Raupe, Gespinnst und Puppe.*
11) p. 55. t. 24. f. 7. 8. der *Halbkartun.*
12) p. 63. t. 27. f. 3-6. das *Hirschbärtchen.*
13) p. 67. t. 29. f. 6. 7. das *kleine Perlhühnchen.*

**) Da das Wiener Werk in den Händen aller Entomologen ist, so habe ich mich hier der Kürze befleiſsigen wollen.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis viridibus, limbo maculaque anguli ani cinereo-fuſcis.
*La Phalene-verdelet.*
*Long.* 6 lign.

106. *Viridata*, der *Brombeerſpanner.*

Wien. *Schmett.* p. 97. B. no. 7.
*Réaum.* Inſ. Tom. II. Mém. 9. p. 149. *Arpenteuſe de la Ronce.*
*Albin* Inſ. t. 48. f. 80. die *Raupe* auf *Haſelnußblättern.*

107. *Prodromaria*, der *Lindenſpanner.*

Wien. *Schmett.* p. 99. C. no. 1.
*Geoffr.* Inſ. II. p. 118. no. 22.
*Phalaena* pectinicornis elinguis albida, nigropunctata, alis deflexis; *ſuperioribus* faſcia duplici fuſca dentata nigro-terminata.
*La Primtaniere.*
*Long.* 11 lign.

108. *Hiſpidaria*, *dunkelgrauer gelbhörnigter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 99. C. no. 4.

109. *Zonaria*, *Garbenſpanner.* *)

Wien. *Schmett.* p. 100. C. no. 5.
Chenille arpenteuſe de la Jacée. *Réaum.*

110. *Piloſaria*, der *Birnſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 100. C. no. 6.



*) No. 108. 109. *Weibchen flügellos.*

111. *Horridaria, schwarzbrauner, schwarzgestrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 100. C. no. 7.

112. *Lichenaria, Baumflechtenspanner.* *)

*Wien. Schmett.* p. 100 C. no. 8.

113. *Corticaria, Cerreichenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 100. C. no. 9.

114. *Cineraria, Staubmoosspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 100. C. no. 10.

115. *Roboraria, Steineichenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 1.

116. *Abietaria, Edeltannenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 3.

117. *Rhomboïdaria, Gutheinrichspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 4.

118. *Secundaria, Weisstannenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 5.

119. *Cinctaria, grauneblichter ringleibiger Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 6.

120. *Crepuscularia, Agleyspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 8.

121. *Vi-*

*) Ob dies unsere Lichenaria no. 33. sey, kann ich nicht mit Gewissheit sagen.

121. *Viduaria*, (p. 315.) *weißer*, *ſchwarzgeſtrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 9.

122. *Aerugaria*, *Weichſelſpanner.* *)

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 10.

123. *Leucophaearia*, *Kahneichenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 101. D. no. 11.

124. *Aeſcularia*, *Roßkaſtanienſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 102. D. no. 12.

125. *Aceraria*, *Ahornſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 102. D. no. 13.

126. *Lineolata*, *blaßgrauer*, *feingeſtrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 1.

127. *Arteſiaria*, *ſchiefergraulicher*, *mattgeſtrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 2.

128. *Coarctaria*, *hellgrauer engſtreifigter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 3.

129. *Arenacearia*, *Kronwickenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 5.

130. *Obliquaria*, *Silbergrauer*, *ſchregbraunſtreifigter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 6.



*) No. 121 - 124. *Weibchen flügellos.* Heiſst p. 315. nun *Bajaria.*

131. *Aureolaria*, *Heckenwickenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 8.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 128. no. 138.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis patentibus flavis, lineis ſuperne tribus, inferne duabus transverſis fuſcis.

*La double ceinture.*

*Long.* 3½ lign.

132. *Gilvaria*, *Tauſendblattſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 102. E. no. 10.

133. *Angularia*, *Sandlindenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 103. F. no. 3.

*Geoffr.* Inſ. II. p. 127. no. 36.

*Phalaena* pectinicornis elinguis, alis patentibus angulatis, fuſco-luteis, faſcia duplici transverſa obſcuriore.

La *Zone.*

*Long.* 8 lign.

134. *Eroſaria*, *Hageichenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 103. F. no. 4.

135. *Evonymaria*, *Spindelbaumſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 103. F. no. 5.

136. *Pectinaria*, *Tannenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 103. F. no. 6.

137. *Lunaria*, der *Holzbirnſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 103. F. no. 7.

— p. 276. §. 12. t. I. a. fig. 4.

Pectinicornis alis eroſis, flaveſcenti-rufoque variis, biſtriatis, ſuperioribus macula ad angulum externum *ſublunari.*

*Fabric.*

*Fabric.* S. E. p. 623. no. 14. Ph. *Lunaria.*
Pectinicornis; alis angulato-dentatis, basi rufis, *lunula* alba, apice cinereis.
*Sepp* Nederl. Inf. VI. p. 9. t. 2. De *Vlinder* het *Herculesje.*

138. *Flavicaria*, *zart ledergelber randmaklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 104. F. no. 12.

139. *Apiciaria*, *oranienfarbiger spitzrandstreifiger Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 104. F. no. 14.

140. *Parallelaria*, *oranienfarbiger, breitrandstreifiger Spanner. Unbekannte Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 104. F. no. 15.

141. *Capreolaria*, der *Fichtenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 105. G. no. 2.

142. *Rubicapraria*, *gänsefarbiger*, *mattstreifiger Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 105. G. no. 3.

143. *Murinaria*, *mäusefarbiger*, *hellgraustreifiger Spanner.*

*Wien. Schmett.* p. 105. G. no. 4.

144. *Glarearia*, *Gelbwickenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 106. G. no. 6.

145. *Conspersaria*, *weisslichter*, *braunsprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* p. 106. G. no. 8.

146. *Plumaria, Schottenkleeſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 106. G. no. 9.

147. *Alternata, weiſsgraulicher, gelbgerandeter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 106. G. no. 11.

148. *Punctulata, grauweiſslicher, ſchwarzſprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 106. G. no. 13.

149. *Omicronaria, Maſſernſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 107. H. no. 3.

Chenille arpenteuſe d' érable. *Réaumur.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 144. no. 71.

*Phalaena* ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, ſingulis faſcia undulata ſerrata, et *Omicro* albis.

Les *quatre Omicrons.* *Long.* 4. lign.

150. *Decuſſata, graulichtweiſser, braunſchwarzgegitterter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 107. H. no. 7.

151. *Furvata, Mehlbaumſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 108. I. no. 1.

152. *Pullata, grauſprenklichter, ſchwartzſchattichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 108. I. no. 2.

153. *Obſcurata, Bocksbeerſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 108. I. no. 3.

154. *Ob-*

154. *Obfuſcata*, *Ellerbaumſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 108. I. no. 4.

155. *Carbonaria*, *Knotenmoosſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 108. I. no. 5.

156. *Vetulata*, *mattbrauner*, *rothſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 1.

157. *Rhamnata*, *Kreuzdornſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 2.

158. *Dilutata*, *Heckeichenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 4.

159. *Impluviata*, *Gartenbirnſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 5.

160. *Rupeſtrata*, *fahlweißer*, *blaßbraunſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 6.

161. *Sylvata*, *Rothtannenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 7.

162. *Polycommata*, *rindefarbiger*, *ſchwartzſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 8.

163. *Salicata*, *Bandweidenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 11.

164. *Albulata, lilienweißer, gelblichtſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 12.

165. *Rivulata, brauner, weißſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 13.

166. *Terſata, hellbrauner, mattſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 14.

167. *Vitalbata, Linenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 109. K. no. 15.

168. *Luteata, hellederfarbiger, jonkillengelbſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 18.

169. *Rubricata, röthelſteinfarbiger, dunkelſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 19.

170. *Pallidata, weißlichter, braungelbſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 21.

171. *Oſſeata, beinfarbiger, bräunlichſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 22.

172. *Candidata, Rothbuchenſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 23.

173. *Subumbrata*, *hellgrauer*, *dunkelgeränderter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 25.

174. *Pusillata*, *Wacholderspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 26.

175. *Minutata*, *Wermuthspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 27.

176. *Variata*, *Pechtannenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 110. K. no. 28.

177. *Badiata*, *Heckerosenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 111. L. no. 3.

178. *Caesiata*, *blaugrauer*, *dunkelstriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 112. L. no. 6.

179. *Olivata*, *Eschenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 112. L. no. 7.

180. *Psittacata*, *Graslindenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 112. L. no. 8.

181. *Fulvata*, *hochgelber*, *oranienstreifichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 112. M. no. 4.
*Forsteri* nov. Spec. Inf. p. 76. no. 76. Ph. *Fulvata.*
Seticornis, alis rotundatis, anticis fulvis, fascia ad basin, aliaque in medio undato repanda, ferrugineo-rufa.
In Angliae *Crataego oxyacantha.*

182. *Ligu-*

182. *Liguſtrata, Hartriegelſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 112. M. no. 5.

183. *Propugnata, graubräunlichter, ſchwarzbräunſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 112. M. no. 7.

184. *Linariata, Leinkrautſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 9.

185. *Spadicearia, okerbräunlicher, rothſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 12.

186. *Montanata, milchweißer, fahlbraunſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 14.

187. *Ruſticata, ſchmuzigweißer, ſchwarzbraunſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 15.

188. *Tophaceata, gelbweißer, grauſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 16.

189. *Ruſſata, zimmetbrauner, ſchwarzſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 18.

190. *Silaceata, dottergelber, ſchwarzgrauſtreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 20.

191. *Rubicata*, *dunkelrother*, *schwarzstreifichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 22.

192. *Berberata*, *Sauerdornspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 23.

193. *Derivata*, *taubenhalsfarbiger*, *braungestrichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 113. M. no. 24.

194. *Procellata*, *weißer*, *bandschwarzstreifichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N. no. 1.

195. *Reticulata*, *schwarzfleckichter*, *weißaderichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N. no. 3.

196. *Vetustata*, *flachsfarbiger*, *schwarzbraunfleckichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N. no. 4.

197. *Rubiginata*, *schneeweißer*, *rostgelbfleckichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N. no. 5.

198. *Sinuata*, *mattweißer*, *graubraunfleckichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N. no. 6.

199. *Centaureata*, *Flockenblumenspanner.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N. no. 7.

200. *Aduſtata, Spillbaumſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 114. N. no. 9.

201. *Alpinata, ſammetſchwarzer, oranienfleckichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 115. N. no. 14.

202. *Griſeata, lichtgrauer Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 116. O. no. 2.

203. *Illibata, weißer, wellenrandflüglichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 116. O. no. 5.

204. *Taminata, weißer, auſſenrandſprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 116. O. no. 6.

205. *Heparata, leberbrauner, ſaumſprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 116. O. no. 8.

206. *Euphorbiata, Wolfsmilchſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 116. O. no. 9.

207. *Pyraliata, Wollſtrohſpanner.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P. no. 1.

208. *Virgulata, weiſsgrauer, geradeſchattigter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P. no. 8.

209. *Moniliata, milchrahmfarbiger, perlrandichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P. no. 9.

210. *Fim-*

210. *Fimbriata, gelblichtweisser, braungerandeter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P. no. 11.

211. *Scurulata, helfenbeinfarbiger, rundmaklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P. no. 12.

212. *Decorata, weisser, blaurandmaklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P. no. 13.

213. *Aeruginaria, blaßgraugrüner Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 314. no. 10.

214. *Serotinaria, gelbweisslichter, grausprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 315. no. 14.

215. *Honoraria, trübgelbrother, doppeltstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 315. no. 18.

216. *Diversata, braunrother und oraniengelber Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien Schmett. Nachtr.* p. 315. no. 14.

217. *Dilucidaria, hellsilbergrauer, schwarzgrauschattichter Spanner. Unbekannte Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 315. no. 6.

218. *Angustata, schiefergrauer, weiss- und düsterstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 315. no. 30.

219. *Scripturaria*, *mattweiſser*, *ſchwarzſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 316. no. 31.

220. *Inundaria*, *braungrauer*, *weiſs- und ſchwarzſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 316. no. 32.

221. *Suffumata*, *grauweiſslichter*, *rauhſchwarzſtreiſichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 316. no. 27.

222. *Luctuata*, *ſchwarz und weiſswechſelnder Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 316. no. 28.

223. *Blandiata*, *milchweiſser*, *ſchwarzgrauſtreiſichter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 316. no. 15.

224. *Conſpicuata*, *hochgelber*, *ſchwarzgerandeter Spanner. Unbek. Raupe.*

*Wien. Schmett. Nachtr.* p. 316. no. 16.

225. *Nebulata*, der *Nebelſpanner.*

*Scop.* Entomol. carn. p. 215. no. 532.

Alae ſupra albido - cervinoque nebuloſae, ſubtus pallidiores; poſticae ſubangulatae.

*Long.* lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{4}$.

226. *Retialis*, der *Netzſpanner.*

*Scop.* Entomol. carn. p. 217. no. 536.

Alae albae, venis faſciisque 4 murinis *reticulatae.*

*Long.* lin. 6. *Lat.* 4.

227. *Pun-*

227. *Punctinalis* der *Punktspanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 217. no. 537.

Alae albae; serie transversa *punctorum* fuscorum, fascia obsoleta submarginali atomisque fuscis.

In *arboribus pomiferis.*

*Long.* lin. $10\frac{1}{2}$. *Lat.* 6.

228. *Fenestrella*, der *Fensterspanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 217. no. 538.

Alae fuscescentes, erectae, dentatae, punctis rufis albisque.

*Long.* lin. $3\frac{1}{2}$. *Lat.* 2.

*Floribus* involat.

229. *Niveata*, der *Schneespanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 217. no. 539.

Alba tota et immaculata.

*Long.* lin. 7. *Lat.* $4\frac{1}{4}$.

In *Pratis.*

*Wien. Schmett.* p. 116. O. *Spreckenraupen, einfärbige Spanner.*

No. 4. *Unbek. Raupe. Weisser, plattrandflüglichter Spanner*, G. *Nivearia.*

230. *Lineata*, der *randlinichte Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 218. no. 540.

Alba tota; *linea marginali* venisque subtus fuscis.

*Long.* lin. 10. *Lat.* 6.

In *Pomariis.*

231. *Exanthemata*, der *rostpunktirte Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 218. no. 542.

Alba; ſtrigis obſoletiſſimis *punctatisque* copioſis *ferrugineis*, utrinque variegatas alas gerens.

*Long.* lin. 5½. *Lat.* 3½.

In *Salicetis.*

*Wien. Schmett.* p. 107. H. *Strichraupen; wechſelnde Spanner.*

No. 5. *Unbek. Raupe. Weiſser, braungelblichtgeſtrichter Spanner.*

232. *Punctata*, der *ſchwarze Mittelpunkt.*

*Scop.* Entom. carn. p. 218. no. 543.

Alba; alis omnibus utrinque puncto nigro medio; *anticis* punctis 7 nigris marginem externum utrinque occupantibus.

*Long.* lin. 5½. *Lat.* 3¾.

In *collibus herbidis.*

233. *Ornata*, der *geſchmückte Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 219. no. 545.

Alba; alis omnibus ſupra faſciis binis limbi: antica undata.

*Long.* lin. 6. *Lat.* 3½.

In Pratis *Carnioliae.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P. *Fadenraupen. Bogenſtriemichte Spanner.*

No. 14. *Unbek. Raupe. Schneeweiſser, bräunlichtrandfleckichter Spanner*, G. *Ornata.*

234. *Glaucata*, der *blaurandigte Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 220. no. 549.

Alba; alis *anticis* faſcia media ſubeluta fuſceſcente, ad marginem inferiorem glauco-fuſcoque varia.

*Long.* lin 5⅓. *Lat.* 4.

In *Sylvis.*

235. *Chlorosata et Mucronata*, der *holztaubenfarbige Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 222. no. 551. Ph. *Chlorosata.*
Albida; seu colore eodem fere ut vultus in Cachexia virginea.
*Long.* lin. 7. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.
In Pascuis.

— No. 552. Ph. *Mucronata.*
Osso-cinerea; alis *anticis* apice acuminatis lineaque fusca ibidem.
*Long.* lin. 8. *Lat.* $5\frac{2}{3}$.
In *Salicetis.*

*Wien. Schmett.* p. 107. E. *Zweigschossraupen. Geradstreifichte Spanner.*
No. 7. *Unbek. Raupe. Holztaubenfarbiger, gelbgestrichter Spanner.* G. *Palumbaria*: Chlorosata et Mucronata *Scop.*

236. *Verberata*, der *Striemenspanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 223. no. 554.
Albida; alis *anticis* strigis 5 undatis transversis fusco-ferrugineis, duabus posticis approximatis.
*Long.* lin. 7. *Lat.* 5.
In *sterilioribus pratis.*

237. *Vndulata*, der *Wellenspanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 223. no. 555.
Alae cinereae; *anticae* fascia lata fusco-cinereoque nebulosa dentata; punctis duobus nigris, undulisque obsoletis crebris obscurioribus transversim strigatae.
*Long.* lin. $7\frac{1}{3}$. *Lat.* 5.
In *Sylvis.*

 *Wien.*

*Wien. Schmett.* p. 111. L. *Runzelraupen. Mittelstreifichte Spanner.*

No. 5. *Lülchspannerraupe* (Lolii perennis); *Lülchspanner*, G. *Bipunctaria.*

238. *Contaminata*, der *Schmuzspanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 225. no. 559.

Alae utrinque fasciis cinereis et ferrugineis alternantibus coloratae, atomisque fuscis adspersae.

*Long.* lin. 6. *Lat.* 4.

In *herbidis montanis.*

239. *Mensurata*, der *kaffespitzige Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 225. no. 560.

Alae cinerascentes; atomis fuscis obsitae; *anticae* fasciis tribus lineaque apicis caffeatis; margine paleaceo.

*Long.* lin. 6. *Lat.* 5.

In *siccis et apricis collibus.*

*Wien. Schmett.* p. 111. L. no. 2. *Trespespannerraupe* (Bromi arvensis); *Trespespanner*, G. *Mensuraria.*

*Schaeff.* Icon. t. 76. f. 4. 5.

240. *Moeniata*, die *Kaffstreife.*

*Scop.* Entom. carn. p. 226. no. 561.

Alae *anticae* albido-cinerascentes, *fascia caffeata* dentata, margine paleaceo.

*Long.* lin. $8\frac{1}{2}$. *Lat.* 6.

In *Sylvis.*

*Wien. Schmett.* p. 112. M. *Schuppenraupen. Eckestreifichte Spanner.*

No. 1. *Unbek. Raupe. Veilgrauer, braunstreifichter Spanner*, G. *Moeniaria.*

241. *Lac-*

241. *Laccata*, der *Lackſpanner*.
*Scop.* Entom. carn. p. 226. no. 563.
Alae ſupra viridanae; faſciis binis poſticis primorumque margine craſſiore *laccatis*.
*Long.* lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.
In *Juniperetis* verno tempore.

242. *Inflammata*, der *Feuerſpanner*.
*Scop.* Entom. carn. p. 226. no. 564.
Alae *anticae* hepaticae; diſco ſubtus nigricante; utrinque maculis quinis lineaque limbi *aureis; poſticae* fuſcae; faſciis binis maculaque *aureis*.
*Long.* lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.
In *Pratis*.

243. *Aurata*, der *Goldfleckigte Spanner*.
*Scop.* Entom. carn. p. 227. no. 565.
Habitus et colores ut in priore, ſed alae *anticae* maculis 4; *poſticae* unica utrinque *aureis*, faſciis nullis.
*Long.* lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{2}$.
In *Montanis*.

244. *Ochrata*, der *Okerſpanner*.
*Scop.* Entom. carn. p. 227. no. 567.
Alae *ochrae* colore, ſubtus obſcuriores, utrinque ſtrigis transverſis repandis obſcurioribus.
*Long.* lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.
In *Montanis*.
*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 129. no. 1489. Phal. *Ochrata*.
Seticornis, alis albo-flaveſcentibus; anticis ſtrigis undulatis 2-3; *poſticis* puncto diſci fuſco.
*Geoffr.* Inſ. II. p. 153. no. 87.

Ph. ſeticornis ſpirilinguis; alis deflexis albo-flaveſcentibus, faſcia duplici transverſa fuſca.

La *Phalene blanchâtre à deux bandes brunes.*

*Long.* 7. lign.

*Wien. Schmett.* p. 110. K. *Scheineulenraupen; wellenſtriemichte Spanner.*

No. 20. *Schwingelſpannerraupe.* (Feſtucae duriuſculae); *Schwingelſpanner*, G. *Ochreata.*

245. *Limitata*, der *hirſchhornfarbiggeſäumte Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 228. no. 568.

Alae ferrugineae; *anticae* ſupra faſcia lata nigro puncto ſignata, limboque cervinis.

*Long.* lin. 8. *Lat.* $5\frac{3}{4}$.

In *Pratis noſtris.*

246. *Spataceata*, der *beinfarbige Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 228. no. 570.

Alae oſſeae; ſtrigis transverſis obſcurioribus repandis obſoletis, puncto nigro vtrinque notatis.

*Long.* lin. 6. *Lat.* 4.

247. *Alpinata*, der *haarbrüſtige Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 228. no. 571.

Fuſco-cervina; *thorace* capiteque nigricantibus *tomentoſis.*

*Long.* lin. $5\frac{3}{4}$. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.

In ſummis herbidisque cacuminibus *Alpium Vochinenſium.*

248. *Murinata*, der *mäuſefarbige Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 229. no. 572.

*Murina*

*Murina* tota; absque maculis fasciisque.
*Long.* lin. $4\frac{2}{3}$. *Lat.* 3.

249. *Rivulata*, der *bachgestrichte Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 229. no. 573.
Alba; alis *anticis rivulis* ferrugineis; *posticis* fascia strigisque duabus transversis fuscis; omnibus striga marginali vtrinque ferruginea.
*Long.* lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.
In *Pratis.*

250. *Litterata*, der *Buchstabenspanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 229. no. 574.
Alae cervinae; *anticae* linea transversa postica, alia antica, hisque interiecta littera (V) albis; posticae fasciis binis angustis albis.
*Long.* lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Pratis.*

251. *Laevigata*, der *geglättete Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 230. no. 575.
Cinereo-murina; alis subdentatis; denticulis puncto nigro notatis; *anticis* strigis punctatis duabus nigris.
*Long.* lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Arbustis.*

*Wien. Schmett.* p. 117. P. *Fadenraupen, bogenstriemichte Spanner.*
No. 10. *Unbek. Raupe, röthlichweißer düsternstriemichter Spanner.*

252. *Inquinata*, der *Sudelspanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 230. no. 576.
Tota pallide ferruginea; alis omnibus supra fasciis bilineatis fuscescentibus, subtus immaculatis.
*Long.*

*Long.* lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Pratis.*

253. *Tenebrata*, der *braundüſtere Spanner.*

*Scop.* Entom. carn. p. 230. no. 577.
Fuſceſcens; alis *anticis* ſubtus macula flava; *poſticis* utrinque faſcia flava.
*Long.* lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.
In *Montanis.*

254. *Deſpicata*, der *Winkelkriecher.*

*Scop.* Entom. carn. p. 231. no. 579.
Alae cervinae aut murinae; *anticae* faſcia poſtica maculisque binis marginalibus; *poſticae* faſciis binis ferrugineis.
*Long.* lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* $2\frac{3}{4}$.
In incultis, ſiccis neglectisque locis.

255. *Nigrata*, der *Schwärzling.*

*Scop.* Entom. carn. p. 231. no. 580.
Fuſca; alis omnibus fimbria faſciaque albis; anticis punctis binis albis.
*Long.* lin. $3\frac{1}{2}$. *Lat.* 2.

256. *Aethiopata*, der *Mohr.*

*Scop.* Entom. carn. p. 231. no. 581.
*Nigra;* alis omnibus utrinque faſcia albida.
*Long.* lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{4}$.
In *herbidis ſubſylveſtribus.*

257. *Obfuſcata*, der *Bräunling.*

*Scop.* Entom. carn. p. 232. no. 582.
Fuſco-nigra; alis omnibus alba fimbria maculaque flava.

*Long.*

*Long.* lin. 3. *Lat.* 2.
In *calidiore Carniolia.*

258. *Trilineata*, die *Dreylinie.*

*Scop.* Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 128.
Alis concoloribus flavis rotundatis.
In *Pratis.*

259. *Trifaſciata*, die *Dreybinde.*

*Scop.* Ann. 5. hiſt. nat. p. 116. no. 129.
Alis rotundatis concoloribus flavis faſciis tribus utrinque ſuperne obſcurioribus; inferne fuſcis.

260. *Nivearia*, der *weiße engliſche Spanner.* *)

*Fabric.* Syſt. Entomol. p. 620. no. 2.
Pectinicornis; alis ſubangulatis albis; margine poſtico anticisque ſubtus fuſcis; poſticis puncto centrali nigro.

261. *Cultraria*, der *deutſche Sichelſpanner.*

*Fabric.* S. E. p. 621. no. 9.
Pectinicornis; alis *ſubfalcatis*, luteis; faſcia ſaturatiori, antennis apice ſetaceis.

262. *Dentaria*, der *engliſche Zahnſpanner.*

*Fabric.* S. E. p. 623. no. 15.
Pectinicornis; alis angulato-dentatis, ſupra pallidis; ſtrigis ferrugineis, ſubtus ferrugineis; *lunula* obſcuriore.

263. *Undaria*, die *indianiſche Braunwelle.*

*Fabric.* S. E. p. 623. no. 16.

Bipe-

*) An Niveata Scopoli? no. 229.

Bipectinicornis; alis dentatis albis, *fusco-undatis;* antennis apice setaceis.

264. *Rondelaria.*

*Fabric.* S. E. p. 623. no. 18.
Pectinicornis; alis anticis griseis; posticis ferrugineis.
In *Rondeletia Indiae orientalis.*

265. *Turcaria*, der *deutsche Weißmond.*

*Fabric.* S. E. p. 624. no. 22.
Pectinicornis; alis griseo-nebulosis, omnibus subtus puncto nigro; *lunula alba.*

266. *Limbaria*, der *englische Schwarzsaum.*

*Fabric.* S. E. p. 624. no. 24.
Pectinicornis; alis ferrugineis; *limbo* nigro; posticis subtus nigris, albo-striatis.

267. *Ocularia*, das *indianische Weißauge.*

*Fabric.* S. E. p. 625. no. 28.
Pectinicornis; alis rotundatis, flavis, omnibus *puncto ocellari* albo.

268. *Annularia*, der *deutsche braunringlichte Spanner.*

*Fabric.* S. E. p. 625. no. 29.
Pectinicornis; alis cinereis; striga *annulo* fasciisque duabus fuscis.

269. *Prasinaria*, der *englische wiesengrüne Spanner.*

*Fabric.* S. E. p. 626. no. 33.
Pectinicornis; *alis viridibus;* strigis tribus; anticis obscurioribus, postica alba.

270. *Vi-*

270. *Viridaria*, der *englische Grünling.*

*Fabric.* S. E. p. 626. no. 34.

Pectinicornis; alis rotundatis *viridibus;* albostrigosis, maculisque marginalibus atris.

271. *Fenestraria*, der *chinesische Blaustrich.*

*Fabric.* S. E. p. 627. no. 38.

Pectinicornis; alis rotundatis; atris, *coeruleostriatis* maculatisque.

272. *Venaria*, die *indianische Schwarzader.*

*Fabric.* S. E. p. 627. no. 39.

Pectinicornis; alis luteis; margine *venisque* dilatatis, ramosis, *nigris.*

273. *Plumbaria*, der *englische bleyfarbige Spanner.*

*Fabric.* S. E. p. 628. no. 44.

Pectinicornis; *alis plumbeis;* strigis tribus punctoque medio fuscis.

274. *Fasciata*, die *indianische Schneebinde.*

*Fabric.* S. E. p. 629. no. 47.

*Seticornis;* alis angulatis fuscis; *fascia nivea.*

275. *Regulata*, die *brasilianische Braunlinie.*

*Fabric.* S. E. p. 629. no. 48.

Seticornis; alis angulatis cinereis, *anticis litura fusca.*

276. *Falcata*, der *englische Sichelspanner.*

*Fabric.* S. E. p. 629. no. 49.

Seticornis; alis *falcatis* fulvis; punctis duobus fuscis inter strigas luteas.

277. De-

277. *Demandata*, der *Leipziger Purpurthau.*

*Fabric.* S. E. p. 630. no. 50.

Seticornis; alis ſubangulatis, luteſcentibus; ſtrigis tribus punctoque medio fuſcis.

Statura *Amatariae*, at minor; alae omnes flaveſcentes, *purpureo ſubtiliſſime irroratae.*

278. *Explanata*, der *chineſiſche Monſonſpanner.*

*Fabric.* S. E. p. 630. no. 51.

Seticornis; alis dentatis ferrugineis, faſcia fuſca, puncto nigro.

Muſ. *Monſon.*

279. *Dimidiata*, der *engliſche halbgelbe, halbbraune Spanner.*

*Fabric.* S. E. p. 630. no. 52.

Seticornis; alis dentatis; *antice flavis, poſtice fuſcis.*

280. *Irrorata*, der *oſtindianiſche braunbereifte Spanner.*

*Fabric.* S. E. p. 630. no. 53.

Seticornis; alis dentatis flavis, *fuſco-irroratis*, ſubtus macula faſciaque poſtica fuſcis.

281. *Ulmata*, der *engliſche Ulmenſpanner.*

*Fabric.* S. E. p. 632. no. 62.

Seticornis, alis albis, faſciis duabus ferrugineo-fuſcis, poſtica maculari.

*Sepp* Nederl. Inſ. VI. p. 13. t. 3. De *Porcelein-Vlinder.*

282. *Rufata*, der *engliſche Fuchs.*

*Fabric.* S. E. p. 633. no. 68.

Seti-

Seticornis; alis cinereis, poſtice ferrugineis, ſtriga alba, punctisque marginalibus nigris.

283. *Bimaculata*, der *Leipziger Zweyfleck.*

*Fabric.* S. E. p. 635. no. 76.

Seticornis; alis albis; *anticis* maculis *duabus coſtalibus* fuſcis.

284. *Volutata*, der *deutſche Linienſtrich.*

*Fabric.* S. E. p. 635. no. 77.

Seticornis; alis omnibus viridibus, *ſtrigis duabus albis.*

285. *Lyncea*, der *engliſche Großpunkt.*

*Fabric.* S. E. p. 635. no. 79.

Seticornis; alis rotundatis, albis, faſciis duabus punctoque apicis fuſcis.

286. *Exſpectata*, der *aſiatiſche Roſtrand.*

*Fabric.* S. E. p. 636. no. 82.

Seticornis; alis rotundatis viridibus, *margine ferrugineo.*

287. *Duplicata*, die *engliſche Doppelſtreiſe.*

*Fabric.* S. E. p. 636. no. 84.

Seticornis; alis griſeis; ſtrigis duabus fuſcis *duplicatis.*

28° *Punctata*, der *engliſche Punktrand.*

*Fabric.* S. E. p. 637. no. 89.

Seticornis; alis rotundatis niveis, puncto medio fuſco, *margineque nigro punctato.*

289. *Sociata*, die *Engliſche Zahnbinde.*

*Fabric.* S. E. p. 637. no. 90.

Seticornis; alis flavissimis, fascia lata, fusca, retrorsum dentem exserente.

290. *Niveata*, der *Amerikanische Schneespanner.*

*Fabric.* S. E. p. 638. no. 94.

Seticornis; alis striatis, *niveis*, immaculatis.

291. *Costata*, die *Amerikanische Rostrippe.*

*Fabric.* S. E. p. 638. no. 95.

Seticornis; alis niveis; anticis *costa ferruginea.*

292. *Sticticata*, der *Afrikanische gepickelte Spanner.*

*Fabric.* S. E. p. 638. no. 96.

Seticornis; alis concoloribus rufis, margine nigro, albo-punctato.

293. *Capitata*, der *Indianische Rostkopf.*

*Fabric.* S. E. p. 638. no. 97.

Seticornis; cinerea; *capite* thoracis alarumque margine basi *ferrugineis.*

294. *Argentata*, der *Chinesische Silberstrich.*

*Fabric.* S. E. p. 638. no. 99.

Seticornis; alis apice flavis; *anticis* strigis duabus *argenteis;* posticis macula quadruplici nigra.

295. *Sulphurata*, der *Indianische Schwefelspanner.*

*Fabric.* S. E. p. 639. no. 100.

Seticornis; alis flavis; maculis margineque postico fusco-ferrugineis.

296. *Perspectata*, der *Ostindianische Spiegelspanner.*

*Fabric.*

*Fabric.* S. E. p. 640. no. 107.

Seticornis; alis anticis griseis, *hyalino-maculatis*; posticis *hyalinis*; margine flavo, *hyalino*-maculato.

297. *Indicata*, der *Tottische orientalische Spanner.*

*Fabric.* S. E. p. 640. no. 106.

Seticornis; alis flavis; *anticis* strigis tribus, duabus undatis, fuscis.

Mus. *Tottianum.*

298. *Derogata*, der *orientalische Königsspanner.*

*Fabric.* S. E. p. 641. no. 109.

Seticornis; alis albis; strigis plurimis fuscis. *Koenig.*

299. *Ejectata*, der *orientalische*, *glasfleckichte Spanner.*

*Fabric.* S. E. p. 641. no. 110.

Seticornis; alis fusco flavoque variis; maculis *hyalinis* sparsis.

300. *Fenestrata*, das *Amerikanische Glasfenster.*

*Fabric.* S. E. p. 641. no. 111.

Seticornis, flava; alis *albo-hyalinis*; strigis flavis numerosis, subanastomosantibus.

301. *Strigaria*, der *ostindische Strichspanner.*

*Fabric.* S. E. App. p. 831. no. 9-10.

Pectinicornis; alis angulato-caudatis, albis; *strigis* undatis fuscis, supra duabus, subtus unica.

302. *Equestraria*, der *gelbe Ritter.*

*Fabric.* Mantiss. p. 284. no. 11-12.

Pectinicornis; alis angulatis; anticis fuſceſcentibus, *faſcia lata flava*, poſticis flavis.

Habitat *Hamburgi*.

303. *Ilyraria*, der *Surinamiſche Bartafter.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 284. no. 17-18.

Pectinicornis; alis angulatis viridibus; anticis ſtrigis tribus fuſcis.

Anus *rufo-barbatus*.

*Cramer* Pap. exot. I. t. 10. fig. E. Ph. *Ilyrias*.

304. *Monilaria*, der *Indianiſche grüne Zahnflügel.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 285. no. 15-16.

Pectinicornis; *alis dentatis viridibus*, ſtriga punctorum nigrorum; poſticis puncto duplici albo.

305. *Roraria*, der *europäiſche Braunreif.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 285. no. 24-25.

Pectinicornis; alis flavis *fuſco-irroratis*; anticis apice nigris.

306. *Ditaria*, der *Hamburgiſche Roſtfleck.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 286. no. 33-34.

Pectinicornis; alis viridibus, maculis marginalibus ferrugineis.

307. *Marginaria*, der *Hamburgiſche Randſtrich.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 286. no. 40-41.

Pectinicornis; alis albidis pulverulentis, omnibus ſtriga marginali punctorum nigrorum.

308. *Cynara*, die *Surinamiſche Zynara.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 286. no. 47-48.

Seticor-

Seticornis; alis angulatis, fusco-albo-nigro-fulvoque variis; posticis subtus albis.

*Cramer* Pap. exot. II. t. 15. fig. CD. Ph. *Cynara.*

309. *Sinuata*, der *Winkelspanner.*

*Fabric.* Mantiss. p. 287. no. 49-50.

Seticornis; alis emarginato-griseis; punctis duobus fuscis inter strigas albidas.

In *Germania.*

310. *Mantata*, der *Surinamische Mantospanner.*

*Fabric.* Mantiss. p. 287. no. 49-50.

Seticornis; alis angulatis fuscis; fascia obscuriore, anteriorum puncto ocellari atro.

*Cramer* Pap. exot. I. t. 10. fig. F. Ph. *Manto.*

*Müllers* Regist. Band p. 312. Ph. *Manto*, der *Dreyeckflügel.*

311. *Obscurata*, der *Schulzische Zahnflügel.*

*Fabric.* Mantiss. p. 287. no. 54-55.

Seticornis; alis dentatis griseis, strigis pallidioribus undatis obsoletis.

In *Germania.*

312. *Nitata*, der *kleine Wischpunkt.*

*Fabric.* Mantiss. p. 288. no. 55-56.

Seticornis; alis subdentatis obscure griseis; subtus pallidioribus puncto fasciaque fuscis.

In *Germania.*

313. *Equestrata*, der *schwarze Ritter.*

*Fabric.* Mantiss. p. 288. no. 65-66.

Seticornis; alis omnibus *nigris*, fascia fulva.

Habitat *Hamburgi.*

314. *Coerulata*, der *himmelblaubandirte Spanner.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 288. no. 67-68.

Seticornis; alis obſcure viridibus fuſco-faſciatis, faſciisque duabus *coeruleis.*

*Hamburgi.*

315. *Griſata*, der *Grauling.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 288. no. 72-73.

Seticornis; alis *griſeis;* anticis ſtriga, faſcia punctoque fuſcis.

Habitat *Hamburgi.*

316. *Fimbriata*, der *Gelbſaum.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 289. no. 77-78.

Seticornis; alis plumbeis; faſcia lata fuſca *flavo-marginata.*

In *Germania.*

*Schaeff.* Icon. t. 80. fig. 6. 7.

317. *Rivulata*, der *ſchwarzbandirte Spanner.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 289. no. 79-80.

Seticornis; alis albidis; *faſciis duabus nigris;* poſteriore terminali.

In *Germania.*

318. *Lunulata*, der *Gelbmond.*

*Fabric.* Mantiſſ. p. 290. no. 84-85.

Seticornis; alis fuſcis poſtice ſtrigis undatis flavis.

Verſus marginem poſticum ſtrigae tres *e lunulis flavis.*

In *Germania.*

319. *Mediata*, der *Zentralpunkt*.

*Fabric.* Mantiſſ. p. 290. no. 89 - 90.

Seticornis; alis omnibus griſeo - undatis, *puncto centrali* fuſco margineque nigro - punctato.

In *Germania*.

320. *Centrata*, das *ſchwarze Zentrum*.

*Fabric.* Mantiſſ. p. 290. no. 90 91.

Seticornis; alis flaveſcentibus, fuſco - undatis; *anticis puncto centrali nigro*.

Habitat *Hamburgi*.

321. *Variegata*, die *Buntſchecke*.

*Fabric.* Mantiſſ. p. 291. no. 92 - 93.

Seticornis; alis omnibus purpureis, maculis margineque flavis.

Habitat *Hamburgi*.

322. *Melata*, der *Nordamerikaniſche Rothafter*.

*Fabric.* Mantiſſ. p. 291. no. 99 - 100.

Seticornis; alis atris albo - maculatis; *ano rufo*.

*Cramer* Papill. exot. II. t. 18. fig. D.

323. *Elevata*, der *Südamerikaniſche Silberſaum*.

*Fabric.* Mantiſſ. p. 291. no. 107 - 108.

Seticornis; alis flaviſſimis, fuſco - punctatis (argenteo - ciliatis), ſubtus immaculatis.

324. *Matronaria*, der *Matronenſpanner*.

*Mülleri* Faun. Fridr. p. 49. no. 433.

Pectinicornis; alis undatim faſciatis; anticis cinereis fuſcisque, poſticis cinereis.

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1455.
— Litura angulo apicis inferiori. —
*Schaeff.* Icon. t. 12. f. 1. 2?

325. *Faginaria*, der *Buchenspanner.*

*Mülleri* Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1456.
Subpectinicornis; alis dentato-erosis, fulvis; *anticis* strigis duabus transversis fuscis; *posticis* unica.

326. *Curvata*, das *Krummhorn.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1469.
Ph. G.? Seticornis, spirilinguis, *corniculis* duobus recurvis basi cristatis, alis plano incumbentibus.
Norv. *Korvaelde.*
*Stroem* Söndmör 190. no. 9.

327. *Alternata*, die *Wechselbinde.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1484.
Seticornis; alis dentatis, fasciis albis nigricantibusque alternis, striga marginali duplici undata.
— Faun. Fridr. p. 51. no. 452.
*Schaeff.* Icon. t. 126. fig. 2.

328. *Tessulata*, der *Würfelrand.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1485.
Seticornis; alis omnibus *margine tessulato*, disco cinereo, subtus lutescentibus; strigis undulatis albis.
— Faun. Fridr. p. 51. no. 453.

329. *Vstulata*, der *Brandspanner.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1487.

Seticornis; alis glaucis; ſtrigis tribus undatis, interruptis, albis, margine nigro teſſulato.

330. *Paſcuata*, der *Viehweidenſpanner.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1488.

Seticornis; alis albis; ſupra ſtrigis quinque ſublutеſcentibus; ſubtus tribus nigricantibus punctoque diſci nigro.

331. *Flexuata*, die *Bogenlinie.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1490.

Seticornis; alis murinis; anticis lineis transverſis tribus, *media flexuoſa;* omnibus ſubtus ſtrigis duabus punctoque diſci obſcuris.

332. *Duplicata*, der *Zwillingfleck.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1491.

Seticornis; alis flaveſcentibus, macula media ocellari *didyma* nigra; margine poſtico fuſco.

Strigae duae obſcurae *undulatae* in quibusdam.

333. *O. Miata*, der *O M Spanner.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1492.

Seticornis; alis albidis, ſtrigis quatuor cinereis, ſecunda in figuras *literarum O M* curvata.

334. *Albata*, der *doppelte Weißſtrich.*

*Mülleri* Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1493.

Seticornis; alis anticis luteo-fuſcis baſi apiceque ferrugineis; poſticis cinereis, *ſtriga duplici alba.*

335. *Flammata*, der *Flammenſpanner*.

*Sepp* Nederl. Inſ. VI. p. 21. t. 5. De *Worbelhout-Vlinder*.

Seticornis, alis fuſcis *flammeolatis*; poſticis cinereis, lineis undulatis transverſis albis.

336. *Fulvo-ſtriata*, der *braungelbgeſtrichte Spanner*.

*Geoffr*. Inſ. II. p. 131. no. 45.

*Phalaena* pectinicornis ſpirilinguis; alis patentibus albido-luteis; omnibus fulvo transverſim denſe ſtriatis.

La *Phalene ſtriée fauve*.

*Long*. 5. lign. *Larg*. 1. pouce.

337. *Inaequalis*, die *ungleiche Queerlinie*.

*Geoffr*. Inſ. II. p. 132. no. 47.

*Phalaena* pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, fuſco-nebuloſis; *lineis transverſis inaequalibus*.

La *Bande inégale*.

*Long*. 7. lign. *Larg*. 13. lign.

338. *Marginaria*, der *Bindenpunkt*.

*Geoffr*. Inſ. II. p. 133. no. 49.

*Phalaena* pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereo-obſcuris, linea faſciaque alarum transverſa obſcuriore; *puncto marginali nigro*.

La *Bande à point marginal*.

*Long*. 5. lign.

339. *Griſeo-nigra*, der *ſchwarzgraue Spanner*.

*Geoffr*. Inſ. II. p. 134. no. 51.

*Phalaena* pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus *cinereis*; atomis maculisque nigris.

La

La *Grisaille.*
*Long.* 11. 12. 14. lign.

340. *Sulcata*, die *weiße Pickelbinde.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 134. no. 52.
*Phalaena ſeticornis* ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, faſciis plurimis transverſis, nonnullis connexis, atomisque fuſcis.
La *rayure blanche picotée.*
*Long.* 5. lign. *Larg.* 13. lign.

*Raj.* Hiſt. Inſ. p. 180. no. 6.
*Phalaena* media, colore vario e ſordido flaveſcente ſeu fulveſcente et nigro, cum tribus lineis transverſis nigris in exterioribus alis.

341. *Ferruginata*, die *Roſtbinde.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 140. no. 62.
*Ph. Setic. ſpiril.* alis patentibus albidis, atomis cineraſcentibus, et faſcia duplici undulata *ferruginea.*
Les *atomes à deux bandes.*
*Long.* $5\frac{1}{2}$ lign. *Larg.* 1 pouce.

342. *Interrupta*, die *Bruchbinde.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 141. no. 65.
*Ph. Setic. ſpiril.* alis patentibus niveis; omnibus pone faſcia undulata fuſca, ſuperiorum margine externo maculis nigris.
La *bande interrompue.*
*Long.* $4\frac{1}{2}$ lign. *Larg.* 8 lign.

343. *Brunneata*, die *Braunlinie.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 142. no. 67.

*Ph.*

*Ph. Setic. ſpiril.* alis patentibus albis; linea duplici undulata *fuſca.*

La *Phalene blanche à lignes brunes ſans points*

*Long.* 5. lign. *Larg.* 1. pouce.

344. *Limbata*, der *Zahnſaum.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 143. no. 70.

*Ph. Setic. ſpiril.* alis patentibus cinereis, faſciis plurimis fuſcis undulatis transverſis, *limbo ſubdentato.*

La *Brocatelle brune.*

*Long.* 4. lign.

345. *Fuſco-venoſa*, die *Braunader.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 144. no. 72.

*Ph. Setic. ſpiril.* alis patentibus cinereis, margine exteriore fuſco, punctoque alarum nigro.

La *Nervure brune.*

*Long.* 3½ lign.

346. *Viridi-faſciata*, die *Grünbinde.*

*Geoffr.* Inſ. II. p. 144. no. 73.

*Phal. Setic. ſpiril.* alis patentibus viridi-fuſcoque variegatis, faſcia triplici undulata obſcuriore.

La *Phalene à bandes vertes.*

*Long.* 5. lign. *Larg.* 11. lign.

347. *B. ata*, der *Neuyorkiſche B-Spanner.*

*Drury* Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 15. t. 7. f. 2.

Ailes environ *un pouce & demi.*

Setic. Alis *anticis* furvis, flavo-lineatis, verſus apicem *litera B. flava; poſticis* hilare rubris atro-maculatis.

348. *Lineola*, die *Neuyorkische Einlinie.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 16. t. 8. f. 2.

Ailes environ *deux pouces*.

Seticornis. Alis dentatis aurantiacis concoloribus; *lineola unica* transversa per omnes alas fusca.

349. *Uncinularia*, der *Neuyorkische Hakenspanner.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 17. t. 8. f. 3. *)

Ailes *un pouce & trois quarts.*

Pectinicornis. Alis pallide viridi-flavescentibus, *atro-uncinulatis.*

*Cramer* Pap. exot. III. t. 228. Fig. E. Ph. *Catenaria.*

350. *Argentata*, der *sierraleonische Silberspanner.*

*Drury* Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 25. t. 14. f. 2.

Ailes *presque un pouce & trois quarts.*

Seticornis; alis cinereis, *bacillis flavis, argenteo-marginatis; posticis ocellis binis nigris.*

351. *Area*, die *surinamische Area.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 88. t. 56. Fig. D.

Alis concoloribus niveis; *anticis* margine anteriore binis lineolis luteis; *posticis* dentato-ciliatis, quatuor lineis incurvatis aurantiacis, anticarum partem tangentibus.

352. *Cydonia*, die *surinamische Zydonia.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 34. t. 22. Fig. F.

Alis

*) Ich bin ungewiss, ob die Phal. *Drury* I. t. 20. f. 3. 4. Geometrae oder Noctuae sind.

Alis fusco-cinereis albicantibus margine obscuriore; *anticis* binis lineis transversis fuscis, albo-marginatis.

353. *Deolis*, die *westindische Deolis.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 59. t. 36. Fig. F.

Alis *anticis* subfalcatis, dente prominente, viridi-micantibus, binis ocellis nigris, iride aurantiaca, *posticis* incarnatis.

354. *Diores*, die *surinamische Diores.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 119. t. 75. Fig. F. *Mas.*

Alis fusco-incarnatis, lineis transversis fuscis undulatis; *anticis* linea ex quatuor o composita; *posticis* dentatis.

355. *Festiva*, der *surinamische Staatsspanner.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. C. *Mas.*

Alis griseo-albis, nigro-venosis.

356. *Hesparia*, die — *Hesparia.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 87. t. 56. Fig. C.

Alis antice cyaneis; postice purpurascentibus; media fascia transversa lata incurvata alba.

357. *Merops*, der *surinamische Merops.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 26. t. 18. Fig. C.

Alis rubicunde variegatis; linea transversa albido-atra undulata.

358. *Myrrha*, die *surinamische Myrrha.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 47. t. 29. Fig. G.

Alis *ochreaceis* concoloribus aterrime marginatis; linea *anticarum* transversa atra.

359. *Sy-*

359. *Syringa*, die *koromandelſche Syringa.*

*Cramer* Pap. exot. I. p. 8. t. 5. Fig. CD. *Foem.*

Alis *anticis* vireſcentibus; transverſis faſciis rubicundis; *poſticis* rubris nigro-maculatis.

360. *Amabilis*, die *ſurinamiſche Schöne.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 24. t. 112. Fig. G. *Belle Cloporte.*

Alis niveis; *anticis* longitudinaliter late fuſco-faſciatis; *poſticis* puncto et litera J *deauratis*; atomis numeroſis nigris.

361. *Carinenta*, die *koromandelſche Karinenta.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 47. t. 128. Fig. F.

*Magna.* Alis denticulatis vireſcentibus punctatis; *anticis* binis lunulis literisque 7 atris; lineolisque longitudinalibus undulatis nigris.

362. *Cenis*, die *chineſiſche Zenis.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 82. t. 147. Fig. E.

Alis albicantibus fuſco-maculatis, corpore aurantiaco; *thoracis imagine humana* atro-ſignata, abdominis annulis nigris.

363. *Faſciata*, der *bataviſche Bandſpanner.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 12. t. 104. Fig. D.

Alis niveis; faſciis transverſis incarnatis; *poſticis* acute dentatis, tribus margine exteriore punctis atris.

364. *Geminia*, die *amboiniſche Geminia.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 57. t. 133. Fig. C.

Alis niveis, transverſe fuſco-faſciatis; *anticarum* margine anteriore nigro-liturato; *poſticis* obtuſe

obtuſe dentatis, dentium baſi binis maculis atris.

*Clerk* Icon. t. 50. f. 3. 4. Geom. *Sambucaria.* (Alſo nicht *Linn. Samb.*)

365. *Gyges*, der *ſurinamiſche Gygesſpanner.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 9. t. 102. Fig. B.

Alis furvis; *anticis* binis lituris albis; *poſticis* diſco albo.

366. *Hilaria*, die *ſurinamiſche Hilaria.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 26. t. 113. Fig. F.

Alis *anticis* incarnatis, faſcia transverſa ſulphurea, binis ocellis nigris, iride aurantiaca; *poſticis* aurantiacis.

367. *Hypanus*, der *ſurinamiſche Hypanusſpanner.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 42. t. 142. Fig. D.

Alis caneſcentibus; faſciis fuſcis transverſis; multisque globulis fuſcis.

368. *Labda*, der *ſurinamiſche Labdaſpanner.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 129. t. 181. Fig. D.

Alis *anticis* flaveſcentibus, bacillo transverſo luteo; *poſticis* albis margine incarnatis, omnibus ciliatis.

369. *Lacticinia*, die *koromandelſche Laktizinia.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 47. t. 128. Fig. E.

Alis furvis; *anticis* quatuor maculis albis, binis anterioribus coalitis, punctisque binis albis; *poſticis* albo-fuſcis.

370. *Lothos*, der *ſurinamiſche Lothosſpanner.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 136. t. 185. Fig. G.

Alis

Alis fuſcis aurantiaco-faſciatis, lineolisque transverſis nigris undulatis.

371. *Marmorata*, der — *Marmorſpanner.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 87. t. 151. Fig. F.

Alis *marmoratis* atro-punctatis lineolisque transverſis undulatis nigris; *poſticis* denticulatis.

372. *Netrix*, die — *Näherinn.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 87. t. 151. Fig. E.

Alis dentatis viridi-flaveſcentibus, numeroſis punctis cineraſcentibus; *poſticis* binis maculis albis ſinuoſis.

373. *Oſiris*, die *ſurinamiſche Oſiris.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 28. t. 115. Fig. E.

Alis nigris, quatuor magnis maculis hilare flavis.

374. *Perdica*, die — *Perdika.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 127. t. 178. Fig. E.

Alis incarnatis, fuſco-marginatis, *anticis* faſcia transverſa fuſca, et *ſemicirculo* fuſco communi.

375. *Phylira*, die *ſurinamiſche Phylira.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 113. t. 170. Fig. D.

Alis concoloribus viridibus, *anticis poſticisque* binis ocellis fuſcis glauco-pupillatis; *poſticis* dentatis.

376. *Polita*, der *ſurinamiſche V-Spanner.*

*Cramer* Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. E.

Alis flaviſſimis fuſco-maculatis; *anticis* binis litteris V fuſcis verſus marginem anteriorem; *poſticis* dentatis, macula inaequali fuſca magna.

377. *Rhanis*, die *weſtindiſche Rhanis*.

*Cramer* Pap. exot. II. p. 34. t. 119. Fig. BC.

Alis vireſcentibus, diſco communi rubeſcente, quatuor uncinulis rubris binis maculis flavis, lineaque transverſa alba undulata.

378. *Amata*, der *ſurinamiſche Liebling*.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 62. t. 228. Fig. F.

Alis niveis, hilare-viridi-longitudinaliter faſciatis.

379. *Apidania*, die *ſurinamiſche Apidania*.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 103. t. 152. Fig. CD. C. *Mas*. D. *Foem*.

Alis concoloribus olivaceis, violaceo-lituratis.

380. *Brunnea*, der *ſurinamiſche Bräunling*.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 171. t. 187. Fig. G.

Alis nigro-purpuraſcentibus, atro-transverſe faſciatis.

381. *Canente*, die *koromandelſche Kanente*.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 98. t. 250. Fig. C.

Alis incarnatis, fuſco-lituratis.

382. *Clelia*, die *koromandelſche Klelia*.

*Cramer* Pap. exot. III. p. 172. t. 288. Fig. BC.

Alis dentato-falcatis fuſco-canis; atomis numeroſis nigris, *poſticis* margine furvis.

383. *Eleo-*

383. *Eleonora*, die *koromandelſche Eleonora.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 172. t. 288. Fig. EF. *Mas.* G. *Foem.*

Alis fuſco - olivaceis ſubdentatis luteo - alboque marginatis, faſcia transverſa communi alba.

384. *Erota*, die *ſurinamiſche Erota.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 152. t. 276. Fig. G.

Alis nigerrimis concoloribus, faſcia transverſa communi aurantiaca; *poſticis* margine binis lineis coeruleis.

385. *Flaviaria*, der *ſurinamiſche Gelbling.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 171. t. 287. Fig. F.

Alis ſubfalcatis; *anticis* flavo - olivaceis; *poſticis* hilarioribus.

386. *Formoſanta*, die *ſurinamiſche Formoſanta.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. G.

Alis fuſco - rubris; *poſticis* binis ocellis nigris albo - pupillatis iride alba, punctisque argenteis.

387. *Gootenaria*, die *ſurinamiſche Gootenaria.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 102. t. 252. Fig. B.

*Magna.* Alis fuſcis; *anticis* nigro - hieroglyphicis, tribus maculis albis; *poſticis* lineis longitudinalibus nigris undulatis.

388. *Heſperia*, die *Guinéiſche Heſperia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 99. t. 251. Fig. A. *Foem.* B. *Mas.*

Alis albo-virescentibus, basi fusco-radiatis; lineis transversis apice fuscis; *posticis* nigro-venosis, margine aurantiaco-fuscis.

389. *Lincea*, die *surinamische Linzea.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 61. t. 228. Fig. B.

Alis nigro-fuscis; *anticis* tribus maculis olivaceis, apice posticisque semiluteis.

390. *Polita*, die *surinamische Polita.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 152. t. 276. Fig. F.

Alis incarnatis, fasciis transversis communibus flavissimis; *posticis* fasciis marginalibus flavis, aureis luteisque.

391. *Tasima*, die *surinamische Tasima.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 80. t. 240. Fig. DE.

Alis falcato-dentatis incarnatis, numerosis punctis nigris, fasciis longitudinalibus communibus olivaceis luteisque.

392. *Titea*, die *virginische Titea.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. C.

Alis griseis; *anticis* atro-punctatis, strigisque transversis fusco-nigris; *posticis* linea marginali nigra undulata.

393. *Trofonia*, die *kapensische Trofonia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. F.

Alis *anticis* ferrugineis, albo-maculatis; *posticis* incarnatis.

394. *Vesulia*, die *surinamische Vesulia.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 79. t. 240. fig. B C.
Alis griseo-flavescentibus, atro-punctatis, nigro-venosis; *posticis* binis acervulis punctorum atrorum.

395. *Virginiaria*, die — *Virginiaria.*

*Cramer* Pap. exot. III. p. 149. t. 275. fig. G.
Alis griseis, fulvo-punctatis, lineis longitudinalibus undulatis fuscis continuis et interruptis.

396. *Martia*, die *surinamische Martia.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 32. t. 305. fig. D.
Alis subdentatis, *anticis* incarnatis fasciis transversis latis, strigisque undulatis fuscis; *posticis* rubescentibus.

397. *Nina*, die *surinamische Nina.*

*Cramer* Pap. exot. IV. p. 31. t. 305. fig. E.
Alis *anticis* glaucescentibus fusco-maculatis, striatisque; *posticis* rubescentibus margine postico albo.

398. *Degeeriaria*, der *Degeerische Holunderspanner.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 446. no. 2.
*Phalene* à antennes filiformes, à trompe; à ailes horizontales d'un brun griseatre, à grandes taches luisantes d' un blanc jaunâtre.
*Phalene du Sureau.*
— *Uebers.* II B. I Th. p. 326. no. 2.
Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und horizontalen braungrau-

 lichen

lichen Flügeln, mit grofsen, glänzenden, weifsgelblichen Flecken.

Die *Holunderphaläne.*

*Goed.* Inf. Tom. I. (ed. gall.) t. 68.

*Lift. Goed.* p. 136. no. 55. f. 55.

*Blank.* Inf. t. 15. F. G. H.

*Albin.* Inf. t. 37. a b c d.

*Réaum.* Inf. Tom. I. t. 15. f. 7. 8. 9.

399. *Biftortata*, der *Natterwurzfpanner.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 449. no. 5. t. 8. f. 16.

*Phalene* à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues, d' un blanc fale variées de nuances grifes, avec deux lignes transverfes d' un brun noirâtre fur chaque aile.

*Phalene blanche fale à deux rayes noirâtres.*

— *Ueberf.* II B. I Th. p. 330. no. 5. t. 8. f. 16.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüffel, und weifsgrauen, breiten, mit graulichen Schattirungen, gefcheckten Flügeln, und zwo braunfchwärzlichen Queerlinien auf jedem.

*Die fchmuzigweifse Phaläne mit zwo fchwärzlichen Streifen.*

400. *Nigro-fafciaria*, die *Schwarzftreife.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 457. no. 8. t. 9. f. 5.

*Phalene* à antennes filiformes; à trompe; à ailes étendues couleur de lilas mêlée de gris & de blanc fale, avec trois rayes ondées transverfes noires.

*Phalene lilas à rayes noires.*

Degeer

*Degeer Uebers.* II B. I Th. p. 336. no. 8. t. 9. f. 5.
Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und breiten, lilafarbigen, grau und schmuzigweiss gemischten Flügeln, mit drey schwarzen gewässerten Queerstreifen.
*Die lilafarbige Phaläne mit schwarzen Streifen.*

401. *Abietaria*, der *Tannapfelspanner.*

*Degeer* Inf. Tom. II. Part. I. p. 462. no. 10. t. 9. f. 12.
*Phalene* à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues grises à rayes ondées noires & griseatres, avec un point noir & une bande d'un brun roussâtre.
*Phalene de l' arpenteuse de la Pomme de Sapin.*
— *Uebers.* II B. I Th. p. 340. no. 10. t. 9. f. 12.
Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und breiten grauen Flügeln, mit wellenförmigen, schwarzen und graulichten Streifen, einem schwarzen Punkt, und einer braunröthlichen Binde.
*Der Tannapfelspanner.*

Bayerische StaatsBibliothek

Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Goeze, Johann August Ephraim,

Entomologische Beyträge Zu Des Ritter Linné Zwölften Ausgabe Des Natursystems

Bd.: Dritten Theiles Dritter Band

1781

Bamberg, Staatsbibliothek -- Zool.o.79(5#1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11784740-3
VD18 80328849